



د MenB واکسينو له تطبيق وروسته د تبې د مخنيوي او درملنې لپاره له پرستامولو څخه استفاده

زما ماشوم اوس تازه د MenB واکسين کړي دي،
نو څه مه بايد ولرم؟

د هر ډول واکسينو له تطبيق وروسته تبه رامنځ ته کېږي، خو د واکسينو سره يو ځای د 8 او 12 اونو MenB که چېرې پرستامول استفاده نه شي، نو له نيمايي زيات نوي زېږېدلي ماشومان د دې واکسينو له تطبيق وروسته تبه پيدا کړي. تبه د واکسينو له تطبيق 6 ساعته وروسته خپل نهايي حد ته رسېږي، او تقريباً همېشه په 2 ورځو کې په بشپړ ډول له منځه ځي. که څه هم د هر ماشوم د تبې کچه توپير کوي او نه شي ښودلې چې دا واکسين څومره د ماشوم لپاره ګټور دي، خو تبه موږ ته دا ښيي چې د ماشوم د بدن دفاعي سيستم د واکسينو په وړاندې عکسالعمل ښيي.

څنګه کولی شم د تبې ګواښ راتېټ کړم؟

له واکسينو وروسته مو ماشوم ته دغه پرستامول ورکړئ - د تبې پيدا کېدو ته مه په مه کېږئ - دا کار مو د ماشوم د تبې ګواښ راکمولی شي. د پرستامولو له خوړلو وروسته له 5 څخه په 1 ماشوم کې تبه پيدا کېږي، چې تقريباً ټولې ملايمې تبې وي (له 39 درجو څخه ټيټه). همدارنګه، پرستامول ستاسو د ماشوم خارشې او ناآرامي هم راکمولی شي (مثلاً د پېچکارۍ په ځای کې درد).

له کوم ډول پرستامول څخه استفاده وکړم؟

تاسو بايد د ماشومانو لپاره د پرستامول له مخصوص شربت څخه استفاده وکړئ. دا ډول پرستامول په مایع شکل کې راځي ترڅو ماشومان او تنکي ځوانان يې په اسانه استفاده کړي شي. د دې مایع يا شربت غلظت يا قوت 120mg/5ml کې دی.

که چېرې مو په کوم کې د ماشومانو لپاره مخصوص پرستامول شربت نه لرئ، نو هڅه وکړئ چې له خپل محلي درملتون يا پلورنځي څخه يې ترلاسه کړئ ترڅو وکولی شئ چې د واکسينو له تطبيق څخه يې يو ساعت وروسته خپل ماشوم ته ورکړئ. په دې شربتونو کې بېلابېل ډولونه شته چې کولی شئ انتخاب يې کړئ، لېکن هغه ډول چې تاسو اړتيا ورته لرئ بايد د 150mg/5ml پرستامول شربت وي.

(نوب: جونير پرستامول (له 6 کلنو څخه پورته)

د ماشوم د پرستامولو څخه چې غلظت يې 150mg/5ml وي، پياوړي دي او بايد يوازې د نويو زېږېدليو ماشومانو لپاره استفاده شي.)

وروسته له کومو واکسينو څخه بايد خپل ماشوم ته پرستامول ورکړم؟

تاسو ته توصیه کېږي چې د MenB له واکسينو څخه وروسته خپل ماشوم ته پرستامول ورکړئ. د MenB واکسين معمولاً د واکسينو په لومړي او دوهم دور کې ستاسو ماشوم ته ورکول کېږي، چې عمر يې له 8 تر 12 اونيو پورې وي.

د MenB له واکسينو وروسته د ماشومانو د پرستامول د شربت (120mg/5ml)

د مصرف اندازه او وخت (معمولاً د ماشوم د عمر له 8 تر 12 اونيو پورې)

کله چې ستاسو ماشوم ته په 12 مياشتني عمر کې د MenB تقويتي دوز واکسين ورکړل شي، نو له هغې وروسته پرستامولو ته په دوامدار ډول اړتيا نشته. په دې عمر کې ماشوم ته د تبې پيدا ګواښ د نورو واکسينو په شان وي.

څومره پرستامول بايد خپل ماشوم ته ورکړم؟

سپارښتنه کېږي چې د MenB له واکسينو وروسته مو بايد ماشوم ته 3 ځله 2.5ml (ټول 60mg) پرستامول ورکړئ. لومړی دوز بايد د واکسينو له تطبيق څخه دغه وروسته ورکړئ. دوهم دوز بايد له 4 تر 6 ساعته وروسته ورکړئ او دريم دوز هم له دې څخه 4 يا 6 ساعته وروسته ورکړئ (جدول وګورئ). هر 2.5ml دوز بايد د سیرنج يا يوي 2.5ml قاشوغي په واسطه اندازه شي (دا معمولاً د شربت د قطبو وړه کاشوغي وي).

له وخت څخه مخکې زېږېدليو ماشومانو لپاره (هغه چې له 32مې اونۍ مخکې زېږېدلي وي)، ډاکټران بايد د ماشوم وزن ته په کتو سره هغه ته پرستامول تجویز کړي. په دې هکله بايد له ډاکټر سره خبرې وکړئ او نسخې مطابق د هغه لارښوونې تعقيب کړئ.

په دغه لارښود کې موجوده لارښوونې یوازې هغه وخت د تطبیق وړ دي چې ستاسو ماشوم د واکسین کړي وي. MenB که چېرې ستاسو ماشوم تبه ولري نو باید په محصول باندې مندرجه د تولیدي مرجع او دغه لارښود لارښوونې او سپارښتنې په پام کې ونیسئ.

که چېرې له 3 دوزه پرستامولو وروسته بیا هم زما ماشوم تبه ولري، څه باید وکړم؟

ځینې ماشوم ښايي د واکسینو له تطبیق وروسته هم تبه ولري، حتی که 3 دوزه یا درې ځله پرستامول هم وخوري. که چېرې ستاسو ماشوم د واکسینو له تطبیق 48 ساعته وروسته بیا هم تبه لري خو وضعیت یې ډېر خراب نه وي، کولی شئ هغه ته د ماشومانو لپاره د ځانګړیو شویو پرستامولو 2.5ml (60mg) ورکړئ.

- تاسو باید د هر ځل درملو استفادې ترمنځ حداقل 4 ساعته زماني واټن مراعات کړئ، او هېڅکله په 24 ساعتونو کې تر 4 ځله ډېر درمل استفاده نه کړئ.

همدارنګه تاسو باید خپل ماشوم سور او یخ وساتئ او په ډېرو جامو یا کمپلو کې یې و نه نغاړئ او هغه ته په پراخه پیمانه مایعات ورکړئ. که چېرې ستاسو ماشوم تی روي، نو د هغه لپاره ترټولو غوره مایعات هماغه د مور شیدې دي.

- که چېرې تاسو ته د خپل ماشوم په هکله په هر وخت کې کومه اندېښنه پيدا کېږي، نو په خپل نفس اعتماد ولرئ او د خپل عمومي ډاکټر یا GP سره مشوره وکړئ یا هم په انګلستان کې د NHS د 111 او په وېلز کې د 0845 46 47 شمېرې سره اړیکه ونیسئ.

- که چېرې ستاسو ماشوم د واکسینو له تطبیق 48 ساعته وروسته هم تبه لري، نو باید د خپل عمومي ډاکټر یا GP سره مشوره وکړئ یا هم په انګلستان کې د NHS د 111 او په وېلز کې د 0845 46 47 شمېرې سره اړیکه ونیسئ.

نورې عامه پوښتنې:

آیا خپل ماشوم د پرستامولو ورکولو لپاره وېښ کړم؟

تاسو باید خپل ماشوم ته د MenB واکسینو له تطبیق وروسته هرڅومره ژر چې کولی شئ لومړی دوز پرستامول ورکړئ. نو که چېرې ستاسو ماشوم د راتلونکو دوزونو د تطبیق پرمهال ویده وي، نو مه یې راوېښوئ. کولی شئ هغه ته د راوېښېدو سره سم د 4 ساعته زماني واټن په پام کې نیولو سره راتلونکی دوز ورکړئ.

آیا د کوچنیو ماشومانو لپاره هم د پرستامولو ورکول مناسب دي؟

پرستامول د تبې د کنټرولولو لپاره تصویب شوي درمل دي چې له 2 میاشتو وروسته ماشوم ته ورکول کېدی شي. د ناروغ لارښود چې د تولیدي مرجع لخوا د خپل محصول سره یو ځای ترتیب شوی، دا سپارښتنه کوي چې د هغو ماشومانو لپاره چې عمر ونه یې له 2 تر 3 میاشتو وي ډاکټر یا درمل پلورونکي سره له مشورې مخکې یوازې 2 دوزه ورکول کېدی شي.

نو پرستامولو د خورا کوچنیو ماشومانو لپاره هم خوندي او بې ضرره دي، خو د محصول سره په ضمیمه شوي لارښود باندې اشاره شوې ده چې د مېهمې یا پېچلې تبې پرمهال باید له دغو درملو څخه استفاده و نه شي. دا ډول تبه ښايي د جدي میکروب یا ناروغۍ علامه وي چې اوږدمهاله درملنه یې کېدی شي د دې لامل شي چې والدین و نه شي کولی په وخت سره طبی مرسته ترلاسه کړي.

دا چې د واکسینو له تطبیق وروسته تبه یوه عامه موضوع ده، نو متخصصین سپارښتنه کوي چې د MenB واکسینو له تطبیق 48 ساعته وروسته والدین کولی شي له طبي مشورې پرته خپل ماشوم ته پرستامول ورکړي.

هغه سپارښتنه چې له مخې یې د هغو ماشومانو لپاره چې عمر ونه یې له 2 تر 3 میاشتو وي تر دوه دوزه ډېر پرستامول ورکول کېږي، یوازې هغه وخت د تطبیق وړ ده چې ماشوم خپل د MenB واکسین کړي وي. که چېرې ستاسو ماشوم له دې پرته په بل هر وخت کې تبه لري، نو تاسو باید د تولیدي مرجع لخوا د محصول په اړه په ترتیب شوي لارښود کې مندرجه لارښوونې او سپارښتنې په پام کې ونیسئ.

په دغې موده کې د تبې رامنځ ته کېدل په لوړ احتمال سره د واکسینو له امله وي نه د کومې ناروغۍ له امله. د پرستامولو په تطبیق سره به ستاسو ماشوم د بهرېدو احساس وکړي، او په 24 ساعتونو کې د 4 دوزونو چې هر دوز باید 2.5ml وي په مراعات کولو سره ماشوم ته هېڅ خطر نشته.

ولې د تولیدي مرجع لخوا د محصول په ترتیب شوي لارښود کې (PIL) کې مختلف معلومات درج وي؟

تاسو به د خپلو پېرل شویو پرستامولو په قطي کې د ناروغ معلوماتي لارښود (PIL) پیدا کړئ. کېدی شي د ماشومانو د پرستامول شربت په لارښود کې د درملو ټاکل شوی مقدار 120mg/5ml د هغه څه سره متفاوت وي چې د MenB واکسینو له تطبیق وروسته د ډاکټر لخوا ناروغ ته ویل کېږي. دلته په دغه لارښود کې موږ د MenB واکسینو له تطبیق وروسته ناروغ ته په لارښود کې د مندرجه سپارښتنو جزئیات ورکوو. د پرستامولو په اړه د بشپړو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ د تولیدي مرجع لارښود PIL وگورئ.

آیا زما ماشوم په 12 میاشتې کې د تقویتی دوز واکسینو د تطبیق پرمهال پرستامولو ته اړتیا لري؟

په 12 میاشتې کې د MenB واکسینو له تطبیق وروسته ستاسو د ماشوم لپاره د تبې خطر لکه د نورو واکسینو په شان دی. نو ستاسو ماشوم به په 12 میاشتې کې د معمولي واکسینو د تطبیق پرمهال 3 دوزه پرستامولو ته اړتیا و نه لري. نو که چېرې ستاسو ماشوم په کور کې تبه یا ناراحتی کوي، کولی شئ هغوی ته د محصول د لارښود او د ماشوم د عمر مطابق پرستامول ورکړئ.



www.nhs.uk/vaccinations