



MenB ویکسینیشن کے بعد بخار سے تحفظ اور اس کے علاج کے لیے پیراسیٹامول استعمال کرنا

12 ماہ کی عمر میں MenB بوسٹر ویکسین دینے کے بعد پیراسیٹامول کی معمولی مقدار کے مطابق ضرورت نہیں ہوتی۔ اس عمر تک بچے میں بخار کا خطرہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ دوسری ویکسینز کے بعد ہوسکتا ہے۔

مجھے پیراسیٹامول کی کتنی مقدار دینی چاہیے؟

MenB ویکسینیشن کے بعد پیراسیٹامول کی 2.5ml (60mg) کی مجموعی طور پر 3 خوراکیوں کی تجویز دی جاتی ہے۔ آپ کو پہلی خوراک ویکسینیشن کے وقت یا اس کے بعد جتنا جلد ممکن ہوسکے دے دینی چاہیے۔

پھر آپ کو پیراسیٹامول کی دوسری خوراک تقریباً 4 سے 6 گھنٹے بعد اور تیسری خوراک اس کے 4 سے 6 گھنٹے بعد دینی چاہیے (جدول دیکھیں)۔

2.5ml کی خوراک کی پیمائش کی جانی چاہیے اور اسے سرنج یا 2.5ml کے چمچ (بہ عام طور پر پیک میں موجود چمچ چھوٹا سیرا ہوتا ہے) کے ذریعے دیا جانا چاہیے۔

انتہائی قبل از وقت پیدا ہونے والا بچوں (32 ہفتوں کے حمل کے بعد) کے لیے، ویکسینیشن کے وقت شیر خوار بچے کے وزن کے مطابق پیراسیٹامول کو آپ کے ڈاکٹر کی جانب سے تجویز کیا جانا چاہیے۔ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور تجویز کردہ ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

مجھے کونسی پیراسیٹامول پروڈکٹ استعمال کرنی چاہیے؟

آپ کو اورل انفینٹ پیراسیٹامول سسپنشن استعمال کرنا چاہیے۔ یہ پیراسیٹامول شیر خوار اور چھوٹے بچوں کے لیے مائع کی شکل میں آتی ہے۔ اس کی طاقت 120mg/5ml ہوتی ہے۔

اگر آپ کے پاس پہلے سے گھر پر شیر خوار بچوں کے لیے پیراسیٹامول نہ ہو، تو آپ کو اپنی مقامی فارمیسی یا سپر مارکیٹ سے لے کر رکھ لینی چاہیے تاکہ آپ ویکسینیشن کے ایک گھنٹے کے اندر اندر پیراسیٹامول کی ایک خوراک اسے پلا سکیں۔ بہت سی پروڈکٹس ہیں جن میں سے انتخاب کیا جاسکتا ہے لیکن شیر خوار بچوں کے لیے انفینٹ پیراسیٹامول سسپنشن 120mg/5ml درکار ہوتا ہے۔

نوٹ: جونیر پیراسیٹامول (6 پلس) انفینٹ پیراسیٹامول (250mg/5ml) سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور اسے چھوٹے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

کونسی ویکسینیشن کے بعد مجھے اپنے بچے کو پیراسیٹامول دینی چاہیے؟

بچوں کے لیے MenB ویکسینیشن کے بعد پیراسیٹامول کی ہدایت دی جاتی ہے۔ MenB ویکسین عام طور پر آپ کے بچے کو پہلی اور دوسری حفاظتی ٹیکوں کی ملاقات کے دوران 8 اور 12 ہفتے کی عمر میں دی جاتی ہے۔

میرے بچے کو حال ہی میں MenB ویکسین لگی ہے، اب مجھے کیا توقع رکھنی چاہیے؟

بخار ویکسین لگوانے کے بعد آنا عام بات ہے، لیکن یہ زیادہ تر اُس وقت ہوتا ہے جب MenB ویکسین (Bexsero) دیگر معمول کی ویکسینز کے ساتھ 8 اور 12 ہفتے کی عمر میں دی جاتی ہے۔ پیراسیٹامول کے بغیر، آدھ سے زیادہ شیر خوار بچوں کو ان ویکسینز کے بعد بخار ہوگا۔ ویکسینیشن کے بعد اندازاً 6 گھنٹوں میں بخار اپنے عروج پر ہوتا ہے اور 2 دن کے اندر اندر یہ تقریباً ہمیشہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بخار ظاہر کرتا ہے کہ بچے کا مدافعتی نظام ویکسین پر ردعمل کر رہا ہے، تاہم بخار کی سطح پر بچے کے لحاظ سے ہوگی اور یہ اس بات کی علامت نہیں ہوتا کہ ویکسین آپ کے بچے کو کتنے عمدہ طریقے سے محفوظ بنائے گی۔

میں بخار کا خطرہ کیسے کم کرسکتا ہوں؟

ویکسینیشن کے فوراً بعد پیراسیٹامول دینا اور بخار چڑھنے کا انتظار نہ کرنا - آپ کے بچے بخار میں مبتلا ہونے کا خطرہ کم کر دے گا۔ پیراسیٹامول کے ساتھ، 5 میں سے 1 سے بھی کم بچوں کو بخار ہوگا اور تقریباً سبھی کو معتدل درجے (39°C سے کم) میں ہوتا ہے۔ پیراسیٹامول سے آپ کے بچے میں بے چینی یا بے آرامی (جیسے کہ انجکشن کے مقام پر درد) کا امکان بھی کم ہوگا۔

ابتدائی MenB ویکسینیشن (عام طور پر 8 اور 12 ہفتے کی عمر میں) کے بعد استعمال کے لیے بچوں کے پیراسیٹامول سسپنشن (120mg/5ml) کی خوراک اور وقت۔

بچے کی عمر	6 ماہ تک کی عمر (عام طور پر 8 اور 12 ہفتے پر)
خوراک 1	ایک 2.5ml (60mg) خوراک ویکسینیشن کے بعد جلد از جلد
خوراک 2	ایک 2.5ml (60mg) خوراک پہلی خوراک کے 4 سے 6 گھنٹے بعد
خوراک 3	ایک 2.5ml (60mg) خوراک دوسری خوراک کے 4 سے 6 گھنٹے بعد

اس کتابچے میں دی گئی ہدایت کا اطلاق صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے بچے کو MenB ویکسین دی گئی ہو۔ اگر آپ کے بچے کو کسی اور وقت میں بخار ہو، تو آپ کو پروڈکٹ کی پیکیجنگ اور مریض کے معلوماتی پرچے پر درج ہدایات اور مقدارِ خوراک پر عمل کرنا چاہیے۔

دیگر عمومی سوالات:

کیا پیراسیٹامول پلانے کے لیے مجھے اپنے بچے کو نیند سے جگانا چاہیے؟

آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ MenB ویکسین کے بعد جتنی جلدی ہو سکے پیراسیٹامول کی پہلی خوراک پلا دیں۔ تاہم، اگر اگلی خوراکیوں کے وقت آپ کا بچہ سو رہا ہو تو اسے مت جگاؤ۔ یہ خوراک آپ کے بچے کے جاگنے کے بعد دے سکتے ہیں، تاہم ہر دو خوراکیوں کے مابین کم از کم 4 گھنٹے کا وقفہ ہو چکا ہو۔

کیا چھوٹے بچوں کو پیراسیٹامول دینا ٹھیک ہے؟

پیراسیٹامول 2 ماہ کی عمر کے بعد سے بچوں میں بخار سے آرام کے لیے منظور شدہ ہے۔ پیک میں موجود مریض کے معلوماتی پرچے میں درج ہوسکتا ہے کہ 2 سے 3 ماہ کے بچوں کو ڈاکٹر یا فارماسٹ سے بات کرنے سے پہلے صرف 2 خوراکیں دی جانی چاہئیں۔

اگرچہ پیراسیٹامول بہت چھوٹے بچوں کو دینا محفوظ ہے، تاہم پیکیجنگ پر ہدایت درج ہوتی ہے تاکہ والدین وجہ سمجھ میں نہ آنے والے بخار میں بچے کو پیراسیٹامول دینے سے گریز کریں۔ ایسا بخار سنگین انفیکشن کی علامت ہوسکتا ہے اور بہت عرصے تک اس سے علاج کرنا والدین کے لیے طبی مدد حاصل کرنے میں تاخیر پیدا کرسکتا ہے۔

اگرچہ ویکسینیشن کے بعد بخار ہونا عام بات ہے، تاہم ماہرین نے ہدایت کی ہے کہ طبی مدد حاصل کیے بغیر MenB ویکسین کے بعد 48 گھنٹوں تک پیراسیٹامول دینا ٹھیک ہے۔

اگر پیراسیٹامول کی 3 خوراکیں پلانے کے بعد بھی میرے بچے کو بخار رہے تو کیا کرنا ہوگا؟

بعض بچوں کو ویکسینیشن، حتیٰ کہ پیراسیٹامول کی 3 خوراکیں پلانے کے بعد بھی بخار ہوسکتا ہے۔ ویکسینیشن کے بعد 48 گھنٹوں کے اندر، اگر آپ کے بچے کو اب بھی بخار ہو لیکن وہ عمومی طور پر ٹھیک ہو، تو آپ کے بچے کو بچوں کے پیراسیٹامول سسپنشن (120mg/5ml) کی وہی 2.5 (60mg) ml خوراک دینا جاری رکھ سکتے ہیں۔

• آپ کو دوا کی خوراکیوں کے درمیان ہمیشہ کم از کم 4 گھنٹوں کا وقفہ دینا چاہیے اور 24 گھنٹوں کے دوران بچے کو بھی 4 خوراکیوں سے زیادہ نہ دیں۔

آپ کو اپنے بچے کو ٹھنڈا بھی رکھنا چاہیے یہ یقینی بناتے ہوئے کہ ان پر بہت زیادہ کپڑے یا کمبل نہ ہوں، اور انہیں پینے کے لیے مشروب خوب دیں۔ اگر آپ بچہ ماں کے دودھ پر ہو، تو بہترین مشروب ماں کا دودھ ہے۔

• اگر کسی بھی موقع پر آپ بچے کی صحت کے حوالے سے پریشان ہوں، تو اپنے فطری وجدان پر بھروسہ کریں اور مشورے کے لیے اپنے جی پی سے بات کریں یا برطانیہ میں NHS کو 111 پر اور ویلز میں 0845 46 47 پر کال کریں۔

• اگر ویکسینیشن کے 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی آپ کے بچے کو بخار ہو تو آپ کو اپنے جی پی سے بات کرنی چاہیے یا مشورے کے لیے برطانیہ میں NHS کو 111 پر اور ویلز میں 0845 46 47 پر کال کرنی چاہیے۔

اس دورانے میں بخار ہونے کی وجہ انفیکشن کے بجائے ویکسین ہونے کا کافی زیادہ امکان ہوتا ہے۔ پیراسیٹامول آپ کے بچے کو بہتر محسوس کرنے میں مدد دے گی اور اس میں ضرورت سے زیادہ خوراک دینے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے بشرطیکہ آپ 24 گھنٹے کے دورانے میں 2.5ml کی 4 سے زائد خوراکیں نہ دیں۔

مینوفیکچر کے مریض کے معلوماتی کتابچے (PIL) میں مختلف معلومات کیوں شامل ہوتی ہیں؟

آپ کو اپنی خریدی گئی پیراسیٹامول کی سپلائی میں مریض کا معلوماتی کتابچہ (PIL) ملے گا۔ انفینٹ پیراسیٹامول سسپنشن 120mg/5ml میں موجود PIL میں مقدارِ خوراک کی ہدایات MenB ویکسینیشن کے بعد استعمال کے لیے ماہرین کی تجاویز سے مختلف ہوسکتی ہیں۔ یہاں، اس کتابچے میں، ہم MenB ویکسینیشن کے بعد پیراسیٹامول کے استعمال کے لیے مخصوص تجاویز کی تفصیلات فراہم کرتے ہیں۔ پیراسیٹامول پروڈکٹ کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے، براہ کرم مینوفیکچرر کا PIL ملاحظہ کریں۔

کیا میرے بچے کو 12 ماہ میں بوسٹر ویکسینیشن کے ساتھ پیراسیٹامول کی ضرورت ہے؟

12 ماہ کی عمر تک، MenB ویکسین کے بعد بچے میں بخار کا خطرہ دوسری ویکسین جیسا ہوتا ہے۔ لہذا، آپ کے بچے کو اس کی معمول کی 12 ماہ کی ویکسینیشن کے ساتھ پیراسیٹامول کی 3 خوراکیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم، اگر آپ کے بچے کو گھر پر بخار ہو جائے یا وہ آرام لگے، تو آپ اپنے بچے کو اس کی عمر کے لحاظ سے مقدارِ خوراک کے شیڈول کے مطابق انفینٹ پیراسیٹامول دے سکتے ہیں، یہ شیڈول پیکٹ میں ہدایات پر دیا گیا ہوتا ہے۔

2 سے 3 ماہ کی عمر کے بچوں کو پیراسیٹامول کی 2 سے زائد خوراکیں دینے کی ہدایت کا اطلاق بچے کی MenB ویکسین ہو جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو کسی اور وقت میں بخار ہو، تو آپ کو پروڈکٹ کی پیکیجنگ اور مریض کے معلوماتی پرچے پر درج ہدایات اور مقدارِ خوراک پر عمل کرنا چاہیے۔



www.nhs.uk/vaccinations