



ניצן פֿאַראַסעטאַמאַל צו פֿאַרהיטן און מייכל פיבער נאָך MenB וואַקסאַניישאַן

פֿאַראַסעטאַמאַל איז נישט רוטינלי דארף נאָך די Men B בוסטער וואַקצין געגעבן אין 12 חדשים אלט. אין דעם עלטער די בעיבי ריזיקירן פֿון פיבער איז די זעלבע ווי נאָך אנדערע וואַקסינז.

ווי פיל פֿאַראַסעטאַמאַל זאָל איך געבן?

א גאַנץ פֿון 3 דאָסעס פֿון 2.5מל (60 מג) פֿון פֿאַראַסעטאַמאַל זענען רעקאָמענדירט נאָך MenB וואַקסאַניישאַן. איר זאָל געבן די ערשטער דאָזע אין דער צייט פֿון וואַקסאַניישאַן אָדער ווי באַלד ווי מעגלעך דערנאָך.

איר זאָל געבן די רגע דאָזע פֿון פֿאַראַסעטאַמאַל אַרום 4 צו 6 שעה שפּעטער און אַ דריט דאָזע 4 צו 6 שעה נאָך דעם (זען טיש).

די 2.5מל דאָזע זאָל זיין געמאַסטן און געגעבן אָדער מיט אַ שפּריץ אָדער מיט אַ 2.5מל לעפל (דאָס איז יוזשאַוואַלי דער קליין סוף פֿון די לעפל וואַקס קומט אין די פּאַק).

פֿאַר זייער צו פרי בייביז (געבוירן איידער 32 וואַכן פֿון דזשעסטיישאַן), פֿאַראַסעטאַמאַל זאָל זיין פּריסקרייבד דורך דיין דאָקטער לויט די וואַג פֿון די בעיבי אין דער צייט פֿון וואַקסאַניישאַן. איר זאָל קאָנטראָלירן מיט דיין דאָקטער און נאָכגיין די ינסטראַקשאַן אויף די רעצעפט.

וואַס פֿאַראַסעטאַמאַל פֿראַדוקט זאָל איך נוצן?

איר זאָל נוצן מויל בייביז פֿאַראַסעטאַמאַל סאַספּענשאַן. דעם מין פֿון פֿאַראַסעטאַמאַל קומט אין פּליסיק פֿאַרעם פֿאַר נוצן אין בייביז און יונג קינדער. עס האט אַ שטאַרקייט פֿון 120מג/5מל.

אויב איר האָט נישט באַקומען עטלעכע פֿאַראַסעטאַמאַל סאַספּענשאַן פֿאַר קליינע קינדער אין שטוב, איר זאָל באַקומען עטלעכע פֿון דיין היגע אָפּטייק אָדער סופּערמאַרק אַזוי אַז איר קענען געבן די ערשטער דאָזע פֿון פֿאַראַסעטאַמאַל ין אַ שעה פֿון וואַקסאַניישאַן. עס זענען פֿאַרשידן פֿראַדוקטן צו קלייבן פֿון (אַריינגערעכנט לאַגלען און סאַטשאַץ), אָבער דער טיפּ פֿון בייביז איז פֿאַראַסעטאַמאַל סאַספּענשאַן 120מג/5מל.

(באַמערקונג: יינגער פֿאַראַסעטאַמאַל (6 פּלוס) איז שטאַרקער ווי בייביז פֿאַראַסעטאַמאַל (250מג/5מל) און זאָל ניט זיין געוויינט אין בייביז).

נאָך וואַס וואַקסאַניישאַן זאָל איך געבן מיין בעיבי פֿאַראַסעטאַמאַל?

פֿאַראַסעטאַמאַל איז אַדווייזד פֿאַר דיין בעיבי נאָך די MenB וואַקסאַניישאַן. די MenB וואַקצין איז יוזשאַוואַלי געגעבן ביי דיין בעיבי ערשטער און רגע ימיונאַזיישאַן אָפּיונטמאַנץ אין 8 און 12 וואַכן פֿון עלטער.

מיין בעיבי האט פונקט געהאט די MenB וואַקצין, וואַס זאָל איך דערוואַרטן איצט?

פיבער קענען זיין דערוואַרט נאָך קיין וואַקסאַניישאַן, אָבער איז מער געוויינטלעך ווען די MenB וואַקצין (בעקססעראַ) איז געגעבן מיט די אנדערע רוטינ וואַקסינז אין 8 און 12 וואַכן. אַן פֿאַראַסעטאַמאַל, מער ווי העלפט פֿון קליינע קינדער וועט אַנטוויקלען אַ טעמפּעראַטור נאָך די וואַקסינז. די פיבער טענדז צו שפּיץ אַרום 6 שעה נאָך וואַקסאַניישאַן און איז כמעט שטענדיק ניטאָ גאַר אין 2 טעג. די פיבער ווייזט אַז די בעיבי ימיון סיסטעם ריספּאַנד צו די וואַקצין, כאָטש די פיבער מדרגה וועט אָפּגענגען אויף יעדער קינד און טוט נישט ווייזן ווי געזונט די וואַקצין וועט באַשיצן דיין בעיבי.

ווי אזוי קען איך רעדוצירן די ריזיקירן פֿון פיבער?

געבן פֿאַראַסעטאַמאַל באַלד נאָך וואַקסאַניישאַן - און ניט וואַרטן פֿאַר אַ פיבער צו אַנטוויקלען - וועט רעדוצירן די ריזיקירן פֿון דיין קינד מיט פיבער. מיט פֿאַראַסעטאַמאַל, ווייניקערע ווי 1 פֿון 5 קינדער וועט באַקומען פיבער און כמעט אלע פֿון זיי זענען מילד (אונטער 39°C). די פֿאַראַסעטאַמאַל וועט אויך רעדוצירן די געלעגנהייט פֿון דיין בעיבי איז יראַטאַבאַל אָדער צאָרעס ומבאַקוועמקייט (אַזאָ ווי ווייטיק אין די פּלאַץ פֿון די ינדזשעקשאַן).

דאָסאַדזש און טיימינג פֿון בייביז פֿאַראַסעטאַמאַל סאַספּענשאַן (120מג/5מל) פֿאַר נוצן נאָך ערשטיק MenB וואַקסאַניישאַן (יוזשאַוואַלי אין 8 און 12 וואַכן פֿון עלטער)

עלטער פֿון בעיבי	אַרויף צו 6 חדשים (יוזשאַוואַלי אין 8 און 12 וואַכן)
דאָזע 1	איין 2.5מל (60מג) דאָזע ווי באַלד ווי מעגלעך נאָך וואַקסאַניישאַן
דאָזע 2	איין 2.5מל (60מג) דאָזע 4-6 שעה נאָך דער ערשטער דאָזע
דאָזע 3	איין 2.5מל (60מג) דאָזע 4 צו 6 שעה נאָך די רגע דאָזע

די עצה אין דעם בלאט אפלייז בלויז אויב דיין בעיבי האט די MenB וואקצין. אויב דיין בעיבי האט פיבער אין קיין אנדערע צייט איר זאל נאכגיין די ינסטראקשאנז און דאזע עצה אויף די פראדוקט פאקאגאניג און פאציענט אינפארמאציע בלאט.

פיבער אין דעם צייט-פעריאד איז פיל מער מסתמא צו זיין געפירט דורך דער וואקצין ווי דורך אן אינפעקציע. די פאראסטאמאל וועט אויך מאכן דיין קינד פילן בעסער, און עס איז קיין ריזיקירן פון א אווערדאזע אויב איר געבן ניט מער ווי 4 2.5 מל דאסעס אין קיין 24 שעה פעריאד.

פארוואס כולל דער פאבריקאנט ס פאציענט אינפארמאציע בלאט (PIL) פארשידענע אינפארמאציע?

איר וועט געפינען א פאציענט אינפארמאציע בלאט (PIL) אין די צושטעלן פון פאראסטאמאל איר קויפן. די PIL מיט די בייביז פאראסטאמאל סאספענשאן 120מג/5מל קען צושטעלן פארשידענע דאזשינג ינסטראקשאנז פון די רעקאמאנדיישאנז פון עקספערץ פאר נוצן נאך MenB וואקסאניישאן. דא, אין דעם בלאט, מיר געבן די דעטאילס פון די ספעציפיש רעקאמאנדיישאנז פאר די נוצן פון פאראסטאמאל נאך א MenB וואקסאניישאן. פאר פול אינפארמאציע וועגן די פאראסטאמאל פראדוקט, ביטע זען די מאניאפאקטשערער PIL.

טוט מיינ בעיבי דארפן פאראסטאמאל מיט די בוסטער וואקסאניישאנז אין 12 חדשים?

אין די עלטער פון 12 חדשים דיין בעיבי ריזיקירן פון פיבער נאך MenB וואקצין איז די זעלבע ווי מיט די אנדערע וואקסאניזאציע. דיין בעיבי טוט נישט דארפן צו נעמען 3 דאסעס פון פאראסטאמאל מיט זייער רוטין 12 חודש וואקסאניישאנז. אָבער, אויב דיין בעיבי טוט באקומען פיבער אין שטוב אָדער סימז צו זיין אין ומבאקוועמקייט, איר קענען געבן דיין בייבי פאראסטאמאל ניצן די דאזשינג פלאן פאר א קינד פון דעם עלטער ווי אוטליינד אויף די ינסטראקשאנז אין די פאקאט.

אנדערע פראסט פראגעס:

זאל איר וועקן מיינ בעיבי צו געבן פאראסטאמאל?

איר זאל שטענדיק פרובירן און געבן די ערשטער דאזע פון פאראסטאמאל ווי באלד ווי מעגלעך נאך די MenB וואקצין. אָבער, אויב דיין בעיבי איז סליפינג ווען די ווייטער דאסעס זענען רעכט, וועק זיי נישט אויף. איר קענען געבן עס ווען די בעיבי ווייטער ווייקס ווי לאנג ווי עס איז ביי מינדסטער 4 שעה צווישן יעדער דאזע.

איז עס אָוקיי פאר קליין בייביז צו האָבן פאראסטאמאל?

פאראסטאמאל איז באווייליקט פאר אָנפירונג פיבער אין קינדער פון די עלטער פון 2 חדשים. די פאציענט אינפארמאציע בלאט וואָס קומט מיטן פאק קען זאָגן אז קינדער פון 2 ביז 3 חדשים אַלט זאָלן נאָר באַקומען 2 דאָסעס איידער זיי רעדן מיט אַ דאָקטער אָדער אַפּטייקער.

כאָטש פאראסטאמאל איז זיכער אין זייער יונג קינדער, די עצה אויף די פאקאגאניג איז דאָרט צו ויסמיידן עלטערן געבן פאראסטאמאל צו א קינד מיט אן אַניקספּליינד פיבער. אזא אַ פיבער קען זיין אַ צייכן פון אַ ערנסט ינפעקציע און באַהאַנדלונג פון דעם צו לאַנג קען פאַרהאַלטן אַ פּאָטער וואָס זוכט מעדיציניש הילף.

ווי פיבער נאך וואקסאניישאן איז פראסט, אָבער, עקספערץ אָדווייז אז עס איז אָוקיי צו געבן פאראסטאמאל ביז 48 שעה נאך די MenB וואקצין און זוכן מעדיציניש עצה.

וואָס אויב מיינ בעיבי נאך האט א פיבער נאך געהאט די 3 דאסעס פון פאראסטאמאל?

עטלעכע בייביז קען נאך אנטוויקלען פיבער נאך וואקסאניישאן, אפילו נאך 3 דאסעס פון פאראסטאמאל. אין די 48 שעה נאך וואקסאניישאן, אויב דיין בעיבי נאך האט א פיבער אָבער איז אנדערש געזונט, איר קענען פארזעצן צו געבן דיין בעיבי די זעלבע 2.5 מל דאזע (60מג) פון בייביז פאראסטאמאל (120מג/5מל) סאספענשאן.

• איר זאל שטענדיק לאָזן ביי מינדסטער 4 שעה צווישן דאסעס און קיינמאל געבן מער ווי 4 דאסעס אין קיין 24 שעה צייט.

איר זאל אויך האלטן דיין בעיבי קיל דורך מאכן זיכער זיי טאן ניט האָבן צו פילע לייערס פון קליידער אָדער בלאנגקאץ, און געבן זיי אַ פּלאַץ פון פּלויזס. אויב דיין בעיבי איז ברוסט-פאסטעכער, דער בעסטער פליסיק צו געבן איז ברוסט מילך.

• אויב איר זענט זארגן וועגן דיין בעיבי געזונט אין קיין צייט, צוטרוי דיין ינסטינגקאָ און רעדן צו דיין גפ אָדער רופן NHS 111 אין ענגלאַנד און 0845 46 47 אין וואַלעס פאַר עצה.

• אויב דיין בעיבי נאך האט א פיבער מער ווי 48 שעה נאך וואקסאניישאן, איר זאל רעדן צו דיין גפ אָדער רופן NHS 111 אין ענגלאַנד און 0845 46 47 אין וואַלעס פאַר עצה.

די עצה צו געבן מער ווי 2 דאסעס פון פאראסטאמאל צו בייביז אַלט 2 צו 3 חדשים אפלייז בלויז נאך די בעיבי האט די MenB וואקצין. אויב דיין בעיבי האט פיבער אין קיין אנדערע צייט, איר זאל נאכגיין די ינסטראקשאנז און דאזע עצה אויף די פראדוקט פאקאגאניג און פאציענט אינפארמאציע בלאט.



www.nhs.uk/vaccinations