



UK Health
Security
Agency

NHS **CARE**

د 2024 کال په پسرلي کې د کووېډ-19 د واکسينو د کمپاين په هکله لارښود



سړ کال پسرلي کې به د کورونا (کووېډ-19) وایروس واکسين د هغو کسانو لپاره چې عمر یې تر 75 لوړ وي، مسن اشخاص چې په کور کې تر پالنه لاندې وي، هر هغه شخص ته چې عمر یې 6 میاشتې یا تر هغې لوړ وي او د بدن دفاعی سیستم یې ضعیف وي، تطبیق شي.

د پسرلي واکسينو د تطبیق مهالوېش

تاسو ته باید د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د واکسينو د تطبیق لپاره نوبت درکړل شي او لومړی باید د هغو اشخاصو سره اړیکه ونیول شي چې کووېډ تر لوړ گواښ لاندې دي. تاسو باید د خپل وروستي دوز واکسينو له تطبیق وروسته حداقل 6 میاشتې وروسته خپل واکسين تطبیق کړئ، لېکن 3 میاشتې وروسته د لومړي دوز له تطبیق څخه هم دا کار کولی شئ.

که چېرې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ ستاسو د عمر 75 کالونه پوره کېږي، نو اړتیا نه لرئ چې خپلې دقیقې کلیزې ته په تمه شئ، او کولی د غوښتنې په صورت کې په همدې موده کې خپل واکسين ترلاسه کړئ.

دغه منگني واکسين د کومو اشخاصو لپاره

توصیه کېږي؟

د کووېډ-19 ناروغي په موسنو او هغو اشخاصو کې چې ناوړه روغتیايي حالت لري، ډېره جدي او شدیدې وي. له همدې امله هغو اشخاصو ته چې 75 کاله او تر دې ډېر عمر لري، په کور کې تر پالنه لاندې دي، هغو ماشومانو ته چې 6 میاشتې او تر دې ډېر عمر لري او تر گواښ لاندې دي، په دغه پسرل پروگرام کې د کووېډ-19 واکسينو دوز توصیه کېږي.

جدي جانبي عوراض: د کووېډ-19 Pfizer او Moderna

دواړو واکسينو له تطبيق وروسته د زړه د پړسوب په اړه (چې myocarditis يا pericarditis هم ورته وايي)، ځينې راپورونه ثبت شوي دي. دا ډول موارد په ځوانو نارينه وو کې د واکسينو له تطبيق څو ورځې وروسته ليدل شوي دي. په دغو اعراضو او علائمو ډېری اخته کسان له استراحت او ساده درملنې وروسته ژر د خوښۍ احساس کړی او بېرته روغ شوي دي. که چېرې د واکسينو له تطبيق وروسته لاندې ستونزې تجربه کوئ، نو بايد فوراً د طبي مشورې په لټه کې شئ:

• د سينې درد

• سالتدي

• د زړه ضريان ډېرېدل، د زړه لړزه يا رېږدل

که چېرې تاسو د خپلو واکسينو د پخوانيو دوزونو سره شديد جانبي عوارض پيدا کړي وي، کولی شئ په دې اړه مشوره ترلاسه کړئ چې آیا د واکسينو له تطبيق ډډه وکړئ يا يې په تعلق کې واچوئ. تاسو بايد په دې اړه د خپل ډاکټر يا متخصص سره مشوره وکړئ. مهرباني وکړئ د جانبي عوارضو په اړه د رپورټ ورکولو لپاره د لارښود شاتنۍ برخه وگورئ.

تاسو بايد څه وکړئ که تاسو د خپل ټاکل کيدو په ورځ ښه نه ياست؟

که چېرې ناروغ ياست، نو په تمه شئ ترڅو بېرته روغ شئ، او له هغې وروسته بيا خپل واکسين تطبيق کړئ. که چېرې تبه لرئ، او يا فکر کوئ چې ممکن نورو کسانو ته ساري ناروغي انتقال کړئ، نو په دې حالت کې بايد خپل ملاقات ته حاضر نه شئ

آيا د واکسينو له تطبيق وروسته هم په کووېډ-19 ناروغۍ اخته کېدی شئ؟

د کووېډ-19 واکسينو په تطبيق سره به سړ اوړی په ياده ناوروغۍ باندې د اخته کېدو گواښ راکم شي. دا به څو ورځې وخت ونيسي چې ستاسو بدن د يادې ناروغۍ پروراندې يو څه اضافي مصنوعي رامنځ ته کړي. لکه د نورو ټولو درملو په شان هېڅ ډول واکسين بشپړ مؤثریت نه لري. ځينې اشخاص ممکن د واکسينو د تطبيق سربېره په کووېډ-19 ناروغۍ اخته شي، خو کېدی شي دغه ناوروغۍ په هغوی باندې آسانه تېره شي.

که چېرې تاسو خپل هېڅ ډول واکسين نه وي تطبيق کړي

که چېرې مو د خپلو واکسينو لومړي دوه دوزونه نه وي ترلاسه کړي (او يا مو د ضعيف دفاعي سيستم د لرلو لپاره خپل درېيم دوز نه وي ترلاسه کړی)، نو بايد په دې موسمي کمپاين کې واکسين ترلاسه کړئ. که چېرې د واکسينو د تطبيق لپاره په شرايطو برابر ياست او خپل تېر دوز مو نه وي ترلاسه کړی، نو بايد د جبران لپاره يې په سړ پسرلي کې دا واکسين ترلاسه کړئ. ډېری اشخاص د خپلو تېرو واکسينو د جبران لپاره اضافي دوزونو ته اړتيا نه لري. که چېرې مو د بدن دفاعي سيستم ډېر ضعيف وي، نو ستاسو ډاکټر ممکن تاسو ته توصيه وکړي چې د پسرلي له واکسينو 3 مياشتو وروسته يو اضافي دوز هم ترلاسه کړئ.

آيا د واکسينو له تطبيق وروسته بايد په تمه شم؟

که چېرې مو په تېرو وختونو کې حساسيت لرلی وي، او يا مو که چېرې د تېر دوز له تطبيق وروسته شديد عکس العمل لرلی وي، نو ممکن تاسو ته سپارښتنه وشي چې د واکسين له تطبيق وروسته د 15 دقيقو لپاره هملته په تمه شئ. لطفاً حتماً دا موضوع د واکسينو له تطبيقونکي سره شريکه کړئ.



تاسو ته به کوم ډول واکسين وړاندې کېږي؟

تاسو ته به په بریتانیا کې د Moderna یا Sanofi، Pfizer د خوا تولید شوی واکسين درکړل شي. دا واکسينونه د لومړنيو اصلي واکسينو وروسته نوي شوي دي او د کووېډ-19 د يوې بلې مختلفې نوعې د مخنيوي لپاره استفاده کېږي. دا نوي تازه شوي واکسين ستاسو د بدن معافيت لا لوړوي، او د کووېډ-19 د ترټولو نوې بڼې (اوميكرون) پر وړاندې ستاسو په بدن کې انتي باډي توليدوي.

موږ نه پوهېږو چې په سږ پسرلي او اوري کې به د کووېډ-19 کومه بڼه ډېره شايع وي. د واکسينو او معافيت گډې کمېټې (JCVI) پټېلې ده چې سږ کال هم بايد د 2023 کال د وروستيو اونيو مشابه پروگرام دا ځل هم تطبيق شي.

لطفا ژر تر ژره خپل هغه د واکسينو پروگرام قبول کړئ چې تاسو ته وړاندې شوی دی - تاسو ته به په سم وخت کې سم واکسين وړاندې شي.

کوم اشخاص نه شي کولی د پسرلي واکسين

تطبيق کړي

خورا کم شمېر کسان شته چې نه شي کولی دغه واکسين تطبيق کړي. که چېرې تاسو د خپلو واکسينو د پخوانيو دوزونو سره شديد حساسيت کړی وي، نو بايد په دې د خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ.

جانبی عوارض

معمول جانبي عوارض: د خپل پخواني دوز واکسينو په شان، د دغه واکسين عامه جانبي عوارض د کووېډ-19 د نورو ټولو واکسينونو لکه د سږ مېني واکسينو د ټولگې په شان دي، او په دغو جانبي عوارضو کې لاندې موارد شامل دي:

- په ځنګل او د پېچکارۍ د تطبيق په ځای کې بد احساس او سوروالی - چې دغه سوروالی ښايي د واکسينو له تطبيق وروسته له يوې تر دوو ورځو پورې شديد وي

- د ستړيا احساس

- سر درد

- معمولي دردونه يا والګي ته ورته خفيف اعراض او علائم

د دې لپاره چې د واکسينو له تطبيق وروسته ښه احساس ولرئ، کولی شئ استراحت وکړئ او پرستامول وخورئ (په دې اړه په واکسينو باندې د توليدي مرجع لخوا مندرجه سپارښتنې وګورئ).

د واکسينو له تطبيق وروسته جانبي عوارض معمولا له يوې اونۍ څخه کم دوام کوي. که چېرې مو علايم شديد شول او يا مو اندېښنه پيدا شوه، کولی د 111 شمېرې له لارې NHS ته زنګ ووهئ او يا 111 18001 شمېرې ته زنګ ووهئ/پيغام واستوئ.

همدارنګه کولی شئ د Yellow Card له سيستم څخه استفاده وکړئ ترڅو د خپلو مشکولو جانبي عوارضو په هکله موږ ته خبر راکړئ.



کووېډ-19: په پسرلي کې د واکسينو د تطبيق د کمپاين لارښود

اضافي معلومات

تاسو کولی شئ د نورو معلوماتو لپاره لاندې د کووېډ-19 اړونده لارښوونې تعقیب کړئ

د لویانو لپاره د کووېډ-19 لارښود

د کووېډ-19 واکسینو تطبیق: هغه مېرمنې چې ماشومان لري، فعلا مېدواره وي یا ماشوم ته شیدې ورکوي

د کووېډ-19 واکسینو تطبیق د هغو اشخاصو لپاره لارښود چې د بدن کمزوری دفاعي سیستم لري

د کورونا وایروس تقویتی دوز واکسین په NHS.UK کې وگورئ

د واکسینو له تطبیق وروسته د ممکنه پېښو په اړه معلوماتي لارښود د ډونلوډ یا غوښتنې لپاره د لاسرسي وړ دی.

د خپلو واکسینو په اړه د نورو جزئیاتو لکه د ممکنه جانبي عوارضو په اړه په بریتانیا کې د مېشتو کسانو لپاره د Moderna, Pfizer یا نورو واکسینو تولیدي مراجعو لخوا چمتو شوی معلوماتي لارښود ولولئ.

تاسو به د خپل تقویتی دوز واکسین د تطبیق لپاره دعوت شئ، او دا واکسین ممکن ستاسو GP تاسو ته وړاندې کړي او یا یې هم کولی شئ NHS اپلیکېشن له خوا بوک کړئ.



همدارکه کولی شئ د واکسینو د ترټولو نږدې مرکز په وېبسایټ کې پیدا کړئ www.nhs.uk/vaccine-walk-in



همدارنګه کولی شئ د خپلو مشکوکو جانبي عوارضو په هکله د Yellow Card وېبسایټ له طریقې خبر ورکړئ او یا (له دوشنبه تر جمعي د سهار له 9 څخه د مازدګیر تر 5 پورې) د 0800 731 6789 شمېرې له لارې اړیکه ونیسئ، همدارنګه دا کار د Yellow Card د اپلیکېشن د ډونلوډولو له لارې هم ترسره کولی شئ.

www.mhra.gov.uk/yellowcard



This leaflet is also offered as a translated version in Albanian, Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese, Chinese (simplified), Estonian, Hindi, Italian, Gujarati, Latvian, Lithuanian, Polish, Panjabi, Pashto, Russian, Spanish, Somali, Turkish, Tigrinya, Ukrainian, Urdu and Yoruba. It is available as a BSL video, braille and large print. Please visit www.healthpublications.gov.uk or call 0300 123 1002 to order more copies.