

אַ וועגווייזער פֿאַר אימוניזאַציעס

אין איין יאָר פון עלטער



פֿעיקייטן אימוניזאַציעס פלאַן פֿון
סעפטעמבער 2024

די קינדשאַפֿט ימיוניזאַטיאָן פּראָגראַם

געדענק צו ברענגען דיין רויט בוך פון ימיוניזאַטיאָן
מיט איר צו יעדער אַפּוינטמאַנט



קאפּיעס פון די ביכלעך זענען בארעכטיגט פון דיין
קליניק אָדער דאָקטער'ס כירורגיע. זען אויך
www.nhs.uk/vaccinations

דער בוקלעט פֿעיקייטן די ימיוניזאַטיאָן פּלאַן פֿון
סעפטעמבער 2024

קיצער

וואָס אימוניזאַציעס וועט מיין בעיבי האָבן ביי איין יאָר אַלט?

דיין בייבי וועט האָבן 4 ינדזשעקשאַנז אין זייער איין יאָר וואַקסאַניישאַן וויזיט אַרײַנגערעכנט:

- זייער **MenB** בוסטער וואַקסאַניישאַן
- א **Hib/MenC** וואַקסאַניישאַן קעגן:
 - Hib (העמאָפּילוס ינפּלוענציע טיפּ b), און
 - מענינגאָקאָקאַל גרופּע C קרענק (MenC)
- אַ **13PCV** בוסטער וואַקסאַניישאַן קעגן:
 - פּנעומאָקאָקאַל קרענק געפּירט דורך
 - עטלעכע טייפּס פון פּנעומאָקאָקאַל באַקטיריאַ
- זייער ערשטע **MMR** וואַקסאַניישאַן קעגן:
 - מיזעלס
 - מאַמפּס
 - רובעללאַ



אימוניזאציעס אין איין יאָר אַלט

פּראָטעקטינג קעגן Hib, מענינגאָקאָקאָל גרופּעס B און C קרענק, פּנעומאָקאָקסי קרענק, מיזעלס, מאַמפּס און רובעלאַ

וואָס איז Hib?

Hib איז אַ ינפּעקציע וואָס קען פירן צו אַ נומער פון הויפט קראַנקייט אַזאַ ווי מענינגיטיס (אַנצינדונג פון די ונטערשלאַק פון דעם מאַרן), סעפטיסעמיאַ (בלוט פאַרסאַמונג) און לונגען-אַנצינדונג, ספּעציעל אין יונג קינדער.

די Hib/MenC וואַקצין איז גערופֿן Menitorix, איר קענט זען די פּאַציענט אינפֿארמאַציע בלאַט אין www.medicines.org.uk/emc/product/167/pil.

וואָס איז מענינגאָקאָקאָל קרענק?

מענינגאָקאָקאָל קרענק איז אַ ערנסט ינפּעקציע וואָס קען אויך גרונט מענינגיטיס און סעפטיסעמיאַ אין קינדער און יונג מענטשן.

גרופּע B מענינגאָקאָקאָל באַקטיריאַ (MenB) זענען דערווייל פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר רובֿ קאַסעס פון מענינגאָקאָקאָל קרענק אין UK, בשעת מענינגאָקאָקאָל גרופּע C (MenC) קרענק איז איצט ומגעוויינטלעך ווייל רובֿ יונגע קינדער און טיניידזשערז זענען רוטינלי וואַקסאַניטיד קעגן MenC.

די MenB וואַקצין איז גערופֿן Bexsero, איר קענען זען די פּאַציענט אינפֿארמאַציע בלאַט ביי www.medicines.org.uk/emc/product/5168/pil.

וואָס וואַקסינד וועט ווערן געניצט?

דיין קינד וועט האָבן אַ דאָזע פון אַ קאַמביינד Hib/MenC וואַקצין ווי געזונט ווי אַ בוסטער דאָזע פון אַ MenB וואַקצין. די וואַקסינד וועט ווערן געגעבן אין די מוסקל פון די דרך אָדער אויבערשטער אָרעם.

פארוואס דאַרף מײן קינד בוסטער וואַקסינד?

בוסטער וואַקסינד זענען געגעבן צו פאַרגרעסערן די שוץ שוין געגעבן דורך די אימוניזאַציעס דיין בעיבי האט געהאט פריער. דער שוץ געפֿינט דורך די בייביז וואַקסאַניישאַנז קענען טראָגן אַוועק נאָך עטלעכע מאָל. א בוסטער דאָזע יקסטענדז די שוץ פעריאָד אין שפעטער לעבן.

וועט די Hib/MenC און MenB וואַקסינד האָבן קיין זייט יפעקץ?

דיין קינד קען האָבן רעדנאַס, געשווילעכץ אָדער צערטלעכקייט ווו זיי האָבן די ינדזשעקשאַן. בערערך האַלב פון די קינדער וואָס האָבן די וואַקסינד קען זיין יראַטאַבאַל, און עטלעכע באַקומען אַ מילד היץ. איר קענט באַקומען מער אינפֿאַרמאַציע וועגן דעם פון דיין GP, פראַקטיסיז ניאַניע אָדער געזונט-באַזוכער.



וואָס איז פּנעוּמאָקאָקאַסי קרענק?

פּנעוּמאָקאָקאַל קרענק איז איינער פון די מערסט פּראָסט סיבות פון באַקטיריאַל מענינגיטיס אין קינדער, אָבער עס אויך ז סעפטיקעמיאַ, לונגען-אַנצינדונג, אויער ינפעקטיאָנס (otitis media) און אנדערע ערנסט קראַנקייט. עס זענען מער ווי 90 פּאַרשידענע טייפּס פון פּנעוּמאָקאָקאַל באַקטיריאַ.

וואָס וואַקצין וועט זיין געוויינט?

די וואַקצין געניצט איז אַ בוסטער דאָזע פון 13PCV (פּנעוּמאָקאָקאַל קאָנדזשוגאַטע וואַקצין) וואָס פּראָטעקץ קעגן 13 פּאַרשידענע טייפּס פון פּנעוּמאָקאָקוס וואָס רובֿ קאַמאַנלי פּאַרשאַפן פּנעוּמאָקאָקוס קרענק אין קינדער. די וואַקצין וועט זיין געגעבן אין די מוסקל פון די דיך אָדער אויבערשטן אָרעם אין דער זעלביקער וויזיט ווי די Hib/MenC און MenB וואַקסינז.

וועט די PCV וואַקצין האָבן קיין זייט ווירקונג?

פון 10 וואַקסאַנייטיד בייביז, 1 אָדער 2 קען באַקומען געשווילעכץ, רעדנאָס אָדער צערטלעכקייט אין די ינדזשעקשאַן פּלאַץ אָדער באַקומען אַ מילד היץ. די PCV וואַקצין איז גערופֿן 13 Prevenar, איר קענען זען די פּאַציענט אינפֿאָרמאַציע בלאַט www.medicines.org.uk/emc/product/453/pil.

וואָס איז מיזעלס?

מיזעלס זענען געפֿירט דורך אַ זייער ינפעקטיאָוס ווירוס. כּמעט אַלעמען וואס כּאַפט עס וועט האָבן אַ הויך היץ, אַ ויסשיט און אין אַלגעמיין זיין קראַנק. די קאַמפּלאַקיישאַנז פון מיזעלס אַרײַננעמען קאַסטן ינפעקשאַנז, פיץ (סיזשערז), ענסעפּאַליטיס (ינפעקציע פון דעם מאַרך), און מאַרך שעדיקן. אין זייער ערנסט פאלן, מיזעלס קענען טייטן.

וואָס איז מאַמפּס?

מאַמפּס איז געפֿירט דורך אַ ווירוס וואָס קען פירן צו היץ, קאָפּווייטיק און ווייטיקדיק געשוואָלן גלאַנדז אין די פנים, האַלדז און קין. עס קען רעזולטאַט אין שטענדיק טויב, וויראַל מענינגיטיס און ענסעפּאַליטיס (אַנצינדונג און געשווילעכץ פון דעם מאַרן).

וואָס איז רובעללאַ?

רובעללאַ (דייטשישער מיזעלס) איז אַ קרענק געפֿירט דורך אַ ווירוס. אין קינדער עס איז יוזשאַוואַלי מילד און קענען גיין אַננאָטיסט, אָבער רובעללאַ אין שוואַנגערשאַפט איז זייער ערנסט פֿאַר אַנבאַרן בייביז. עס קען ערנסט שעדיקן זייער דערזען, געהער, האַרץ און מאַרן. דער צושטאַנד איז גערופֿן קאַנדזשענאַטאַל רובעללאַ סינדראָם (CRS).

וואָס איז די MMR וואַקצין?

עס כולל וויקאַנד ווערסיעס פון לייזן מיזעלס, מאַמפּס און רובעללאַ ווירוסעס. ווייל די ווירוסעס זענען וויקאַנד, מענטשן וואָס האָבן געהאַט די וואַקצין קענען נישט אַנשטעקן אנדערע מענטשן. אין די UK מיר האָבן MMR 2 וואַקסינז. ביידע אַרבעט זייער געזונט; איינער כולל כאַזער דזשעלאַטאַן און די אנדערע טאַן ניט. אויב איר ווילט אַז דיין קינד זאָל האָבן די דזשעלאַטאַן פריי וואַקצין, דיסקוטירן עס מיט דיין פּראַקטיסיז ניאַניע אָדער GP.

ווי און ווען איז די וואַקצין געגעבן?

די וואַקצין איז ינדזשעקטיד אין די מוסקל פון די דיך אָדער אויבערשטער אָרעם. עס איז געגעבן אין איין יאָר אַלט נאָך די ימיונאַטי די בעיבי באקומען פון זייער מוטער פּיידז. א צווייטע דאָזע פון די וואַקצין זאָל זיין געגעבן ווידער איידער דיין קינד סטאַרץ שולע אין אַרום 3 יאָרן און 4 חדשים אַלט.



ווי עפעקטיוו איז די MMR וואַקצין?

די MMR וואַקצין איז געווען פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר כמעט ווישן אויס די 3 חולאתן אין יונג קינדער אין די UK זינט עס איז געווען באַקענענ אין 1988.

וועט די MMR וואַקצין האָבן קיין זייט יפעקס?

די 3 פאַרשידענע ווירוסעס אין די וואַקצין אַקט אין פאַרשידענע צייט און קען פראָדוצירן די פאלגענדע זייט ווירקונג נאָך דער ערשטער דאָזע:

■ 6 צו 10 טעג נאָך ימיונאַזיישאַן, ווי די מיזעלס טייל פון די וואַקצין סטאַרץ צו אַרבעטן, וועגן איין פון 10 קינדער קען אַנטוויקלען אַ היץ און עטלעכע קען אַנטוויקלען אַ מילד מיזעלס-ווי ויסשיט און גיין אַוועק זייער עסן

■ בעערעך איין אין יעדער 1,000 ימיוניזד קינדער קען האָבן אַ פיטאַס געפֿירט דורך אַ היץ. דעם איז גערופן אַ 'פעבריל קאַנוואַלשאַן'. אָבער, קינדער וואָס זענען נישט וואַקסאַנייטיד און באַקומען מיזעלס, זענען 3 מאל מער מסתמא צו האָבן אַ פאַסיק

■ וועגן 3 וואָכן נאָך MMR וואַקצין, ווי די מאַמפס טייל פון די וואַקצין סטאַרץ צו אַרבעטן, עטלעכע קינדער קען ראַרעלי באַקומען מאַמפס-ווי סימפּטאָמס (היץ און געשוואַלן גלאַנדז)

**MMR איז די סייפּאָסט וועג
צו באַשיצן אייער קינדקעגן
מיזעלס, מאַמפס און רובעללאַ.**

■ זייער ראָרעלי, קינדער קענען באַקומען אַ ויסשיט פון קליין סצענע-ווי ספּאַץ אין די 6 וואָכן נאָך וואַקסאַניישאַן. דאָס איז יוזשאַוואַלי געפֿירט דורך די מיזעלס אָדער רובעללאַ טיילן פון דער וואַקצין. אויב איר זען ספּאַץ ווי די, נעמען דיין קינד צו דער דאָקטער צו זיין אָפּגעשטעלט. דיין דאָקטער וועט זאָגן איר ווי אַזוי צו האַנדלען מיט די ויסשיט און ווי צו באַשיצן דיין קינד אין דער צוקונפֿט

■ ווייניקערע ווי איין אין אַ מיליאָן קינדער קען אַנטוויקלען ענסעפּאַליטיס (אַנצינדונג און געשווילעכץ פון דעם מאַרך) נאָך די MMR וואַקסינע. אָבער, אויב אַ קינד קאָטשאַז מיזעלס, די געלעגנהייט פון דעוועלאָפּינג ענסעפּאַליטיס איז צווישן איינער אין 200 און איינער אין 5,000

וואָס אויב מײן בעיבי איז אַלערדזשיק פֿאַר עגגס?

די MMR וואַקצין קענען זיין בעשאַלעם געגעבן צו קינדער וואָס האָבן געהאַט אַ שטרענג אַלערגיע (אַנאַפּילאַקטיק אָפרוף) צו עג. אויב איר האָט קיין זאַרגן, רעדן מיט דיין געזונט גאַסט, פיר ניאַניע אָדער דאָקטער.

טוט די MMR וואַקצין אַנטהאַלטן דזשעלאַטאַן?

אין UK, מיר האָבן MMR 2 וואַקסינז וואָס אַרבעט זייער גוט. איינער פון זיי כּולל כּאַזער דזשעלאַטאַן און די אנדערע טאָן ניט. אויב איר וואָלט בעסער וועלן צו האָבן די וואַקצין וואָס כּולל קיין כּאַזער דזשעלאַטאַן, רעדן צו דיין פּראַקטיסיז ניאַניע אָדער GP. איר קענט זען די MMR וואַקצין פּאַציענט אינפּאַרמאַציע ליפּלעץ ביי:

:Priorix

www.medicines.org.uk/emc/product/1159/pil

:MMRVAXPRO

www.medicines.org.uk/emc/product/6307/pil

וואַך אױס פֿאַר מענינגיטיס און סעפטיסעמיאַ

ביידע מענינגיטיס און עפטיסעמיאַ זענען זייער ערנסט.
עס איז וויכטיק אַז איר דערקענען די וואונדער און
סימפּטאָמס און וויסן וואָס איר זאָל טאָן אויב איר זען זיי.

פרי סימפּטאָמס פון מענינגיטיס און סעפטיסעמיאַ קען
זיין ענלעך צו אַ קאַלט אָדער פּלו (פיבער, וואַמאַטינג,
יריטאַבילאַטי און רעסטלאַסנאַס).

אַבער, מענטשן מיט מענינגיטיס אָדער סעפטיסעמיאַ
קענען ווערן עמעס קראַנק ין שעה, אַזוי עס איז וויכטיק צו
וויסן די וואונדער און סימפּטאָם פון די באדינגונגען.



וואָס איז מענינגיטיס?

מענינגיטיס איז אַ ינפעקציע פון די ונטערשלאַק פון דעם מאַרן. מענינגיטיס קענען זיין געפֿירט דורך עטלעכע מינים פון באַקטיריאַ אָדער ווירוסעס.

ינפעקציע מיט מענינגאָקאָקאַל באַקטיריאַ קענען אָנמאַכן מענינגיטיס, סעפטיסעמיאַ (בלוט פאַרסאַמונג), פעריקאַרדיטיס (אַנצינדונג פון די ונטערשלאַק פון די סאַק וואָס כולל די האַרץ) און אַרטריט (שוועלן פון די דזשוינץ).

אין בייביז, די הויפט סימפטאָמס פון מענינגיטיס קען אַרײַננעמען:

- א הויכע , קרעכנדיקע געשריי
- יריטאַבאַל ווען פיקט זיך
- אַ באַלדזשינג פאַנטאַנעל
- דראַוזי און ווייניקער אַפרופיק - זײַענדיק שווער צו וועקן
- פלאַפּי און ליסטליאַס
- שייגעץ מיט דזשערקי
- מוּוּמאַנץ (קאַנוואַלשאַנז/פאַסיק)
- ריפּיוזינג פידז, וואַמאַטינג
- הויט וואָס איז בלאַס, בלאַטשי אָדער אויסגעדרײט בלוי
- א קדחת

וואָס איז סעפטיקמיאָ?

סעפטיסעמיאָ איז אַ זייער ערנסט צושטאַנד ווען די בלוט סטרים איז ינפעקטאַד. די וואונדער פון קאַלט הענט און פֿיס, בלאַס הויט, וואַמאַטינג און זייענדיק זייער פאַרשלאָפן אָדער שווער צו וועקן קענען קומען אויף געשווינד. אויב איר כאַשעד סעפטיקעמיאָ, באַקומען הילף ערדזשאַנטלי.

אין בייביז, די הויפט סימפטאָמס פון סעפטיסעמיאָ קען אַרייַננעמען:

- גיך אָדער ומגעוויינטלעך פאַטערנז פון ברידינג
- הויט וואָס איז בלאַס, בלאַטשי אָדער אויסגעדרייט בלוי
- היץ מיט קאלטע הענט און פיס
- ציטערנדיק
- וואַמאַטינג און ריפיוזינג פידז
- רויט אָדער לילאַ ספּאַץ וואָס טאָן ניט וועלקן אונטער דרוק (טאָן די גלאז פּרובירן דערקלערט אויף דער ווייטער בלאַט)*
- ווייטיק אָדער יריטאַבילאַטי פון מוסקל ייקס אָדער שווער גליד אָדער שלאַס ווייטיק
- פּלאַפּינעסס
- שטרענג שלאָף

עס איז וויכטיק צו געדענקען אַז ניט אַלעמען וועט אַנטוויקלען אַלע די סימפטאָמס וואָס זענען ליסטעד, און אַז די רשימה פון סימפטאָמס איז נישט יגזאַסטיוו. אויב אַ יחיד דעוועלאָפּס עטלעכע פון די סימפטאָמס, ספּעציעל רויט אָדער לילאַ ספּאַץ, באַקומען מעדיציניש הילף ערדזשאַנטלי. אויב איר קענט נישט קאַנטאַקט דיין דאָקטער, אָדער איר זענט נאָך באַזאָרגט נאָך איר באַקומען עצה, צוטרוי דיין אינסטינקטן און נעמען דיין קינד צו די נויטפאַל אָפּטיילונג פון דיין ניראַסט שפיטאַל.

* אויף טונקל הויט, קאַנטראַלירן ין די יילידז אָדער דאָך פון די מויל וווּ די ספּאַץ קענען זיין מער קענטיק



די 'גלאז פרובירן'

דריקן די זייט פון אַ קלאַר געטרונקען גלאז פעסט קעגן די ויסשיט אַזוי איר קענען זען אויב די ויסשיט פיידז און פארלירט קאָלירן אונטער דרוק. אויב עס טוט נישט טוישן קאָלירן, קאָנטאַקט דיין דאָקטער מיט.

וואו קענען איך באַקומען מער אינפֿארמאַציע?

די טשעריטיז צושטעלן אינפֿארמאַציע, עצה און שטיצן:

מענינגיטיס פֿאַרשונג וויקיפעדיע

פריי העלפלינע 080 8800 3344

(9:00 צו 10:00 וויקדייז,

8:00 צו 10:00 וויקענדז און יום טוב)

www.meningitis.org

מענינגיטיס איצט

24 שעה העללליין 0808 8010 388

www.meningitisnow.org

איר קענט אויך פרעגן דיין דאָקטער, פיר ניאַניע אָדער געזונט גאַסט פֿאַר עצה, אָדער רופן די **NHS** אויף **111**.

עלטערן און קאַריערז קענען באַריכט סאַספעקטיב זייט יפעקס פון וואַקסינז און מעדאַסאַנז דורך די געל קאַרד (Yellow Card) סקים.

דאָס קען ווערן געטאָן אַנליין דורך באזוכן

yellowcard.mhra.gov.uk


אָדער דורך רופן די געל קאַרד (Yellow Card) האַטליין אויף

0800 731 6789. איר קענט

אויך נוצן די QR קאָד

אָדער דורך אראפקאפיע די

געל קאַרד (Yellow Card) אַפ.



רוטין קינדשאפט ימינונאזיישאן פראגראם פֿון סעפטעמבער 2024

עלטער רעכט	חולאתן פראטעקטעד קעגן	וואקצין געגעבן
אכט וואכן אלט	דיפטעריא, טעטאנוס, פערטוססיס (קיפ הוסט), פאליא, העמאפילוס ינפלענציע טיפ b (Hib) און העפאטיטיס B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	מענינגאקאקאל גרופע B (MenB)	MenB
	ראטאוורוס גאסטראענטעריטיס	ראטאוורוס ²
צוועלף וואכן אלט	דיפטעריא, טעטאנוס, פערטוססיס, פאליא, Hib און העפאטיטיס B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	פנעומאקאקאל (13 סעראטיפעס)	פנעומאקאקאל קאנדזשוגאטע וואקצין (PCV)
	סוריוואטאָר	ראטאוורוס ²
זעכצן וואכן אלט	דיפטעריא, טעטאנוס, פערטוססיס, פאליא, Hib און העפאטיטיס B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	MenB	MenB
איין יאָר אלט (אויף אָדער נאָך דער ערשטער דײַן געבורסטאָג פֿון דעם קינד)	MenC i Hib	Hib/MenC
	פנעומאקאקאל	PCV באַסטער
	מזעלס, מאפעס און רובעלאָ (דייטשישע מיזלען)	MMR
	MenB	MenB באַסטער
פאסיק פידיאטריק עלטער גרופע ⁴	ינפלענציע (אלע יאָר פֿון סעפטעמבער)	לעבן אַטענואַטעד ינפלענציע וואקצין ^{3,6} LAIV
דריי יאָר פֿיר חדשים אלט אָדער באַלד נאָך	דיפטעריא, טעטאנוס, פערטוססיס און פאליא	dTaP/IPV
	מזעלס, מאמפס און רובעלאָ	MMR (קוק דער ערשטער דאָזע געגעבן)
בחורים און מיידלעך פֿון צוועלף ביז דרייצן יאָר	קאנסערץ און דזשענאטאל ווארץ געפירט דורך ספעציפיש טייפס פון מענטשלעך פאפילאמאווירוס (HPV)	HPV ⁵
פערצן יאָר אלט (סקול יאָר 9)	טעטאנוס, דיפטעריא און פאליא	Td/IPV (טשעק MMR סטאַטוס)
	מענינגאקאקאל גרופע A, C, W און Y	MenACWY

[1] ינטראַמוסקולאַר ינדזשעקשאַן אין דעלטאָיד מוסקל אין אויבערשטן אָרעם אָדער אַנטעראַלאַטעראַל אַספעקץ פֿון די דיר. [2] ראַטאוורוס וואַקצין זאָל זיין געגעבן בלויז נאָך טשעק פֿאַר SCID זיפונג רעזולטאַט. [3] כולל חזיר דזשעלאַטאַן. [4] זען יערלעך פֿלו בריוו ביי: www.gov.uk/government/collections/annual-flu-programme. [5] זען גרין ספר HPV טשאַפּטער 18 אַ פֿאַר דעטאַילס וועגן ימינוניזינג ימינונאָפּראַמיסעד יונג מענטשן וואָס וועט דאַרפֿן 3 דאָסעס. [6] אויב LAIV (לעבן אַטענואַטעד ינפלענציע וואַקצין) איז קאָנטראַינדיקאַטעד אָדער אַנדערש ומפּאַסיק, נוצן ינאַקטיוויטיד פֿלו וואַקצין (טשעק גרין בוך טשאַפּטער 19 פֿאַר פרטים). [7] זען גרין ספר שינגלעס טשאַפּטער a28 פֿאַר דעטאַילס אויף באַרעכטיגט עלטער גרופּעס אַרײַנגערעכנט שטרענג ימינונאָסופּרעסעטעד מענטשן פֿון עלטער 50.

סידיחי ראפֿ זניסקאוו ראָן ענגונגנידאב שיניצידעם גניילרעדנאָ טימ

מעדיקאל צושטאַנד	חולאתן פראַטעקטעד קעגן	וואַקסינז פארלאנגט ¹
אַספלעניא אָדער ספלעניק דיספאָנגקשאַן (אַריינגערעכנט רעכט צו סערפ צעל און סעליאק קרענק)	מענינגאָקאָקאל גרופעס A, B, C, W און Y פנעומאָקאָקאל ינפלוענציע	MenACWY MenB 13PCV (אַרויף צו 10 יאָרן פון עלטער) ² 23PPV (פֿון 2 יאר אַלט) יערלעך פֿלו וואַקצין
קאָוטשלעאַר ימפלאַנץ	פנעומאָקאָקאל	13PCV (אַרויף צו 10 יאָרן פון עלטער) ² 23PPV (פֿון 2 יאר אַלט)
כראַניש רעספּעראַטאָרי און האַרץ באדינגונגען (אַזאַ ווי שווער אַזמאַ, כראַניש פּולמאָנערי קרענק און האַרץ דורכפאל)	פנעומאָקאָקאל ינפלוענציע	13PCV (אַרויף צו 10 יאָרן פון עלטער) ² 23PPV (פֿון 2 יאר אַלט) יערלעך פֿלו וואַקצין
כראַניש נוראלאַדזשיקאַל באדינגונגען (אַזאַ ווי פאַרקניסאַן ס אָדער מאַטאַר נעוראָן קרענק, אָדער לערנען דיסאַביליטי)	פנעומאָקאָקאל ינפלוענציע	13PCV (אַרויף צו 10 יאָרן פון עלטער) ² 23PPV (פֿון 2 יאר אַלט) יערלעך פֿלו וואַקצין
צוקערקרענק	פנעומאָקאָקאל ינפלוענציע	13PCV (אַרויף צו 10 יאָרן פון עלטער) ² 23PPV (פֿון 2 יאר אַלט) יערלעך פֿלו וואַקצין
כראַניש ניר קרענק (CKD) (אַריינגערעכנט כעמאָדיאַליסיס)	פנעומאָקאָקאל (סטאַגע 4 און 5 CKD) ינפלוענציע (סטאַגע 3, 4 און 5 CKD) העפּאַטיטיס ב (בינע 4 און 5 CKD)	13PCV (אַרויף צו 10 יאָרן פון עלטער) ² 23PPV (פֿון 2 יאר אַלט) יערלעך פֿלו וואַקצין העפּאַטיטיס B
כראַניש לעבער באדינגונגען	פנעומאָקאָקאל ינפלוענציע העפּאַטיטיס A העפּאַטיטיס B	13PCV (אַרויף צו 10 יאָרן פון עלטער) ² 23PPV (פֿון 2 יאר אַלט) יערלעך פֿלו וואַקצין העפּאַטיטיס A העפּאַטיטיס B
העמאָפּיליע	העפּאַטיטיס A העפּאַטיטיס B	העפּאַטיטיס A העפּאַטיטיס B
ימונאָסופּרעססיאָן רעכט צו קרענק אָדער באַהאַנדלונג ⁴	פנעומאָקאָקאל שינגלעס וואַקצין ינפלוענציע	13PCV (אַרויף צו 10 יאָרן פון עלטער) ^{2,3} 23PPV (פֿון 2 יאר אַלט) שינגריקס - אַיבער 50 יאר אַלט ⁵ יערלעך פֿלו וואַקצין
דערגאַנג דיאַרדערס (אַריינגערעכנט יענע וואָס באַקומען דערגאַנג ינכיבאַטער טעראַפּיע)	מענינגאָקאָקאל גרופעס A, B, C, W און Y פנעומאָקאָקאל ינפלוענציע	MenACWY MenB 13PCV (אַרויף צו 10 יאָרן פון עלטער) ² 23PPV (פֿון 2 יאר אַלט) יערלעך פֿלו וואַקצין

[1] קוק די באַטייטיק קאַפּיטל פון די גרין ספר פֿאַר ספּעציפּיש פּלאַן:

www.gov.uk/government/collections/immunisation-against-infectious-disease-the-green-book. [2] אויב צווישן 2 יאָר און אונטער 10 יאָר אַלט און אַנימוניזעד אָדער טייל ימינוניזד

קעגן פנעומאָקאָקאָסי ינפּעקציע, געבן איין דאָזע פון 13PCV. [3] צו קיין עלטער אין סאַווירלי

ימונאָסופּרעסעטד. [4] באַטראַכטן יערלעך ינפלוענציע וואַקסאַנישאַן פֿאַר הויזגעזינד מיטגלידער

און יענע וואָס זאָרגן פֿאַר מענטשן מיט די באדינגונגען. [5] קוק די גרין ספר שינגלעס טשאַפּטער

www.gov.uk/government/publications/shingles-herpes-zoster-the-green-book-28 chapter-28a

סעלעקטיוו קינדשאפט ימיונאזיישאן פראגראם

וואַקסינד פארלאנגט	קרענק	צייט און פלאַן	ציל גרופע
העפאטיטיס B (Engerix B/HBvaxPRO)	העפאטיטיס B	ביי געבורט, פיר וואַכן און 12 חדשים אַלט ^{1,2}	בייביז געבוירן מיט העפאטיטיס B ינפעקטאד מוטערס
BCG	טובערקולוזיס	בערך 28 טעג אַלט ⁴	קליינע קינדער אין געביטן פון דער מדינה מיט TB ינסידאנס $40/100,000 \leq$
BCG	טובערקולוזיס	אַרום 28 טעג אַלט ⁴	בייביז מיט אַ פאָטער אָדער זיידע-באַבע געבוירן אין אַ הויך ינסידאנס לאַנד ³
LAIV אָדער ינאַקטיוויטיד פּלו וואַקצין אויב קאַנטראַינדיקאַטעד צו LAIV אָדער אונטער 2 יאָרן פון עלטער	ינפּלענציע	פּון 6 חדשים צו 17 יאָר אַלט	קינדער אין אַ קליניש ריזיקירן גרופע
ינאַקטיוויטיד פּלו וואַקצין	ינפּלענציע	אין קיין בינע פון שוואַנגערשאפט בעשאַס פּלו סעזאָן	שוואַנגער פּרויען
dTdap אָדער dTaP/IPV	פּערטוססיס	פּון 16 וואַכן דזשעסטטישאַן ⁵	
RSV וואַקצין	RSV	פּון 28 וואַכן פון שוואַנגערשאפט	

[1] נעמען בלוט פאַר 12 HBsAg חדשים צו ויסשליסן ינפעקציע. [2] אין אַדישאַן, כעקסאַלאַנט וואַקצין (Infanrix hexa אָדער Vaxelis) איז געגעבן אין 8, 12 און 16 וואַכן. [3] ווען די יערלעך ינסידאנס פון טב איז $\leq 40/100,000$ זען www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people. [4] קאַנטראַלירן די רעזולטאַטן פון SCID זיפונג איידער געבן BCG. [5] ידעאַלי איידער 32 וואַכן דזשעסטטישאַן אָבער קען נאָך זיין געגעבן נאָך 32 וואַכן.



Produced by
UK Health Security Agency

© Crown copyright 2024
2024QG1YI Yiddish 1p 500K AUG 2024
UK Health Security Agency gateway number: 2024524

די אַדישאַן ערשטער ארויס אין דעצעמבער 2019.
אויב איר דאַרפֿן מער עקזעמפלארן פון דעם בלאַט, ביטע באַזוכן, www.healthpublications.gov.uk צו קאַנטאַקט די Health Publications אָרדערליין. 1Ph: 0300 123 1002.
מיניקאָם: 0300 123 1003 (8:00 צו 18:00, מאנטיק צו פרייטאג).
ביטע נוצן פראָדוקט קאָד: 2024QG1YI Yiddish