

NHS



UK Health
Security
Agency

آيا مېندواره ياست؟

واکسين مرسته کوي چې تاسو، ستاسو
ماشوم او مېندواري درى واره خوندي يا
مصون کړي

والگى (آنفلونزا)

تور توخى
(Pertussis)

تنفسي سنستيال
(RSV) وایروس



د نورو واکسينو او د هغې د مناسبو
وختونو په اړه د اضافي مشورې سره

immunisation

لارښود د هغو وړيا واکسينو په اړه دى چې تاسو سره مرسته کوي ترڅو

• ځان

• خپل نوى زېږېدلى ماشوم، او

• خپله مېندواري د

پېچليو ناروغيو پر وړاندې خوندي يا محفوظه کړئ

واکسين په بدن کې څه ډول فعاليت کوي؟

واکسينونه ستاسو د نوي زېږېدلي ماشوم د بدن دفاعي سيستم پياوړى کوي، ترڅو وکولى شي د ځانگړيو ناروغيو او واپروسونو پر وړاندې مقاومت وکړي.

کله چې تاسو واکسين ترلاسه کوئ ستاسو د بدن دفاعي سيستم پياوړى کېږي او مرسته کوي چې په ناروغيو له اخته کېدو څخه مخنيوى وکړي او ستاسو مېندواري خوندي کړي. وروسته دغه انتي بادي د مور په نس کې ماشوم ته انتقال مومي ترڅو هغه له زېږون مخکې او له زېږون وروسته د څو اونيو او مياشتو لپاره مصون وساتي.

آيا کولى شم د واکسينو له تطبيق وروسته مې ماشوم ته تى يا شيدې ورکړم؟

هو، د MMR، والگي، تور توخي او RSV واکسينو له تطبيق وروسته کولى شئ خپل ماشوم ته تى يا شيدې ورکړئ. د ځينو هغو واکسينو لپاره به چې د مېندواري پرمهال يا له هغې وروسته ورکول کېږي، ستاسو په شيدو کې انتي بادي وي، نو په دې صورت کې تاسو کولى شئ خپل نوي زېږېدلي ماشوم ته د تى يا شيدو ورکولو له لارې هغه مصون کړئ.

هغه واکسینونه چې د مېندواری پر مهال تطبیقېږي

تور ټوخی (پېرتیوزېس)

د تور ټوخي ناروغي يوه خورا ساري ناروغي ده چې کولی شي د تنکیو ماشومانو لپاره جدي گواښ رامنځ ته کړي. په دغې ناروغۍ اخته ډېری تنکی ماشومان په روغتون کې پالنې يا طبي مراقبت ته اړتيا لري.

تور ټوخی کولی شي د اوږدمهال لپاره د ټوخلپې او ساه لنډی لامل شي چې له امله يې تنفسي ستونزې رامنځ ته کېږي. په ټوخي کې شینوالی له هر ټوخي وروسته د ساه اخیستو له امله رامنځ ته کېږي.

تور ټوخی کېدی شي له 2 تر 3 میاشتو دوام وکړي. دغه ناروغي کېدی شي د سږي د ناروغۍ او دائمې مغزي حملې او مغزي ستونزې لامل شي. که چېرې دغه ناروغي تر ټولو بد حالت ته ورسېږي، کېدی شي د مړینې لامل وگرزي.

ولې د تور ټوخي واکسین ته اړتیا لرم؟

د مېندواری پر مهال د تور ټوخي واکسین به ستاسو د بدن د مصونیت کچه لوړه کړي. ستاسو په بدن کې تولید شوي انټي باډي به د جنیو له لارې ستاسو ماشوم ته هم انتقال شي. دغه انټي باډي به مرسته وکړي چې ستاسو ماشوم له زېږون وروسته تر څو اونيو پورې د تور ټوخي ناروغۍ پر وړاندې مصون وساتي.



آیا مېدواره یاست - ؟له مېندواری مخکې، وروسته او او د مېندواری په جریان کې واکسین

څه وخت باید واکسین وکړم؟

تاسو به دغه واکسین په نورمال ډول د معایناتو له ترسره کولو وروسته د خپلې مېندواری په منځنیو مرحلو کې (معمولا د 20 اونیو په ترڅ کې) ترلاسه کړئ، خو کولی شئ دغه واکسین د مېندواری په 16 مه اونۍ کې هم ترلاسه یا تطبیق کړئ.

که چېرې تاسو د خپلې مېندواری په 20 مه اونۍ کې یاست او لا مو دغه واکسین نه وي ترلاسه کړی، نو په دې اړه د خپل GP جراح یا قابلې سره مشوره وکړئ او د واکسینو د تطبیق لپاره څومره ژر چې کولی شئ ملاقات یا لیدښته چمتو کړئ.

تاسو باید د دې لپاره چې خپل نوي زېږېدلي ماشوم ته غوره مصنویت رامنځ ته کړئ، د مېندواری په 32 مه اونۍ واکسین وکړئ. که چېرې تاسو دغه واکسین نه وي کړی، بیا هم کولی شئ ترلاسه یې کړئ خو اغېزه به یې یو څه کمه وي. که چېرې د ماشوم له زېږون مخکې نه شئ کولی دغه واکسین ترلاسه کړئ، کولی شئ له زېږون وروسته یې هم ترلاسه کړئ چې په دې سره به ستاسو نوي زېږېدلي ماشوم ته د تور ټوخي د ناورغی د انتقال گواښ کم شي. دا مهمه ده چې د خپلې هرې مېندواری پرمهال د تور ټوخي واکسین وکړئ ترڅو ستاسو په بدن کې د انتي باډي کچه لوړه او ماشوم مو خوندي شي.

ما فکر کا چې ماشوم ته مې د تور ټوخي واکسین ورکړي دي؟

په UK (بریتانیا) کې د تور ټوخي واکسین ماشومانو ته په 8، 12، او 16 کلنۍ کې ورکول کېږي. گن شمېر هغه نوي زېږېدلي ماشومان چې جدي د تور ټوخي ناروغي لري، له زېږون وروسته په څو لومړیو اونيو کې په ياده ناورغی اخته کېږي. په دغې موده کې د خپل ماشوم د مصنُون ساتلو یوازینی لاره داده چې د مېندواری پرمهال د تور ټوخي واکسین وکړئ.

واکسین څومره اغېزه لري؟

په بریتانیا کې ترسره شويې څېړنې ښيي چې د مېندواری پرمهال د واکسینو تطبیق د تور ټوخي له ناروغۍ څخه د نوي زېږېدلي ماشوم د ژغورنې په برخه کې تر 90% پورې اغېزه لري

له واکسینو څخه ترلاسه شوی مصونیت په دې مانا هم دی چې د تور ټوخي په ناروغۍ ستاسو د اخته کېدو او ماشوم ته د هغې د انتقال احتمال کمېږي.

کوم واکسین وکړم؟

دغه راز هغه واکسین چې مور یې مېرمنو ته د مېندواری پرمهال تطبیقوو د تیتانوس او دفتريا ناروغیو پر وړاندې هم مصونیت رامنځ ته کوي. دغه مصونیت باید د هغو واکسینو په واسطه ترلاسه کړئ چې تاسو یې په ورځني ډول د ماشومتوب پرمهال تطبیقوئ. تاسو کولی شئ د Adacel واکسین په اړه دلته معلومات ولولئ: www.medicines.org.uk/emc/product/15553/pil#gref

آیا د مېندواری پرمهال د تور ټوخي واکسین زیان نه لري؟

د اروپا په گڼو شمېر هېوادونو، شمالي او سوېلي امریکا، آسټرالیا او نیوزلنډ کې د مېندواری پرمهال د تور ټوخي له واکسینو استفاده کېږي او په دې برخه کې یې غوره مصونیت رامنځ ته کړی.

ستاسو او ستاسو د ماشوم لپاره د واکسینو تطبیق تر هغې چې نوی زېږېدلی ماشوم مو په تور ټوخي اخته شي، غوره دی.

د خپلې هرځل مېندواری پرمهال د تور ټوخي واکسینو د تطبیق په واسطه د خپل ماشوم په خوندي ساتنه یا مصونیت کې مرسته وکړئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې ماشوم مو د تور ټوخي ضد ټول د 8، 12 او 16 اونیو واکسینونه ترلاسه کړي.

سنسیتیاال تنفسي وایروس (RSV)

سنسیتیاال تنفسي وایروس RSV یو ډول عام وایروس دی چې کولی شي د سرپو د ناورغی چې د برانشیت په نامه یادېږي لامل وگرزي. دا ډول ناوره روغتیايي حالت کېدی شي د کوچنیو ماشومانو لپاره د دې لامل وگرزي چې په سختی سره ساه واخلي او خواره وخوري. په انگلستان کې هر کال شاوخوا 20,000 نوي زېږېدلي ماشومان چې په برانشیت ناروغی اخته دي په روغتونونو کې بستر کېږي چې ځینې یې جدي پاملرنې ته اړتیا پیدا کوي. د دغو ناورغانو له ډلې محدود شمېر یې مړه کېږي.

RSV ناورغی کېدی شي په خورا تنکیو، له وخته مخکې زېږېدلیو، د قلبی ستونزو لرونکو، او هغو ماشومانو کې شدیدې وي چې تنفسي ستونزې یا د بدن کمزوری دفاعي سیستم لري. RSV ناروغی کېدی شي د کال په هر موسم کې شیوع وکړي، خو شدت یې هرکال د ژمي په موسم کې وي.

ولې باید د RSV واکسین وکړو؟

د مېندواری پر مهال د RSV واکسینو تطبیق به ستاسو د مصونیت کچه لوړه کړي. ستاسو په بدن کې تولید شوي انټي باډي به د مور په نس کې ستاسو ماشوم ته انتقال شي. دغه انتقال شوی انټي باډي به له زېږون وروسته د RSV ناروغی پر وړاندې د هغې په مصون ساتنه کې مرسته وکړي.

څه وخت باید واکسین وکړو؟

دغه واکسین باید تاسو ته د مېندواری په 28مه اونۍ کې وړاندې شي. تاسو باید خپل واکسین د مېندواری په 28مه اونۍ یا ممکنه ژر فرصت سره وکړئ. دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په بدن کې مو د انټي باډي کچه لوړه او تولید شوي انټي باډي له زېږون مخکې خپل ماشوم ته انتقال کړئ.

تاسو د خپلې مېندواری په وروستیو مرحلو کې هم کولی شئ خپل واکسین وکړئ خو اغېزه به یې یو څه کمه وي. که چېرې ستاسو لپاره ممکنه نه وه چې په وخت سره واکسین وکړئ، بیا هم دا فرصت لرئ چې تر زېږون پورې خپل واکسین وکړئ.

تاسو باید د خپلې هرځل مېندواری پر مهال د RSV واکسین وکړئ. ترڅو خپل نوي زېږېدونکي ماشوم ته غوره مصونیت رامنځ ته کړئ.

د RSV واکسین څومره اغېزه لري؟

څېړنې ښيي چې له زېږون وروسته تر لومړنيو 6 مياشتو پورې د RSV واکسین په تطبيق سره د برانشيټ په شديدې ناروغۍ د ماشوم د اخته کېدو گواښ تر 70% پورې کمېږي.

واکسین هم لکه د نورو هر ډول درملو په شان بشپړه اغېزه نه لري او کېدای شي ځينې ماشومان د دې سره سره چې مور يې د RSV واکسین هم کړي وي په ياده ناروغۍ اخته شي. نو له واکسین شويو ميندو څخه د ډېری زېږېدليو ماشومانو لپاره بايد د RSV ناروغي شديدې نه وي.

زه بايد کوم ډول واکسین وکړم؟

تاسو کولی شئ په دې اړه معلومات دلته ترلاسه کړئ: www.abrysvo.com/

آيا د مېندواری پرمهال د RSV واکسینو تطبيق زما د ماشوم لپاره زيان لري؟

په شاوخوا 4,000 مېرمنو باندې د ترسره شويې طبي څېړنې له مخې، واکسینو غوره مصونيت رامنځ ته کړی او دغه واکسینونه اوس په بریتانیا، اروپا او امریکا کې د درملو د تنظيم د ادارو لخوا تصدیق شوي دي. په زرگونو مېرمنو د واکسینو د تطبيق د ملي پروگرامونو له لارې دغه واکسین تطبيق کړي دي، چې له دې ډلې تر 100,000 ډېرې هغه مېرمنې چې دغه واکسین يې تطبيق کړی د امریکا په متحده ایالاتو (USA) کې دي.

د دغې طبي څېړنې په ترڅ کې، د هغو ماشومانو په پرتله چې ميندو يې واکسین نه وو کړي د هغو ماشومانو شمېر يو څه ډېر و چې ميندو يې دغه واکسین تطبيق کړي وو. داسې ښکاري چې دغه توپير ښايي يو تصادف وي، خو دا يو له هغو دلائلو څخه دی چې واکسین د مېندواری د لومړيو مرحلو پرځای د مېندواری له 28مې اونۍ څخه وروسته ورکول کېږي. په ټوله کې دغه واکسین ستاسو او ستاسو د ماشوم لپاره تر دې محفوظ او بهتره دی چې ستاسو نوی زېږېدلی ماشوم په RSV ناروغۍ اخته شي.

خپل نوي زېږېدلي ماشوم ته د ژوند په لومړنيو 6 مياشتو کې د غوره مصونيت رامنځ ته کولو په موخه، د مېندواری پرمهال د RSV واکسین وکړئ.



آنفلونزا (والگی)

والگی څه ډول یوه ناورغي ده؟

والگی یو له خورا ساري ناورغيو څخه ده چې اعراض او علائم یې عبارت دي له تپې، لرزې او درد، سر دردی او شدیدې ستړیا څخه. مېندواره بنځې د نورو په پرتله د والگی ناروغۍ په شدید ډول د اخته کېدو د لور گواښ سره مخ دی، په ځانگړي ډول د مېندوارۍ په وروستيو مرحلو کې، چې په دغو گواښونو کې تور توخی او حتی مړینه شامل دي.

والگی کولی شي ستاسو د مېندوارۍ لپاره هم گواښ و اوسي، چې له امله یې کېدی شي تر وخت مخکې زېږون، د ماشوم کم وزني او د ماشوم په مړه ډول زېږېدنه رامنځ ته شي.

دغه راز والگی کېدی شي ستاسو د نوي زېږېدلي ماشوم او تنکیو ماشومانو لپاره هم جدي گواښ رامنځ ته کړي.

ولې د مېندوارۍ پرمهال د واکسینو تطبیق ته اړتیا ده؟

د والگی واکسین په شدید ډول په یاده ناروغۍ د اخته کېدو، په روغتون کې د بستربد یا د مېندوارۍ پرمهال د جدي مراقبت یا پاملرنې گواښ کموي. دغه راز یاد واکسین مېندوارۍ پرمهال د پیچلیو ستونزو د رامنځ ته کېدو گواښ هم کموي.

دغه واکسین د والگی پر وړاندې ستاسو د بدن انتي باډي پیاوړې کوي چې بیا وروسته دغه انتي باډي ستاسو په گېډه کې ماشوم ته انتقال کوي. دا واکسین ستاسو د نوي زېږېدلي ماشوم د ژوند په لومړنیو میاشتو کې د هغه لپاره مصونیت رامنځ ته کوي.

دغه راز د دغه واکسین په تطبیق سره به په والگی ناروغۍ ستاسو د اخته کېدو او د ژمي په موسم کې ستاسو ماشوم د هغې د انتقال چانس کم شی.

دغه واکسین باید په څه وخت کې وشي؟

د والگی واکسین هر کال معمولاً په سپتمبر کې وي چې د مېندواره مېرمنو لپاره وړیا دي.

تاسو باید دغه واکسین په سپتمبر میاشت کې چې د لاسرسي وړ وي وکړئ، دا مهمه ده نه ده چې د مېندوارۍ په کومه مرحله کې یاست. بهتره دا ده چې دغه واکسین د والگی موسم له راتلو مخکې وشي، خو که و مو نه کړل کول شئ هر وخت یې په ژمي کې وکړئ.

تاسو باید دغه واکسین د والگی په موسم کې د هر ځل مېندواره کېدو پرمهال وکړئ.

آيا د والگي واکسينو تطبيق د مېندواړۍ پرمهال مصون دی؟

له 2009 راهيسې گڼ شمېر هېوادونو د مېندواړۍ پرمهال د والگي واکسينو وړانديز کړی، او په انگلستان کې تر 2 مليونه ډېرو مېندواړه مېرمنو ته دغه واکسين تطبيق شوی دی. دغه واکسين د مصونيت په برخه کې ښه مخينه يا اعتبار لري.

په ټوله کې د واکسينو تطبيق ستاسو لپاره تر هغې غوره دی چې تاسو يا ستاسو په والگي ناروغۍ اخته شئ.

د والگي واکسين تر کومې کچې اغېزمن دی؟

د مېندواړۍ پرمهال د آنفلونزا واکسين په تطبيق سره په والگي يا ورته ناورغيو باندې ستاسو او ستاسو د ماشوم د اخته کېدو گواښ پنځوس سلنه کمېږي. له زېږون وروسته د ژوند په لومړنيو 6 مياشتو کې د والگي ناروغۍ له امله په روغتون کې د نويو زېږېدليو ماشومانو د بسترېدو احتمال د نورو هغو په پرتله تقريبا 70% کم دی.

والگي کېدې شي د مېندواړه مېرمنو او د هغوی د نويو زېږېدليو ماشومانو لپاره يوه جدي ناروغي و اوسي. مېندواړه مېرمنې بايد د خپلې هرې مېندواړۍ پرمهال د والگي وړيا واکسين ترلاسه کړي. دغه واکسين کېدې شي له سپتمبر وروسته د مېندواړۍ په هره مرحله کې تطبيق شي.

دمگړۍ بايد څه وکړم؟

کولی شئ خپل د GP ډاکټر، قابلې يا روغتيايي ټيم سره مشوره وکړئ ترڅو تاسو لپاره د واکسينو د تطبيق په موخه ليدژمنه يا ملاقات چمتو کړي. د والگي، تور ټوخي او RSV واکسينونو ټول په مټ کې د تزريق له لارې ورکول کېږي. د دغه واکسين عامه جانبي عوارض خفيف او په لاندې ډول دي:

- د تزريق په سيمه کې درد او سوروالی
- د سر او عضلاتو درد
- خفيفه تبه او ستړيا

د والگي په اړه لارښود کولی شئ په لاندې لېنک کې وگورئ:

www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-who-should-have-it-this-winter-and-why

مخکې له دې چې مېندواره شي

که چېرې تراوسه مېندواره نه یاست، خو دا هیله لرئ چې په نیژدې راتلونکې کې به مېندواره شي، باید ډاډ ترلاسه کړئ چې د خپلو نورو واکسینو په اړه تازه معلومات لرئ.

روبیلا (د جرمی شری)

روبیلا معمولا یوه خفیفه ناروغي ده چې د جلدې بخاراتو لامل ګرزي.

د مېندوارې پرمهال په روبیلا ناروغي اخته کېدل ښايي ستاسو د ماشوم لپاره خورا جدي وي، او کېدی شي په رحم کې د شري سندروم (CRS) په نامه د ناروغي لامل شي. CRS کېدی شي د کنوالي، رندوالي (د سترګو د ستونزو)، قلبي ستونزو او/یا په بطني ډول د ودې یا نمو لامل شي. همدارنګه دغه ناروغي کولی شي د ماشوم د مړینې لامل شي.



آیا مېدواره یاست - ؟له مېندوارې مخکې، وروسته او او د مېندوارې په جریان کې واکسین

د مېندواری پرمهال د روبیلا ناروغی پروړاندې مصونیت ترلاسه کول که چېرې تاسو په ماشومتوب کې د MMR واکسینو دوه دوزه تطبیق کړې وي، نو تاسو به د مېندواری پرمهال په سمه توګه خوندي وئ. مور د واکسینو د تطبیق په برخه کې له خپلو بریالیو پروګرامونو څخه مندوی یو، روبیلان ناروغي اوس په بریتانیا کې په ندرت سره موندل کېږي.

که چېرې مطمئن نه یاست چې آیا دغه واکسین مو تطبیق کړی که نه، نو کولی شئ په دې اړه د خپل GP جراح سره مشوره وکړئ. که چېرې مو خپل دغه واکسین نه وي کړی، نو بهتره ده چې له مېندواری مخکې خپل واکسین تطبیق کړئ. که چېرې مو بیا هم دغه واکسین و نه کړ، نو باید د ماشوم له زېږون وروسته یې فوراً وکړئ.

د MMR واکسینو په ترکیب کې ژوندی (کمزوری شوی) وایروس موجود دی، نو توصیه دا ده چې د مېندواری پرمهال دغه واکسین و نه شي.

زه مېندواره یم خو خپل MMR واکسین مې لا نه دي کړي، څه باید وکړم؟

کله مو چې زېږون وکړ، کولی شئ له زېږون وروسته خپل د MMR واکسین وکړئ. د دغه واکسین په تطبیق سره به تاسو خپل ځان او نوي زېږېدلی ماشوم د شري او روبیلا ناروغیو پروړاندې خوندي کړئ. د MMR واکسینو د دواړو دوزونو تطبیق به هم وکولی شي تاسو د اوږدې مودې لپاره د شري او ډېغومبوري ناروغیو پروړاندې خوندي وساتي.

د مېندواری پرمهال جلدې ستونزې يا بخارات

که چېرې د جلدې ناروغ سره په تماس کې شم يا هم خپله جلدې ناروغي يا بخارات ولرم، نو څه بايد وکړم؟

ځينې هغه ناروغي له امله يې جلدې ستونزې يا بخارات رامنځ ته کېږي لکه روبيلا، کولی شئ د مېندوار مېرمنو لپاره ناوړه او پېچلی روغتيايي حالت رامنځ ته کړي. حتی که تاسو له روبيلا ناروغي څخه خوندي هم وئ، بايد خپلې قابلې، GP يا د نسائي ولادې متخصص/متخصصې ته ووايئ چې آيا د مېندواری په دوران کې مور کومه جلدې ناروغي درلوده کنه يا دا چې آيا په دې موده کې د کوم بل داسې شخص سره چې په دغه ناروغي اخته وي په اړیکه کې شوي ياست.

هيله کوو تر هغې چې معاینه مو نه وي شوې، په دې اړه له هر ډول زېږون مخکې درملنې څخه ځان وساتئ.

کېدی شي له تاسو څخه د معاینې غوښتنه وشي ترڅو وپتېيل شي چې آيا په دغې ناروغي مبتلا ياست که څنگه. هغه روغتيايي متخصصین به چې ستاسو ارزونه کوي، اړتيا ولري پوه شي چې:

- د څو اونيو مېندواره ياست
- په جلدې ناروغي د اخته شخص سره ستاسو اړیکه يا تماس څه وخت وا
- د دغې ناروغي اعراض او علائم او يا هم مبتلا شخص سره ستاسو اړیکه په څه وخت کې وه
- ستاسو د جلدې ناروغيو اعراض يا توضیحات څه دي (آيا دغه بخارات د دانو په شان دي که له اوبو ډکې پولې يا پوکاني دي؟)
- پخوا مو څه ډول ناروغي درلوده، مثلا دا چې آيا بوزکاني يا شری مو تېر کړی که څنگه
- پخوا مو څه ډول واکسين تطبیق کړي دي

که چېرې تاسو په جلدې ناروغيو د اخته شخص سره په اړیکه کې کېږئ يا دا چې د مېندواری پرمهال په دغې ناروغي اخته کېږئ، نو له ځنډ پرته په دې اړه د خپل GP (عمومي ډاکټر) يا قابلې سره مشوره وکړئ. که چېرې د خپلې جلدې ناروغي په اړه په وخت سره خبر ور نه کړئ، کېدی شي دقیق تشخیص يا ستاسو لپاره توصیه شوې درملنه ناممکنه وي.

د خپلې قابلې سره د نورو واکسينو په اړه مشوره

کووېډ-19

د میندواری پرمهال په کووېډ-19 د اخته کېدو گواښ د یادې ناروغۍ د شیوع د پیل په پرتله ډېر لږ دی، خو میندواری ښځې په مني کې هم کولی دغه واکسين تطبیق کړي. د واکسينو په تطبیق سره به د څو میاشتو لپاره په جدي کووېډ-19 د اخته کېدو چانس را کم شي، چې دا کار یعنې د واکسينو تطبیق له هغه څخه چې د یادې ناروغۍ له امله بستري کېږي، په ځلونو غوره او مهم دی. ستاسو په بدن کې تولید شوي انټي باډي به ستاسو ماشوم ته انتقال او د هغه د ژوند په لومړنیو اونیو او میاشتو کې به د هغه لپاره یو څه مصونیت رامنځ ته کړي.

Hepatitis B (تور زېري)

هغه ماشومان چې په تور زېري له اخته میندو زېري (یا یې د میندواری پرمهال د تور زېري معاینه مثبتې وي) باید د زېرون سره سم د hepatitis B یا تور زېري واکسين وکړي. د واکسينو د اضافي دوزونو د تطبیق او د وینې د معاینې په موخه باید د خپل ماشوم/ماشومې لپاره هغه مهال چې هغوی 1 کلن کېږي، خپل GP جراح سره لیدزمنه یا ملاقات چمتو کړئ ترڅو د دغې ناروغۍ د تشخیص په موخه معاینه ترسره کړئ. www.gov.uk/government/publications/protecting-your-baby-against-hepatitis-b-leaflet

BCG (د توبرکلوز او نورو مایکرو باکټري ناروغیو واکسین)

هغه ماشومان چې والدین (یا نیکونه) یې د TB (توبرکلوز) ناروغی په پېژندل شویو هېوادونو کې استوګنه کوي، باید له یادې ناروغی څخه د مصونیت په موخه د BCG واکسین وکړي. www.gov.uk/government/publications/tb-bcg-and-your-baby-leaflet

د مېندواری پرمهال (او له زېږون وروسته) د توصیه شویو واکسینونو تطبیق یو له هغو اغېزمنو طریقو څخه ده چې په مټ یې کولی شئ ځان او ماشوم ته مو یادو ناروغیو له امله د متوجه ګواښونو کچه راټیټه کړئ.

د ژوند په ۸مه، ۱۲مه او ۱۶مه اونۍ کې خپل نوي زېږېدلي ماشوم ته د واکسینو تطبیق په دې مانا دی چې د واکسینو په واسطه رامنځ ته شوی مصونیت به د هغوی د ژوند تر مهمو پړاوونو پورې دوام وکړي.

د اضافي معلوماتو لپاره لېنکونه

• www.nhs.uk/Conditions/vaccinations/Pages/vaccination-schedule-age-checklist.aspx

• www.gov.uk/government/collections/immunisation

• www.medicines.org.uk/emc/

• د خپل ماشوم د ژوند په لومړنیو کلونو کې د واکسینو د تطبیق په اړه د نورو معلوماتو لپاره کولی شئ www.gov.uk/government/publications/a-guide-to-immunisations-for-babies-up-to-13-months-of-age وګورئ

د مېندواری د واکسینو ثبت

خپل د مېندواری واکسین لاندې ثبت کړئ ترڅو ډاډ ترلاسه شي تاسو او ستاسو ماشوم د والګي او تور ټوخي پر وړاندې د واکسینو مصونیت له لاسه نه ورکوئ

د واکسینو د تطبیق نېټه	کله باید واکسین وکړو	واکسین
	د والګي په موسم کې د مېندواری په هر پړاو کې.	والګی
	معمولا د معاینې له 18مې تر 20مې اونۍ پورې. کېدای شي د مېندواری له 16مې اونۍ تر زېږون پورې یې وکړئ.	تور ټوخی
	تاسو باید خپل د RSV واکسین د مېندواری په 28مه اونۍ کې وکړئ.	RSV
	وروسته له هغې چې ماشوم مو زېږي، له زېږون وروسته د معاینې په 6مه اونۍ (په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د خپل GP یا نرس سره مشوره وکړئ).	د MMR واکسینو 1 دوز*
	له لومړي دوز څلور اونۍ وروسته (د پورته مطابق).	د MMR واکسینو 2م دوز*

* که چېرې مور پخوا واکسین نه وي کړي

د مېندواری پر مهال د واکسینو تطبیق تاسو سره مرسته
کوي چې خپله مېندواري مصونه یا خوندي کړئ. د خپلې
قابلې GP (عمومي ډاکټر) یا روغتیايي ټیم سره مشوره
وکړئ او ډاډ ترلاسه کړئ چې دغه واکسین مو په
مناسب وخت کې تطبیق کړي.



© Crown copyright 2024

24PYPB01PAS Pashto. 1P 250K OCT 2024 UK

Health Security Agency gateway number: 2024709

لومړۍ نشریه د 2024 کال جون میاشت

دا لارښود په نورو ژبو هم ترجمه او د لاسرسۍ وړ فارمتونو کې ترتیب شوی دی. د دغه لارښود د نورو کاپیانو د غوښتنې لپاره
دغه لینک ته ورشئ: www.healthpublications.gov.uk یا هم لاندې شمېرې سره په اړیکه کې شئ: 0300 123 1002،
Minicom: 0300 123 1003 (له دوشنبه تر جمعې د سهار له 8am د ماښام تر 6pm)

www.nhs.uk/conditions/vaccinations/nhs-vaccinations-and-when-to-have-them