



UK Health
Security
Agency

שוואנגער?

די וואַקסינז העלפּס צו באַשיצן איר,
דיין בעיבי און דיין שוואַנגערשאַפט

פּלו (ינפּלוענציע)

וואַאָפּינג הוסט
(פּערטוסיס)

רעספּעראַטאָרי סינסטיאַל
(RSV) **ווירוס**

מיט נאָך עצות אויף
אנדערע וואַקסינז און ווען
צו באַקומען זיי

immunisation

דער בלאַט באשרייבט די פריי וואַקסינז וואָס העלפֿן באַשיצן

• דיך

• אייער שוואַנגערשאַפט, און

• דיין ני - געבוירן בעיבי

פֿון די קאָמפּלאַקיישאַנז פון ינפּעקציע

ווי אַזוי אַרבעט וואַקסינז?

וואַקסינז העלפֿן דיין גוף ס נאַטירלעך פֿאַרטײַדיקונג
(די ימיון סיסטעם) צו דערקענען און קעמפן זיכער
ינפּעקטיאָוס קרענק.

ווען איר באַקומען אַ וואַקצין, דיין ימיון סיסטעם איז
בוסטיד צו העלפֿן פֿאַרמײַדן איר קראַנק און צו באַשיצן
דיין שוואַנגערשאַפט. די אַנטיבאַדיעס דעמאָלט פֿאַרן
צו דיין אַנבאָרן בעיבי צו העלפֿן באַשיצן זיי פון געבורט
און אין די ערשטער וואָכן און חדשים פון לעבן.

קען איר ברוסטפּעד מיין בעיבי נאָך איר האָבן געהאַט אַ וואַקצין?

יאָ, עס איז זיכער צו ברוסטפּעד דיין בעיבי נאָך איר
האַט געהאַט MMR, פּלו, וואַפּינג הוסט און RSV
קסינז. פֿאַר עטלעכע וואַקסינז געגעבן בעשאַס
אַדער נאָך שוואַנגערשאַפט, דיין ברוסטמילק וועט
האַבן אַנטיבאַדיעס אין עס אַזוי איר קענען פֿאַרזעצן
צו טיילן דיין שוץ מיט דיין בעיבי דורך ברעסטפּידינג.

וואַקסינז געגעבן בעשאַס שוואַנגערשאַפט

וואַקסינז הוסט (פערטוססיס)

וואַקסינז הוסט איז אַ העכסט ינפֿעקטיאָוס קרענק וואָס קענען זיין זייער ערנסט פֿאַר קליין בייביז. רובֿ יונגע בייביז מיט וואַקסינז הוסט וועט דאַרפֿן שפיטאַל זאַרגן.

וואַקסינז הוסט קענען אָנמאַכן לאַנג בערסץ פון הוסט און דערשטיקן מאַכן עס שווער צו אָטעמען. די 'וואַקפֿ' ראַש איז געפֿירט דורך גאַספינג פֿאַר אָטעם נאָך יעדער פּלאַצן פון הוסט.

וואַקסינז הוסט קענען דויערן פֿאַר אַרום 2 אָדער 3 חודשים. דאָס קען פירן צו לונגענ-אָנצינדונג, פיץ און פערמאַנענט מאַרש שעדיקן. אין די ערגסטע פאלן, קען עס פאַרשאַפֿן טויט.

פארוואס טאן איך דאַרפֿן די וואַקסינז הוסט וואַקסינז?

ווייל אַ וואַקסינז הוסט וואַקסינז
בשעת איר זענט שוואַנגער
וועט בוסט דיין אייגן שוץ. די
אַנטיבאַדיעס אַז דיין גוף טראגט
וועט אויך זיין דורכגעגאנגען דורך
די פּלאַסענטאַ צו דיין בייבי.
די אַנטיבאַדיעס וועט העלפֿן
באַשיצן דיין בעיבי
קעגן וואַקסינז הוסט
אין זייער ערשטער
וואַכן פון לעבן.



ווען זאל איך האבן די וואקצין?

איר וועט נאָרמאַלי באַקומען דיין וואַפּינג הוסט וואַקצין אַרום די צייט פון דיין מיטן-שוואַנגערשאַפט יבערקוקן (יזשאַוואַלי 20 וואָכן), אָבער איר קענען האָבן עס אין 16 וואָכן.

אויב איר האָט ריטשט 20 וואָכן פון שוואַנגערשאַפט און נאָך נישט האָבן די וואַקצין, רעדן צו דיין GP כירורגיע אָדער אַקושערקע און מאַכן אַ אַפּווינטמאַנט צו האָבן די וואַקצין אין דיין ערשטער געלעגנהייט.

צו צושטעלן דיין בעיבי מיט דער בעסטער שוץ, איר זאל צילן צו באַקומען די וואַקצין דורך 32 וואָכן. אויב איר האָט מיסט דעם, איר קענען נאָך באַקומען די וואַקצין שפעטער, כאַטש עס קען זיין ווייניקער עפעקטיוו. אויב עס איז געווען ניט מעגלעך צו האָבן די וואַקצין איידער דיין בעיבי איז געבוירן, איר קענען נאָך האָבן עס דערנאָכדעם, וואָס וועט רעדוצירן די ריזיקירן פון פארשפרייטן וואַפּינג הוסט צו דיין בעיבי. עס איז וויכטיק צו האָבן די וואַפּינג הוסט וואַקצין בעשאַס יעדער שוואַנגערשאַפט צו בוסט דיין אַנטיבאָדי לעוועלס און העלפן באַשיצן אייער בעיבי.

איך געדאַנק ביי בייביז זענען געגעבן די וואַפּינג הוסט וואַקסאַניישאַן?

אין UK, בייביז זענען געגעבן די וואַפּינג הוסט וואַקצין ביי 8, 12 און 16 וואָכן פון עלטער. פילע בייביז וואָס האָבן אַ ערנסט וואַפּינג הוסט קרענק זענען ינפֿעקטאַד אין זייער ערשטער וואָכן פון לעבן. דער בלויז וועג צו באַשיצן דיין בייבי אין דעם צייט איז דורך די וואַקסאַניישאַן פון וואַפּינג הוסט בשעת איר זענט שוואַנגער.

ווי עפעקטיוו איז די וואַקצין?

UK שטודיום האָבן געוויזן אַז אַ וואַקצין אין שוואַנגערשאַפט איז אַרום 90% עפעקטיוו אין פרעווענטינג וואַפּינג הוסט אין ניי-געבוירן בייביז.

דער שוץ וואָס איר באַקומען פון די וואַקצין אויך מיטל אַז איר זענט ווייניקער מסתמא צו כאַפן וואַפּינג הוסט און געבן עס צו דיין בייבי.

וועלכע וואַקסין האב איך?

די וואַקצין וואָס מיר געבן אין שוואַנגערשאַפט אויך גיט שוץ קעגן טעטאַנוס און דיפטעריאַ. די זאָל בויען אויף די שוץ וואָס איר האָט באַקומען פון דיין רוטין וואַקסינז פֿאַר קינדער.

איר קענט לייענען וועגן די Adacel וואַקסאַניישאַן דאָ:
www.medicines.org.uk/emc/product/15553/pil#gref

איז די וואַפּינג הוסט וואַקצין זיכער צו האָבן אין שוואַנגערשאַפט?

פֿילע לענדער אין אייראָפּע, צפון און דרום אַמעריקע, אויסטראַליע און ניו זילאַנד נוצן די וואַפּינג הוסט וואַקצין אין שוואַנגערשאַפט און עס האט אַ ויסגעצייכנט זיכערהייט רעקאָרד.

עס איז פֿיל סאַפּער פֿאַר איר און דיין בעיבי צו האָבן די וואַקצין ווי צו ריזיקירן דיין ניי-געבוירן קאַטשינג הוסט.

הילף צו באַשיצן דיין בעיבי דורך די

וואַקסאַניישאַן פֿאַר וואַפּינג הוסט אין



יעדער שוואַנגערשאַפט. מאַכן זיכער אַז דיין בעיבי באַקומען זייער אייגן וואַקסאַניישאַן קעגן וואַפּינג הוסט אין 8, 12 און 16 וואָכן.

רעספעראַטאָרי סינסיטיאַל ווירוס (RSV)

רעספעראַטאָרי סינסיטיאַל ווירוס אָדער RSV איז אַ פראָסט ווירוס וואָס קענען אָנמאַכן אַ לונג ינפֿעקציע גערופֿן בראָנטשיאַליט. אין קליין בייביז, דעם צושטאַנד קען מאַכן עס שווער צו אַטעמען און קאַרמען. אין ענגלאַנד, אַרום 20,000 בייביז זענען אַדמיטאַד צו שפיטאַל יעדער יאָר מיט בראָנטשיאַליטיס און עטלעכע וועט דאַרפֿן אינטענסיווע זאַרגן. א קליינער צאל וועט שטאַרבן.

RSV איז מער מסתמא צו זיין ערנסט אין זייער יונגע בייביז, יענע געבוירן פרימאטשורלי און יענע מיט טנאים וואָס ווירקן זייער האַרץ, ברידינג אָדער ימיון סיסטעם. RSV ינפֿעקציעס קענען פאַסירן אַלע יאָר ארום אָבער קאָסעס פיקס יעדער ווינטער.

פארוואס זאל איך האָבן די וואַקצין קעגן RSV?

ווייל די RSV וואַקצין בשעת איר זענט שוואַנגער, וועט פאַרגרעסערן דיין שוץ. די אַנטיבאַדיעס וואָס דיין גוף פראָדוצירן וועט זיין דורכגעגאנגען צו דיין אַנבאָרן בעיבי. די אַנטיבאַדיעס וועט העלפֿן באַשיצן דיין בייבי קעגן RSV פון ווען זיי זענען געבוירן.

ווען זאל איך באַקומען די וואַקצין?

איר זאל זיין געפֿינט די וואַקצין אַרום די צייט פון דיין 28-וואָך אַנטענאַטאַל אַפּוינטמאַנט.

איר זאל פרובירן און האָבן דיין וואַקצין אין 28 וואָכן אָדער ווי באַלד ווי מעגלעך נאָך דעם. דאָס וועט העלפֿן איר צו בויען אַ גוט מדרגה פון אַנטיבאַדיעס צו פאַרן צו דיין בעיבי איידער איר געבורט.

איר קענען נאָך האָבן די וואַקצין שפּעטער אין דיין שוואַנגערשאַפט, אָבער עס קען זיין ווייניקער עפֿעקטיוו. אויב עס איז געווען ניט מעגלעך צו האָבן אַ דאָזע פריער, עס קענען זיין געגעבן רעכט ביז איר האָבן דיין בעיבי.

איר זאל האָבן די RSV וואַקצין אין יעדער שוואַנגערשאַפט צו געבן דיין נייע בעיבי דער בעסטער שוץ.

ווי עפעקטיוו איז די RSV וואַקצין?

שטודיום ווייזן אַז די RSV וואַקסאַניישאַן ראָדוסאַז די ריזיקירן פון שטרענג בראַנטשיאַליטיס אין דיין בעיבי מיט 70% בעשאַס די ערשטער 6 חדשים פון לעבן.

ווי אַלע מעדאַסאַנז, קיין וואַקצין איז גאַר עפעקטיוו און עטלעכע בייביז קען נאָך באַקומען RSV ינפעקציע טראָץ זייער מוטערס מיט די וואַקצין. אָבער, פֿאַר רובֿ בייביז געבוירן צו וואַקסאַנייטיד מאַמז, קיין RSV ינפעקציע זאָל זיין ווייניקער שטרענג.

וועלכע וואַקסין האב איך?

איר קענען לייענען וועגן עס דאָ: www.abrysvo.com

איז די RSV וואַקצין בעשאַס שוואַנגערשאַפט זיכער פֿאַר מיין בעיבי?

אין אַ קליניש פראָצעס פון כמעט 4,000 וואַמען, די וואַקצין האט אַ גוט זיכערקייט רעקאָרד און איז איצט באווייליקט דורך מעדיסינעס רעגולאַטאָרס אין די UK, אייראָפּע און די USA. פילע טויזנטער פון וואַמען האָבן זינט די וואַקצין אין די נאציאנאלע מגילה, אַריינגערעכנט מער ווי 100,000 וואַמען אין די USA.

אין די קליניש פראָצעס, אַ ביסל מער בייביז זענען געבוירן פרי אין די וואַקצין גרופּע ווי אין די גרופּע וואָס האט נישט האָבן אַ וואַקצין. דער חילוק סימז צו זיין רעכט צו צופאַל, אָבער דאָס איז איין סיבה וואָס די וואַקצין איז געגעבן פון 28 וואָכן, אלא ווי פריער אין דיין שוואַנגערשאַפט. קוילעלדיק, עס איז פיל סאַפּער פֿאַר איר און דיין בעיבי צו האָבן דיין וואַקצין ווי צו ריזיקירן דיין נייגעבוירן קאָטשינג די RSV ינפעקציע.

האָבן דיין RSV וואַקצין ווען איר זענט שוואַנגער צו געבן דיין בייבי דער בעסטער שוץ פֿאַר די ערשטער 6 חדשים פון לעבן.



ינפֿלוענציע (פֿלו)

וואָס איז פֿלו?

פֿלו איז אַ העכסט ינפֿעקטיאָוס קרענק מיט סימפטאָם אַזאַ ווי היץ, ציטערז, ייקס און פֿינז, כעדייקס און עקסטרעם מידנאַס. שוואַנגער פֿרויען האָבן אַ העכער געלעגנהייט צו אַנטוויקלען ערנסט קאָמפּלאַקיישאַנז פֿון פֿלו, דער הויפט אין די שפּעטער סטאַגעס פֿון שוואַנגערשאַפט, אַרייַנגערעכנט לונגענ-אַנצינדונג און אפילו טויט.

פֿלו קענען אויך סטראַשען דיין שוואַנגערשאַפט, לידינג צו צו פֿרי געבורט, נידעריק געבורט וואָג און סטימינג. פֿלו קענען אויך זיין גאָר ערנסט פֿאַר ניי-געבוירן בייביז און יונג קליינע קינדער.

פארוואס טאן איר דאַרפֿן די פֿלו וואַקצין אין שוואַנגערשאַפט?

די פֿלו וואַקצין ראָדוסאַז דיין שאַנס צו באַקומען ערנסט פֿלו, דאַרפֿן כאַספּיטאַלאַזיישאַן אָדער אינטענסיווע זאָרגן בעשאַס דיין שוואַנגערשאַפט. עס אויך ראָדוסאַז די ריזיקירן פֿון קאָמפּלאַקיישאַנז פֿון שוואַנגערשאַפט.

די וואַקצין בוסץ דיין אַנטיבאַדיעס קעגן פֿלו וואָס זענען דאָן דורכגעגאנגען צו דיין אַנבאָרן בעיבי. דאָס גיט עטלעכע שוץ צו דיין נייַע בעיבי פֿאַר די ערשטער חדשים פֿון לעבן.

איר וועט אויך זיין ווייניקער מסתמא צו כאַפֿן פֿלו און איבערגעבן עס צו דיין נייַע בעיבי איבער די ווינטער.

ווען זאָל איר האָבן די וואַקצין?

פֿלו וואַקצין איז יוזשאַוואַלי בנימצא פֿון סעפטעמבער יעדער יאָר און איז פֿריי פֿאַר שוואַנגער פֿרויען.

איר זאָל האָבן די וואַקצין אַמאָל עס ווערט בנימצא אין סעפטעמבער, וועלכער בינע פֿון שוואַנגערשאַפט איר זענט אין. ידעאָללי, איר זאָל האָבן דיין וואַקצין איידער די אָנהייב פֿון די פֿלו סעזאָן, אָבער איר קענען נאָך האָבן די וואַקצין אין קיין צייט אין די ווינטער.

איר וועט דאַרפֿן אַ פֿלו וואַקצין יעדער מאָל ווען איר זענט שוואַנגער אין די פֿלו סעזאָן.

איז די פלו וואַקסאַניישאַן זיכער צו האָבן בעשאַס שוואַנגערשאַפט?

זינט 2009, פילע לענדער האָבן געפֿינט אַ פלו וואַקצין אין שוואַנגערשאַפט, און מער ווי 2 מיליאָן וואַקסינז זענען געגעבן צו שוואַנגער פרויען אין ענגלאַנד. די וואַקסאַניישאַן האט אַ ויסגעצייכנט זיכערקייט רעקאָרד.

קוילעלדיק, עס איז פיל סאַפער פֿאַר איר צו האָבן דיין וואַקצין ווי צו ריזיקירן איר אָדער דיין בעיבי צו כאַפן די פלו ינפעקציע.

ווי עפעקטיוו איז די פלו וואַקצין?

ווייל די פלו וואַקצין אין שוואַנגערשאַפט העלפט די ריזיקירן פון איר אָדער דיין בייבי אין אַ פלו-ווי קראַנקייט. קליינע קינדער געבוירן צו וואַקסאַניטיד וואַמען זענען אַרום 70% ווייניקער מסתמא צו זיין אַדמיטאַד צו שפיטאַל מיט פלו אין די ערשטער 6 חדשים פון לעבן.

פלו קענען זיין אַ ערנסט קרענק פֿאַר שוואַנגער פרויען און זייער בייביז. שוואַנגער פרויען זאָל האָבן אַ פריי וואַקצין פֿאַר פלו בעשאַס יעדער שוואַנגערשאַפט. עס קענען זיין געגעבן אין קיין בינע פון שוואַנגערשאַפט סטאַרטינג פון סעפטעמבער.

וואָס זאָל איך איצט טאָן?

איר קענט רעדן מיט דיין GP פראַקטיסז, אַקושערקע אָדער געזונט מאַנשאַפֿט צו מאַכן אַ אַפוינטמאַנט צו האָבן דיין וואַקסינז. די פלו, כיפונג הוסט און RSV וואַקסינז זענען אַלע געגעבן ווי אַ איין ינדזשעקשאַן אין די אַרעם. פראַסט זייט ווירקונג זענען מילד און אַרייַנעמען:

- ווייטיקדיק און רעדנאָס אין די ינדזשעקשאַן פלאַץ
- קאָפּווייטיק און מוסקל ייקס
- מילד היץ אָדער מידנאָס

איר קענט לייענען דעם פלו בלעטל דאָ:

www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-who-should-have-it-this-winter-and-why


פאר איר זענט שוואַנגער

אויב איר זענט נישט שוואַנגער נאָך, אָבער איר האָפֿן צו זיין שוואַנגער אין דער נאָענט צוקונפט, איר זאָל מאַכן זיכער אַז איר זענט דערהיינטיקט מיט דיין אנדערע וואַקסינז.

רובעלאַ (דייטש מיזעלס)

רובעלאַ ינפעקציע איז נאָרמאַלי אַ מילד ינפעקציע וואָס ז אַ ויסשיט קרענק.

קאָטשינג רובעלאַ בעשאַס שוואַנגערשאַפט קענען זיין זייער ערנסט פֿאַר דיין בעיבי, קאָזינג אַ צושטאַנד גערופֿן קאָנדזשענאַטאַל רובעלאַ סינדראָם (CRS). CRS קען פירן צו טויבקיט, בלינדקייט, קאָטעראַקץ (אויג פראַבלעמס), האַרץ פראַבלעמס און / אָדער אַנטוויקלונג פאָרהאַלטן. דאָס קען אויך פירן צו דער טויט פון די בעיבי אָדער די באַשלוס צו האָבן אַ טערמאַניישאַן.



פּראָטעקטינג קעגן רובעללאַ קרענק בעשאַס שוואַנגערשאַפט

אויב איר האָט געהאט צוויי דאָסעס פון די MMR וואַקצין ווי אַ קינד, איר וועט זיין געזונט-פּראָטעקטעד בעשאַס דיין שוואַנגערשאַפט. דאָנק צו אונדזער געראַטן וואַקסאַניישאַן פּראָגראַם, רובעללאַ ינפּעקציע איז איצט גאָר זעלטן אין די UK.

אויב איר זענט נישט זיכער צי איר האָט געהאט די וואַקצין, איר קענט קאָנטראָלירן מיט דיין GP כירורגיע. אויב איר האָט מיסט אויס, איר זאָל כאַפן דיין וואַקסינז, ייִדילי איידער איר ווערן שוואַנגער. אַנדערש, איר זאָל האָבן די וואַקצין באַלד נאָך דיין בעיבי איז געבוירן. MMR וואַקצין כולל אַ לעבן (וויקאַנד) ווירוס אַזוי עס איז נישט אַדווייזד בעשאַס שוואַנגערשאַפט.

איך בין שוין שוואַנגער אָבער איך האָבן ניט געהאט מיין MMR, וואָס זאָל איך טאָן?

אַמאָל איר האָט געבורט, איר קענען האָבן דיין MMR וואַקסינז. דעם וועט באַשיצן איר און דיין בעיבי פון מיזעלס און רובעללאַ. ביידע דאָסעס פון MMR וועט אויך געבן איר אַ לאַנג-טערמין שוץ קעגן מיזעלס און מאַמפּ.

ויסשיט אין שוואַנגערשאַפט

וואָס זאָל איך טאָן אויב איך קומען אין קאַנטאַקט מיט עמעצער מיט ויסשיט אָדער אויב איך האָבן אַ ויסשיט?

עטלעכע ינפעקשאַנז וואָס פאַרשאַפן אַ ויסשיט, אַרייַנגערעכנט רובעללאַ, קענען פירן צו קאַמפלאַקיישאַנז אין שוואַנגער פרויען. אפילו אויב איר זענט פראָטעקטעד פון רובעללאַ, איר מוזן לאָזן דיין אַקושערקע, GP דער אַבסטאַטרישאַן גלייך וויסן אויב איר האָט אַ ויסשיט קראַנקייט אָדער איר האָט קיין קאַנטאַקט מיט אן אנדער מענטש מיט אַ ויסשיט אין קיין צייט בעשאַס דיין שוואַנגערשאַפט.

ביטע ויסמיידן קיין אַנטענאַטאַל קליניק, מאַטערניטי באַשטעטיקן אָדער אנדערע שוואַנגער פרויען ביז איר האָט שוין אַן אַססעסעד.

איר קען זיין געפֿינט טעסץ צו געפֿינען אויס אויב איר האָבן שוין ינפעקטאָד. דער געזונט פראָפּעססיאָנאַל וואָס אַססעסס איר וועט דאַרפֿן צו וויסן:

- ווי פילע וואָכן שוואַנגער איר זענט
- ווען דער קאַנטאַקט מיט עמעצער מיט אַ ויסשיט קראַנקייט איז געווען
- די דאַטע אַז איר ערשטער דעוועלאָפּעד אָדער האָט קאַנטאַקט מיט עמעצער מיט אַ ויסשיט
- אַ באַשרייַבונג פון די ויסשיט (איז עס אַ אויפשטיין, באַמפי ויסשיט אָדער איז עס בליסטערז אַנגעפילט מיט פליסיק?)
- וואָס ינפעקשאַנז איר האָט געהאט אין דער פאַרגאַנגענהייט אַזאַ ווי הינדל פאַקס, מיזעלס
- וואָס וואָקסינז איר האָבן ביז אַהער געהאט

אויב איר קומען אין קאַנטאַקט מיט עמעצער מיט אַ ויסשיט אָדער אויב איר אַנטוויקלען אַ ויסשיט בשעת איר זענט שוואַנגער, באַקומען עצה פון דיין GP אָדער אַקושערקע ווי באַלד ווי איר קענען. אויב איר פאַרהאַלטן ריפּאָרטינג אַ ויסשיט קראַנקייט עס קען נישט זיין מעגלעך צו געבן איר אן פינטלעך דיאַגנאָסיס אָדער קיין רעקאַמענדיד באַהאַנדלונג.



אנדערע וואַקסינז צו דיסקוטירן מיט דיין אַקושערקע

19-COVID

די ריזיקירן פון קאטשינג 9-COVID אין שוואנגערשאפט איז פיל נידעריקער ווי עס איז געווען אין די אָנהייב פון די פאנדעמיק, אָבער שוואנגער פרויען זענען נאך בארעכטיגט פֿאַר וואַקסאַניישאַן אין דער האַרבסט. די וואַקצין וועט רעדוצירן דיין געלעגנהייט צו האָבן ערנסט 19-COVID פֿאַר אַ ביסל חדשים, וואָס קען זיין מער וויכטיק אויב איר האָט אַן אַנדערליינג מעדיציניש צושטאַנד. די אַנטיבאַדיעס אַז דיין גוף טראגט וועט זיין דורכגעגאנגען צו דיין אַנבאַרן בעיבי און צושטעלן עטלעכע שוץ צו דיין בעיבי אין די פרי וואָכן און חדשים.

העפּאַטיטיס B

ביי געבורט, בייביז געבוירן צו מוטערס וואָס האָבן די העפּאַטיטיס B ינפעקציע (אָדער יענע וואָס פרובירן positive פֿאַר העפּאַטיטיס B בעשאַס שוואנגערשאפט) זאָל האָבן העפּאַטיטיס B וואַקצין גלייך ווי זיי זענען געבוירן. אָרדענונג זאָל זיין געמאכט מיט דיין GP סערדזשערי פֿאַר דיין בייבי צו האָבן ווייטער דאָסעס פון וואַקצין און אַ בלוט פרובירן ווען ער אָדער זי איז 1 יאָר אַלט צו טעסטירן פֿאַר ינפעקציע. www.gov.uk/government/publications/protecting-your-baby-against-hepatitis-b-leaflet

BCG

בייביז געבוירן צו אַ פאָטער (אָדער וואָס האָבן אַ זיידע-
באָבע) פֿון אַ לאַנד וווּ TB יז פראָסט, זאָל האָבן אַ
BCG וואַקצין צו באַשיצן זיי פון TB [www.gov.uk/
government/publications/tb-bcg-and-your-baby-
leaflet](http://www.gov.uk/government/publications/tb-bcg-and-your-baby-leaflet)

ווייל די רעקאָמענדירט וואַקסינז בעשאָס 
שוואַנגערשאַפט (און נאָך דיין בעיבי איז געבוירן)
איז איינער פון די מערסט עפעקטיוו טינגז צו רעדוצירן
די ריזיקירן פון וואַקצין פּריווענטאַבאַל ינפּעקשאַנז פֿאַר
איר און דיין בעיבי.

צו ענשור אַז דיין בעיבי באַקומען זייער אייגענע
וואַקסינז אין 8, 12 און 16 וואָכן, מיטל אַז דער שוץ וועט
פאַרזעצן אין זייער מערסט שפּירעוואַדיק יאָרן.

פֿאַרבינדונגען צו מער אינפֿארמאַציע

- [www.nhs.uk/Conditions/vaccinations/
Pages/vaccination-schedule-age-
checklist.aspx](http://www.nhs.uk/Conditions/vaccinations/Pages/vaccination-schedule-age-checklist.aspx)
- [www.gov.uk/government/collections/
immunisation](http://www.gov.uk/government/collections/immunisation)
- [/www.medicines.org.uk/emc](http://www.medicines.org.uk/emc)
- צו לערנען וועגן וואַקסינז פֿאַר דיין בעיבי אין
דער ערשטער יאָר פון לעבן, איר קענען לייענען
[www.gov.uk/government/publications/a-
guide-to-immunisations-for-babies-up-
to-13-months-of-age](http://www.gov.uk/government/publications/a-guide-to-immunisations-for-babies-up-to-13-months-of-age)

שוואַנגערשאַפט וואַקצין רעקאָרד

רעקאָרדירן דיין שוואַנגערשאַפט וואַקסינז אונטן צו
ענשור אַז איר און דיין בעיבי טאָן ניט פאַרפירן שוץ
קעגן פּלו, וואַפּינג הוסט

וואַקצין	ווען צו האָבן עס	טאָג געגעבן
פּלו	בעשאַס די פּלו צייט אין קיין צייט בעשאַס דיין שוואַנגערשאַפט.	
וואַפּינג הוסט	ידעאָללי נאָך דיין 18 צו 20 וואָכן יבערקוקן. קענען זיין געגעבן פון 16 וואָכן צו דער צייט איר געבן געבורט.	
RSV	איר זאָל האָבן דיין RSV וואַקצין אַמאָל איר זענט 28 וואָכן שוואַנגער.	
MMR דאָזע *1	נאָך דיין בעיבי איז געבוירן, אין דיין 6-וואָך פּאָסטן-נאַטאַל טשעק (מיט GP אָדער פּראַקטיסיז ניאַניע).	
MMR דאָזע *2	פיר וואָכן נאָך ערשטער דאָזע (ווי אויבן).	
*אויב קיין פריערדיקן וואַקצין		

ווייל דיין וואַקסינז בשעת שוואַנגער העלפּט צו
באַשיצן אייער שוואַנגערשאַפּט. רעדן צו דיין
אַקושערקע, GP פּראַקטיסיז אָדער געזונט
מאַנשאַפּט און מאַכן זיכער אַז איר האָבן זיי אין
דער בעסטער צייט פֿאַר איר.



Crown copyright ©
24PYPB01YI Yiddish. 1P 250K OCT 2024 2024
UK Health Security Agency gateway number: 2024722
ערשט פארעפנטלעכט יוני 2024

דער בלעטל איז אויך בנימצא איבערגעזעצט אין אַ רײ שפּראַכן און צוטריטלעך
פֿאַרמאַטירונגען. צו סדר מער קאַפּיעס פֿון דעם בלאַט באַזוכן: www.healthpublications.gov.uk
אָדער פֿאָן: 0300 123 1002 :Minicom, 0300 123 1003
(8:00 צו 18:00, מאנטיק צו פֿרייטאָג)

www.nhs.uk/conditions/vaccinations/nhs-vaccinations-and-when-to-have-them