

שוואַנגער?

די וואַקסינז העלפס צו באַשיצן איר,
דיין בעיבי און דיין שוואַנגערשאַפט

פלו (ינפלוענציע)

וואַאָפינג הוסט
(פערטוסיס)

רעספעראַטאָרי סינסיטיאַל
ווירוס (RSV)

מיט נאָך עצות אויף
אנדערע וואַקסינז און ווען
צו באַקומען זיי

וואַקסינז געגעבן בעשאַס שוואַנגערשאַפט

וואַקסינז הוסט (פערטוססיס)

וואַקסינז הוסט איז אַ העכסט ינפעקטיוּס קרענק וואָס קענען זיין זייער ערנסט פֿאַר קליין בייביז. רובֿ יונגע בייביז מיט וואַקסינז הוסט וועט דאַרפֿן שפּיטאַל זאָרגן.

וואַקסינז הוסט קענען אַנמאַכן לאַנג בערסץ פון הוסט און דערשטיקן מאַכן עס שווער צו אָטעמען. די 'וואַקס' ראָש איז געפֿירט דורך גאַספּינג פֿאַר אָטעם נאָך יעדער פּלאַצן פון הוסט.

וואַקסינז הוסט קענען דויערן פֿאַר אַרום 2 אָדער 3 חודשים. דאָס קען פירן צו לונגע-אַנצינדונג, פיץ און פערמאַנענט מאַרש שעדיקן. אין די ערגסטע פאלן, קען עס פאַרשאַפֿן טויט.

פאַרוואָס טאָן איר דאַרפֿן די וואַקסינז הוסט וואַקצין?

ווייל אַ וואַקסינז הוסט וואַקצין בשעת איר זענט שוואַנגער וועט בוסט דיין אייגן שוץ. די אַנטיבאַדיעס אַז דיין גוף טראַגט וועט אויך זיין דורכגעגאַנגען דורך די פּלאַסענטאַ צו דיין בייבי. די אַנטיבאַדיעס וועט העלפֿן באַשיצן דיין בעיבי קעגן וואַקסינז הוסט אין זייער ערשטער וואָכן פון לעבן.



דער בלאַט באַשרייבט די פריי וואַקסינז וואָס העלפֿן באַשיצן

- דיין
 - אייער שוואַנגערשאַפט, און
 - דיין ניין - געבוירן בעיבי
- פֿון די קאַמפּלאַקיישאַנז פון ינפעקציע

ווי אַזוי אַרבעט וואַקסינז?

וואַקסינז העלפֿן דיין גוף ס נאַטירלעך פֿאַרטיידיקונג (די ימיון סיסטעם) צו דערקענען און קעמפֿן זיכער ינפעקטיוּס קרענק.

ווען איר באַקומען אַ וואַקצין, דיין ימיון סיסטעם איז בוסטיד צו העלפֿן פֿאַרמייַדן איר קראַנק און צו באַשיצן דיין שוואַנגערשאַפט. די אַנטיבאַדיעס דעמאָלט פֿאַרן צו דיין אַנבאַרן בעיבי צו העלפֿן באַשיצן זיי פון געבורט און אין די ערשטער וואָכן און חדשים פון לעבן.

קען איר ברוסטפֿעד מיין בעיבי נאָך איר האָבן געהאַט אַ וואַקצין?

יא, עס איז זיכער צו ברוסטפֿעד דיין בעיבי נאָך איר האָט געהאַט MMR, פּלו, וואַקסינז הוסט און RSV קסינז. פֿאַר עטלעכע וואַקסינז געגעבן בעשאַס אָדער נאָך שוואַנגערשאַפט, דיין ברוסטמילק וועט האָבן אַנטיבאַדיעס אין עס אַזוי איר קענען פֿאַרזעצן צו טיילן דיין שוץ מיט דיין בעיבי דורך ברעסטפֿידינג.

ווען זאל איך האבן די וואקצין?

איר וועט נארמאלי באקומען דיין וואקציניג הוסט וואקצין ארום די צייט פון דיין מיטן-שוואנגערשאפט יבערקוקן (יזשאוואלי 20 וואכן), אבער איר קענען האבן עס אין 16 וואכן.

אויב איר האט ריטשט 20 וואכן פון שוואנגערשאפט און נאך נישט האבן די וואקצין, רעדן צו דיין GP כירורגיע אדער אקושערקע און מאכן א אפוינטמאנט צו האבן די וואקצין אין דיין ערשטער געלעגנהייט.

צו צושטעלן דיין בעיבי מיט דער בעסטער שוץ, איר זאל צילן צו באקומען די וואקצין דורך 32 וואכן. אויב איר האט מיסט דעם, איר קענען נאך באקומען די וואקצין שפעטער, כאטש עס קען זיין ווייניקער עפעקטיוו. אויב עס איז געווען ניט מעגלעך צו האבן די וואקצין איידער דיין בעיבי איז געבוירן, איר קענען נאך האבן עס דערנאכדעם, וואס וועט רעדוצירן די ריזיקירן פון פארשפרייטן וואקציניג הוסט צו דיין בעיבי. עס איז וויכטיק צו האבן די וואקציניג הוסט וואקצין בעשאס יעדער שוואנגערשאפט צו בוסט דיין אנטזיבאדי לעוועלס און העלפן באשיצן אייער בעיבי.

איך געדאנק ביי בייביז זענען געגעבן די וואקציניג הוסט וואקסאניישאן?

אין UK, בייביז זענען געגעבן די וואקציניג הוסט וואקצין ביי 8, 12 און 16 וואכן פון עלטער. פילע בייביז וואס האבן א ערנסט וואקציניג הוסט קרענק זענען ינפעקטאד אין זייער ערשטער וואכן פון לעבן. דער בלוז וועג צו באשיצן דיין בייבי אין דעם צייט איז דורך די וואקסאניישאן פון וואקציניג הוסט בשעת איר זענט שוואנגער.

ווי עפעקטיוו איז די וואקצין?

UK שטודיום האבן געוויזן אז א וואקצין אין שוואנגערשאפט איז ארום 90% עפעקטיוו אין פרעווענטינג וואקציניג הוסט אין ניי-געבוירן בייביז.

דער שוץ וואס איר באקומען פון די וואקצין אויך מיטל אז איר זענט ווייניקער מסתמא צו כאפן וואקציניג הוסט און געבן עס צו דיין בייבי.

וועלכע וואקסין האב איך?

די וואקצין וואס מיר געבן אין שוואנגערשאפט אויך גיט שוץ קעגן טעטאנוס און דיפטעריא. די זאל בויען אויף די שוץ וואס איר האט באקומען פון דיין רוטיין וואקסינז פאר קינדער.

איר קענט לייענען וועגן די Adacel וואקסאניישאן דא: www.medicines.org.uk/emc/product/15553/pil#gref

איז די וואקציניג הוסט וואקצין זיכער צו האבן אין שוואנגערשאפט?

פילע לענדער אין אייראפע, צפון און דרום אמעריקע, אויסטראליע און ניו זילאנד נוצן די וואקציניג הוסט וואקצין אין שוואנגערשאפט און עס האט א ויסגעצייכנט זיכערהייט רעקארד.

עס איז פיל סאפער פאר איר און דיין בעיבי צו האבן די וואקצין ווי צו ריזיקירן דיין ניי-געבוירן קאטשינג הוסט.

« הילף צו באשיצן דיין בעיבי דורך די וואקסאניישאן פאר וואקציניג הוסט אין יעדער שוואנגערשאפט. מאכן זיכער אז דיין בעיבי באקומען זייער אייגן וואקסאניישאן קעגן וואקציניג הוסט אין 8, 12 און 16 וואכן.

רעספעראַטאָרי סינסיטיאַל ווירוס (RSV)

רעספעראַטאָרי סינסיטיאַל ווירוס אָדער RSV איז אַ פּראָסט ווירוס וואָס קענען אָנמאַכן אַ לונג ינפּעקציע גערופן בראַנטשיאַליטי. אין קליין בייביז, דעם צושטאַנד קען מאַכן עס שווער צו אַטעמען און קאַרמען. אין ענגלאַנד, אַרום 20,000 בייביז זענען אַדמיטאַד צו שפיטאַל יעדער יאָר מיט בראַנטשיאַליטיס און עטלעכע וועט דאַרפֿן אינטענסיווע זאָרגן. אַ קליינע ר צאל וועט שטאַרבן.

RSV איז מער מסתמא צו זיין ערנסט אין זייער יונגע בייביז, יענע געבוירן פרימאַטשורלי און יענע מיט טנאָים וואָס ווירקן זייער האַרץ, ברידינג אָדער ימיון סיסטעם. RSV ינפּעקציעס קענען פאַסירן אַלע יאָר אַרום אָבער קאָסעס פיקס יעדער ווינטער.

פארוואס זאל איך האָבן די וואַקצין קעגן RSV?

ווייל די RSV וואַקצין בשעת איר זענט שוואַנגער, וועט פאַרגרעסערן דיין שוץ. די אַנטיבאָדיעס וואָס דיין גוף פּראָדוצירן וועט זיין דורכגעגאנגען צו דיין אַנבאָרן בעיבי. די אַנטיבאָדיעס וועט העלפֿן באַשיצן דיין בייבי קעגן RSV פון ווען זיי זענען געבוירן.

ווען זאל איך באַקומען די וואַקצין?

איר זאל זיין געפֿינט די וואַקצין אַרום די צייט פון דיין 28-וואָך אַנטענאַטאַל אַפּוינטמאַנט.

איר זאל פרובירן און האָבן דיין וואַקצין אין 28 וואָכן אָדער ווי באַלד ווי מעגלעך נאָך דעם. דאָס וועט העלפֿן איר צו בויען אַ גוט מדרגה פון אַנטיבאָדיעס צו פאַרן צו דיין בעיבי איידער איר געבורט.

איר קענען נאָך האָבן די וואַקצין שפּעטער אין דיין שוואַנגערשאַפט, אָבער עס קען זיין ווייניקער עפּעקטיוו. אויב עס איז געווען ניט מעגלעך צו האָבן אַ דאָזע פריער, עס קענען זיין געגעבן רעכט ביז איר האָבן דיין בעיבי.

איר זאל האָבן די RSV וואַקצין אין יעדער שוואַנגערשאַפט צו געבן דיין נייע בעיבי דער בעסטער שוץ.

ווי עפּעקטיוו איז די RSV וואַקצין?

שטודיום ווייזן אַז די RSV וואַקסאַניישאַן ראָדוסאַז די ריזיקירן פון שטרענג בראַנטשיאַליטיס אין דיין בעיבי מיט 70% בעשאַס די ערשטער 6 חדשים פון לעבן.

ווי אַלע מעדאַסאַנז, קיין וואַקצין איז גאָר עפּעקטיוו און עטלעכע בייביז קען נאָך באַקומען RSV ינפּעקציע טראָץ זייער מוטערס מיט די וואַקצין. אָבער, פֿאַר רובֿ בייביז געבוירן צו וואַקסאַנייטיד מאַמז, קיין RSV ינפּעקציע זאל זיין ווייניקער שטרענג.

וועלכע וואַקסין האב איך?

איר קענען לייענען וועגן עס דאָ: www.abrysvo.com

איז די RSV וואַקצין בעשאַס שוואַנגערשאַפט זיכער פֿאַר מיין בעיבי?

אין אַ קליניש פּראָצעס פון כמעט 4,000 וואַמען, די וואַקצין האט אַ גוט זיכערקייט רעקאָרד און איז איצט באווייליקט דורך מעדיסינעס רעגולאַטאָרס אין די UK, אייראָפּע און די USA. פילע טויזנטער פון וואַמען האָבן זינט די וואַקצין אין די נאציאנאלע מגילה, אַריינגערעכנט מער ווי 100,000 וואַמען אין די USA.

אין די קליניש פּראָצעס, אַ ביסל מער בייביז זענען געבוירן פרי אין די וואַקצין גרופּע ווי אין די גרופּע וואָס האט נישט האָבן אַ וואַקצין. דער חילוק סימז צו זיין רעכט צו צופאַל, אָבער דאָס איז איין סיבה וואָס די וואַקצין איז געגעבן פון 28 וואָכן, אלא ווי פריער אין דיין שוואַנגערשאַפט. קוילעלדיק, עס איז פיל סאַפּער פֿאַר איר און דיין בעיבי צו האָבן דיין וואַקצין ווי צו ריזיקירן דיין נייע-געבוירן קאָטשינג די RSV ינפּעקציע.

האָבן דיין RSV וואַקצין ווען איר זענט שוואַנגער צו געבן דיין בייבי דער בעסטער שוץ פֿאַר די ערשטער 6 חדשים פון לעבן.



ינפלווענציע (פלו)

וואָס איז פֿלו?

פֿלו איז אַ העכסט ינפֿעקטײַאָס קרענק מיט סימפטאָמס אַזאַ ווי היץ, ציטערז, ייקס און פֿינז, כעדייקס און עקסטרעם מידנאָס. שוואַנגער פֿרויען האָבן אַ העכער געלעגנהייט צו אַנטוויקלען ערנסט קאָמפּלאַקיישאַנז פֿון פֿלו, דער הויפט אין די שפּעטער סטאַגעס פֿון שוואַנגערשאַפט, אַרייַנגערעכנט לונגענ-אַנצײנדונג און אפילו טויט.

פֿלו קענען אויך סטראַשען דיין שוואַנגערשאַפט, לידינג צו צו פֿרי געבורט, נידעריק געבורט וואָג און סטימינג.

פֿלו קענען אויך זיין גאָר ערנסט פֿאַר נײַ-געבוירן בייביז און יונג קליינע קינדער.

פארוואס טאָן איך דאַרפֿן די פֿלו וואַקצין אין שוואַנגערשאַפט?

די פֿלו וואַקצין ראָדוסאַז דיין שאַנס צו באַקומען ערנסט פֿלו, דאַרפֿן כאַספּיטאַלאַזיישאַן אָדער אינטענסיווע זאָרגן בעשאַס דיין שוואַנגערשאַפט. עס אויך ראָדוסאַז די ריזיקירן פֿון קאָמפּלאַקיישאַנז פֿון שוואַנגערשאַפט.

די וואַקצין בוסץ דיין אַנטיבאַדיעס קעגן פֿלו וואָס זענען דאָן דורכגעגאנגען צו דיין אנבאַרן בעיבי. דאָס גיט עטלעכע שוין צו דיין נײַע בעיבי פֿאַר די ערשטער חדשים פֿון לעבן.

איר וועט אויך זיין ווייניקער מסתמא צו כאַפֿן פֿלו און איבערגעבן עס צו דיין נײַע בעיבי איבער די ווינטער.

ווען זאָל איך האָבן די וואַקצין?

פֿלו וואַקצין איז יוזשאַוואַלי בנימצא פֿון סעפטעמבער יעדער יאָר און איז פֿריי פֿאַר שוואַנגער פֿרויען.

איר זאָל האָבן די וואַקצין אַמאָל עס ווערט בנימצא אין סעפטעמבער, וועלכער בינע פֿון שוואַנגערשאַפט איר זענט אין. ידעאָללי, איר זאָל האָבן דיין וואַקצין איידער די אָנהייב פֿון די פֿלו סעזאָן, אָבער איר קענען נאָך האָבן די וואַקצין אין קיין צייט אין די ווינטער.

איר וועט דאַרפֿן אַ פֿלו וואַקצין יעדער מאָל ווען איר זענט שוואַנגער אין די פֿלו סעזאָן.

איז די פֿלו וואַקסאַנישאַן זיכער צו האָבן בעשאַס שוואַנגערשאַפט?

זינט 2009, פֿילע לענדער האָבן געפֿינט אַ פֿלו וואַקצין אין שוואַנגערשאַפט, און מער ווי 2 מיליאָן וואַקסינז זענען געגעבן צו שוואַנגער פֿרויען אין ענגלאַנד. די וואַקסאַנישאַן האט אַ ויסגעצייכנט זיכערקייט רעקאָרד.

קוילעלדיק, עס איז פֿיל סאַפּער פֿאַר איר צו האָבן דיין וואַקצין ווי צו ריזיקירן איר אָדער דיין בעיבי צו כאַפֿן די פֿלו ינפֿעקציע.

ווי עפעקטיוו איז די פֿלו וואַקצין?

ווייל די פֿלו וואַקצין אין שוואַנגערשאַפט העלפט די ריזיקירן פֿון איר אָדער דיין בייבי אין אַ פֿלו-ווי קראַנקייט. קליינע קינדער געבוירן צו וואַקסאַניטיד וואָמען זענען אַרום 70% ווייניקער מסתמא צו זיין אַדמיטאַד צו שפיטאַל מיט פֿלו אין די ערשטער 6 חדשים פֿון לעבן.

« פֿלו קענען זיין אַ ערנסט קרענק פֿאַר שוואַנגער פֿרויען און זייער בייבי. שוואַנגער פֿרויען זאָל האָבן אַ פֿריי וואַקצין פֿאַר פֿלו בעשאַס יעדער שוואַנגערשאַפט. עס קענען זיין געגעבן אין קיין בינע פֿון שוואַנגערשאַפט סטאַרטינג פֿון סעפטעמבער.

וואָס זאָל איך איצט טאָן?

איר קענט רעדן מיט דיין GP פּראַקטיסז, אַקושערקע אָדער געזונט מאַנשאַפֿט צו מאַכן אַ אַפּוינטמאַנט צו האָבן דיין וואַקסינז. די פֿלו, כיפּונג הוסט און RSV וואַקסינז זענען אַלע געגעבן ווי אַ איין ינדזשעקשאַן אין די אַרעם. פּראַסט זײַט ווירקונג זענען מילד און אַרייַנעמען:

- ווייטיקדיק און רעדנאָס אין די ינדזשעקשאַן פּלאַץ
- קאָפּווייטיק און מוסקל ייקס
- מילד היץ אָדער מידנאָס

איר קענט לייענען דעם פֿלו בלעטל דאָ:

www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-who-should-have-it-this-winter-and-why

פאר איר זענט שוואנגער

אויב איר זענט נישט שוואנגער נאך, אָבער איר האָפֿן צו זיין שוואנגער אין דער נאָענט צוקונפט, איר זאל מאַכן זיכער אַז איר זענט דערהיינטיקט מיט דיין אנדערע וואַקסינז.

רובעללאַ (דייַטש מיזעלס)

רובעללאַ ינפעקציע איז נאָרמאַלי אַ מילד ינפעקציע וואָס ז אַ ויסשיט קרענק.

קאָטשינג רובעללאַ בעשאַס שוואנגערשאַפט קענען זיין זייער ערנסט פֿאַר דיין בעיבי, קאָזינג אַ צושטאַנד גערופֿן קאַנדזשענאַטאַל רובעללאַ סינדראָם (CRS). CRS קען פירן צו טויביקייט, בלינדקייט, קאָטעראַקץ (אויג פראַבלעמס), האַרץ פראַבלעמס און / אָדער אַנטוויקלונג פאַרהאַלטן. דאָס קען אויך פירן צו דער טויט פון די בעיבי אָדער די באַשלוס צו האָבן אַ טערמאַניישאַן.

פראַטעקטינג קעגן רובעללאַ קרענק בעשאַס שוואנגערשאַפט

אויב איר האָט געהאַט צוויי דאָסעס פון די MMR וואַקצין ווי אַ קינד, איר וועט זיין געזונט-פראַטעקטעד בעשאַס דיין שוואנגערשאַפט. דאָנק צו אונדזער געראָטן וואַקסאַניישאַן פראַגראַם, רובעללאַ ינפעקציע איז איצט גאָר זעלטן אין די UK.

אויב איר זענט נישט זיכער צי איר האָט געהאַט די וואַקצין, איר קענט קאָנטראָלירן מיט דיין GP כירורגיע. אויב איר האָט מיסט אויס, איר זאל כאַפֿן דיין וואַקסינז, ייִדילי איידער איר ווערן שוואנגער. אַנדערש, איר זאל האָבן די וואַקצין באַלד נאָך דיין בעיבי איז געבוירן.

MMR וואַקצין כולל אַ לעבן (וויקאַנד) ווירוס אַזוי עס איז נישט אַדווייזד בעשאַס שוואנגערשאַפט.

איך בין שוין שוואנגער אָבער איך האָבן ניט געהאַט מייַן MMR, וואָס זאל איך טאָן?

אַמאָל איר האָט געבורט, איר קענען האָבן דיין MMR וואַקסינז. דעם וועט באַשיצן איר און דיין בעיבי פון מיזעלס און רובעללאַ. ביידע דאָסעס פון MMR וועט אויך געבן איר אַ לאַנג-טערמין שוץ קעגן מיזעלס און מאַמפּ.

וואס זאל איך טאן אויב איך קומען אין קאנטאקט מיט עמעצער מיט ויסשיט אדער אויב איך האבן א ויסשיט?

עטלעכע ינפעקשאנז וואס פארשאפן א ויסשיט, אריינגערעכנט רובעלא, קענען פירן צו קאמפלאקיישאנז אין שוואנגער פרויען. אפילו אויב איר זענט פראטעקטעד פון רובעלא, איר מוזן לאזן דיין אקווערקע, GP דער אבסטאטרישאן גלייך וויסן אויב איר האט א ויסשיט קראנקייט אדער איר האט קיין קאנטאקט מיט אן אנדער מענטש מיט א ויסשיט אין קיין צייט בעשאס דיין שוואנגערשאפט.

ביטע ויסמיידן קיין אנטענאטאל קליניק, מאטערניטי באשטעטיקן אדער אנדערע שוואנגער פרויען ביז איר האט שוין אסעסעטעד.

איר קען זיין געפֿינט טעסץ צו געפֿינען אויס אויב איר האבן שוין ינפעקטאד. דער געזונט פראפעססיאנאל וואס אסעסעט איר וועט דארפן צו וויסן:

- ווי פילע וואכן שוואנגער איר זענט
- ווען דער קאנטאקט מיט עמעצער מיט א ויסשיט קראנקייט איז געווען
- די דאטע אז איר ערשטער דעוועלאפעד אדער האט קאנטאקט מיט עמעצער מיט א ויסשיט
- א באשרייבונג פון די ויסשיט (איז עס א אויפשטיין, באמפי ויסשיט אדער איז עס בליסטערז אנגעפילט מיט פליסיק?)
- וואס ינפעקשאנז איר האט געהאט אין דער פארגאנגענהייט אזא ווי הינדל פאקס, מיזעלס
- וואס וואקסינז איר האבן ביז אהער געהאט

« אויב איר קומען אין קאנטאקט מיט עמעצער מיט א ויסשיט אדער אויב איר אנטוויקלען א ויסשיט בשעת איר זענט שוואנגער, באקומען עצה פון דיין GP אדער אקווערקע ווי באלד ווי איר קענען. אויב איר פארהאלטן ריפארטינג א ויסשיט קראנקייט עס קען נישט זיין מעגלעך צו געבן איר אן פינטלעך דיאגנאסיס אדער קיין רעקאמענדיד באהאנדלונג.

אנדערע וואקסינז צו דיסקוטירן מיט דיין אקווערקע

19-COVID

די ריזיקירן פון קאטשינג 9-COVID אין שוואנגערשאפט איז פיל נידעריקער ווי עס איז געווען אין די אנהייב פון די פאנדעמיק, אבער שוואנגער פרויען זענען נאך בארעכטיגט פאר וואקסאנישאן אין דער הארבסט. די וואקסין וועט רעדוצירן דיין געלעגנהייט צו האבן ערנסט 19-COVID פאר א ביסל חדשים, וואס קען זיין מער וויכטיק אויב איר האט אן אנדערליינג מעדיציניש צושטאנד. די אנטביאדיעס אַז דיין גוף טראגט וועט זיין דורכגעגאנגען צו דיין אנבאָרן בעיבי און צושטעלן עטלעכע שוץ צו דיין בעיבי אין די פרי וואכן און חדשים.

העפאטיטיס B

ביי געבורט, בייביז געבוירן צו מוטערס וואס האבן די העפאטיטיס B ינפעקציע (אדער יענע וואס פרובירן positive פאר העפאטיטיס B בעשאס שוואנגערשאפט) זאל האבן העפאטיטיס B וואקסין גלייך ווי זיי זענען געבוירן. ארדענונג זאל זיין געמאכט מיט דיין GP סערדזשערי פאר דיין בייבי צו האבן ווייטער דאָסעס פון וואקסין און א בלוט פרובירן ווען ער אדער זי איז 1 יאָר אלט צו טעסטירן פאר ינפעקציע. www.gov.uk/government/publications/protecting-your-baby-against-hepatitis-b-leaflet

בייביז געבוירן צו א פאטער (אדער וואס האבן א זיידע-
באבע) פון א לאנד ווו TB יז פראסט, זאל האבן א
BCG וואקצין צו באשיצן זיי פון TB [www.gov.uk/
government/publications/tb-bcg-and-your-baby-leaflet](http://www.gov.uk/government/publications/tb-bcg-and-your-baby-leaflet)

« ווייל די רעקאמענדיד וואקסינז בעשאס
שוואנגערשאפט (און נאך דיין בעיבי איז געבוירן)
איז איינער פון די מערסט עפעקטיוו טינגז צו רעדוצירן
די ריזיקירן פון וואקצין פריווענטאבאל ינפעקשאנז פאר
איר און דיין בעיבי.

צו ענשור אז דיין בעיבי באקומען זייער אייגענע
וואקסינז אין 8, 12 און 16 וואכן, מיטל אז דער שוץ וועט
פארזעצן אין זייער מערסט שפירעוודיק יארן.

פארבינדונגען צו מער אינפארמאציע

- [www.nhs.uk/Conditions/vaccinations/
Pages/vaccination-schedule-age-
checklist.aspx](http://www.nhs.uk/Conditions/vaccinations/Pages/vaccination-schedule-age-checklist.aspx)
- [www.gov.uk/government/collections/
immunisation](http://www.gov.uk/government/collections/immunisation)
- [/www.medicines.org.uk/emc](http://www.medicines.org.uk/emc)
- צו לערנען וועגן וואקסינז פאר דיין בעיבי אין
דער ערשטער יאר פון לעבן, איר קענען לייענען
[www.gov.uk/government/publications/a-
guide-to-immunisations-for-babies-up-
to-13-months-of-age](http://www.gov.uk/government/publications/a-guide-to-immunisations-for-babies-up-to-13-months-of-age)

שוואנגערשאפט וואקצין רעקארד

רעקארדירן דיין שוואנגערשאפט וואקסינז אונטן צו
ענשור אז איר און דיין בעיבי טאן ניט פארפירן שוץ
קעגן פלו, וואקסינז הוסט

וואקצין	ווען צו האבן עס	טאג געגעבן
פלו	בעשאס די פלו צייט אין קיין צייט בעשאס דיין שוואנגערשאפט.	
וואקסינז הוסט	ידעאללי נאך דיין 18 צו 20 וואכן יבערקוקן. קענען זיין געגעבן פון 16 וואכן צו דער צייט איר געבן געבורט.	
RSV	איר זאל האבן דיין RSV וואקצין אמאל איר זענט 28 וואכן שוואנגער.	
MMR דאזע *1	נאך דיין בעיבי איז געבוירן, אין דיין 6-וואך פאסטן-נאטאל טשעק (מיט GP אדער פראקטיסירן ניאניע).	
MMR דאזע *2	פיר וואכן נאך ערשטער דאזע (ווי אויבן).	
*אויב קיין פריערדיקן וואקצין		

ווייל דיין וואַקסינז בשעת שוואַנגער העלפּס צו
באַשיצן אייער שוואַנגערשאַפּט. רעדן צו דיין
אַקושערקע, GP פּראַקטיסיז אָדער געזונט
מאַנשאַפּט און מאַכן זיכער אַז איר האָבן זיי אין
דער בעסטער צייט פֿאַר איר.



Crown copyright ©
24PYPB01YI Yiddish. 1P 250K OCT 2024 2024
UK Health Security Agency gateway number: 2024722
ערשט פארעפנטלעכט יוני 2024

דער בלעטל איז אויך בנימצא איבערגעזעצט אין אַ רײ שפּראַכן און צוטריטלעך
פאַרמאָטירונגען. צו סדר מער קאָפּיעס פון דעם בלאַט באַזוכן: www.healthpublications.gov.uk
אָדער פּאָן: 0300 123 1002 :Minicom, 0300 123 1003
(8:00 צו 18:00, מאנטיק צו פרייטאג)

www.nhs.uk/conditions/vaccinations/nhs-vaccinations-and-when-to-have-them