

داسې يو واکسين شته چې تاسو سره مرسته کوي د

د شېنګلز (Shingles) له امله د رامنځ ته شویو دردونو مخنیوی وکړي



NHS (د انگلستان د عامې روغتيا وزارت) يو داسې واکسين وړاندې کوي چې په شپنګلز ناورغۍ د اخته کېدو ګواښ را کموي. دغه لارښود يا کتابچه تاسو ته د شپنګلز ناروغۍ د ملي پروګرام، د واکسين د ګټو او په شرائطو د برابر وکسانو په اړه معلومات درکوي



د شپنګلز پروګرام فعلي واکسين د Shingrix (شپنګلرېکس) په نامه يادېږي. تاسو بايد د غوره او بشپړ مصونيت ترلاسه کولو لپاره د دغه Shingrix دوه دوزه تطبيق کړئ. کله چې تاسو د دغه واکسين لپاره په شرائطو برابرېږئ، نو ستاسو GP (عمومي ډاکټر) به تاسو سره اړيکه ونيسي. دغه راز تاسو کولی شئ د Shingrix واکسين په ځينو درملتونونو کې هم ترلاسه کړئ.

د شېنگل ناروغي لکه د نورو ناروغيو په څېر له يو شخص څخه بل شخص ته نه شي انتقالېدې. زموږ تاسو ډېری کسانو په ځوانۍ يا ماشومتوب کې د chickenpox (شري/بوزکانو) ناروغي تجربه کړې ده، په داسې حال کې چې ځينې زموږ له هغې بې خبره يو.

په دغې ناروغۍ له اخته کېدو وروسته هم دغه وایروس ستاسو په عصب کې پاتې کېږي. تاسو به ډېری وخت په خپلې دغه ناروغۍ نه پوهېږئ، خو د وخت په تېرېدو سره وایروس يا ناروغي بېرته په تاسو راگرزي او ستاسو جلد ته صرايت کوي چې بلاخره له امله يې د شېنگل په نامه ناروغي رامنځ ته کېږي.

شېنگل ناروغي ډېر يوه دردوونکې ناروغي ده چې د عمر په زياتېدو سره په ډېری خلکو بده اغېزه کوي. دا کېدای شي له دې امله وي چې ستاسو د بدن دفاعي سيستم د عمر په لوړېدو، خفگان يا د ګڼل شمېر ناوره روغتيايي حالاتو او طبي درملنوله امله کمزوری شوی دی. کېدای شي د ځينې اشخاصو لپاره له شېنگل ناروغۍ څخه رامنځ ته شوی درد څو کاله دوام وکړي. شېنگل ناروغي کولی شي واقعا ستاسو په ژوند اغېزه وکړي او له ټولو هغو فعاليتونو مو وغورځوي چې په معمولاً ترې خوند اخلي.

د شېنگل ناروغۍ لامل څه دی؟

شېنگل (چې د هېرېزوسټر په نامه هم يادېږي) د پټ شري/بوزکانو د هغه وایروس په واسطه رامنځ ته کېږي چې د پوست هغې برخې ته صرايت کوي چې د کوم عصب په واسطه پوښل شوې وي. دغه وایروس د دې لامل کېږي چې ستاسو په جلد باندې له مايع ډکې خورا دردناکې پولۍ يا تناکې رامنځ ته شي. دغه پولۍ يا تناکې کېدای شي وچوي او په داسې زخمونو واوړي چې بلاخره وچې شي او اليام ومومي. دغه پولۍ يا تناکې معمولاً د بدن په يوه اړخ کې معمولاً سينه وي رامنځ ته کېږي، خو ځينې وخت سر، مخ او سترګې هم نيسي.

شېنگل څه ډول يو شکل لري؟



دغه ناروغي څومره وخت نيسي او تر کومې کچې کېدی شي جدي و اوسي؟

د شېنگلز ناروغي لومړۍ نښه دا ده چې د بدن په يوه طرف کې په جلد کې د ناخوښۍ يا سوزش احساس پيدا کېږي. له لومړنيو اعراضو او علائمو وروسته معمولا په بدن باندې له مايع يا اوبو ډکې پولۍ يا ټناکې راپيدا کېږي.

په بدن باندې د شېنگلز راڅرگندېدل کېدی شي د شديد درد لامل شي. که چېرې شېنگلز يا بخار په سترگو يا وروځو کې راپيدا شي، ښايي د سترگو د ديد د کموالی حتی دائمي ړندوالي لامل وگرزي.

شېنگلز ناروغي څومره عامه ده؟

په 5 هغو ناورغانو کې شری يا بوزکاني لري 1 هغه يې په شېنگلز اخته کېږي. دا په دې مانا ده چې هرکال په انگلستان او ويلز کې په لسگونو زره کسان په شېنگلز ناروغي اخته کېږي. که څه شېنگلز ناروغي کېدی شي په هر عمر کې يو شخص ته پيدا شي، خو د دغې ناروغي خطر، شدت او پېچلتياوې د عمر د لوړېدو سره سم سختېږي.

له پوليو يا ټناکو وروسته عصبي ستونزې يا د عصبو درد (PHN)

هرکال شاوخوا 14,000 کسان له دغې ناروغي وروسته په عصبي درد يا ستونزو (PHN) اخته کېږي او تر 1,400 د PHN له امله په روغتونونو کې بسترېږي.

په دغې ناروغي ډېری اخته کسان څو اونۍ وروسته بېرته جوړېږي، خو د ځينو لپاره بيا تر مياشتو حتی کلونو پورې درد موجود وي - چې دې ته له ناورغي وروسته عصبي ستونزې (PHN) ويل کېږي. دا يو ځانگړی ناوړه روغتيايي وضعيت دی چې شديد د عصبو درد، سوخت او د زړه ضربان ورسره وي.

هرڅومره مو چې عمر ډېر وي، په هماغه اندازه ښايي ستاسو درد طولاني وي. د شېنگلز واکسين په ياده ناورغي او PHN باندې د اخته کېدو گواښ کموي.

آيا شېنگلز ناروغي ساري ده؟

شېنگلز د شري په شان په آساني سره د انتقال وړ نه ده، خو د ټناکو يا پوليو په مايع کې د شري واپروس موجود دی. نو ځکه هغه کسان چې د شري واکسين يې نه وي کړي کېدی شي دغې مايع سره د تماس په صورت کې په شېنگلز ناروغي اخته شي.

کوم کسان کولی شي دغه واکسين وکړي؟

د 2023 د سپټمبر مياشتې راپدېخوا د دغه واکسين کمپاين د لاندې اشخاصو لپاره د تطبيق په حال کې دی:

1 هغه روغ اشخاص چې عمرونه يې له 70 تر 79 پورې دي او واکسين يې نه وي کړي

2 هغه اشخاص چې عمرونه يې د 50 کالو وي او د بدن شديد کمزوری دفاعي سيستم لري

3 هغه روغ اشخاص به چې عمرونه يې د 60 او 70 ترمنځ وي، د ياد واکسين د تطبيق لپاره هغه مهال په شرائطو برابر شي کله چې يادو عمرونو ته رسي

تاسو به تر 80 کلنۍ پورې د دغه واکسين د تطبيق لپاره په شرائطو برابر ياست (مگر په هغه صورت کې چې د بدن کمزوری دفاعي¹ سيستم ولرئ)، خو هرڅومره ژر چې دغه واکسين وکړئ په هماغه اندازه مصون پاتې شئ. د هغو اشخاصو په اړه بشپړ معلومات چې کولی شي د پروگرام په لومړنيو پينځو کلونو کې دغه واکسين وکړي، لاندې په جدول کې ترتيب شوي دي.

د هغو اشخاصو سرنوشت به څنگه کېږي چې د شپنگلز واکسينو لپاره يې قانوني سن نه وي پوره کړی؟

ځوانانو ته به دغه واکسين هغه مهال وړاندې شي کله چې قانوني سن ته رسي.

شپنگلز ناروغي کېدۍ شي په هر عمر کې پېښه شي، خو خطر، شدت او پېچلتياوې يې په لوړ عمر کې ډېر وي. هغه اشخاص چې د بدن کمزوری دفاعي سيستم لري د دغې ناروغۍ د لوړ گواښ سره مخ دي چې له همدې امله توصیه کېږي دغه واکسين د ژوند په لومړيو مرحلو کې وکړي.

[1] هغه اشخاص چې د بدن خورا کمزوری دفاعي سيستم لري، بيا هم د واکسينو د تطبيق لپاره په شرائطو برابر گڼل کېږي.





کله چې تاسو د شپنګلز ناوړغی واکسین کوئ، نو تاسو ته به یو د ثبت کارت درکړل شي چې په هغې کې به ستاسو نوم او د راتلونکې واکسین نېټه درج وي. نو لطفا دغه کارت ځان سره وساتئ.

آیا دغه واکسین کوم جانبي عوارض لري؟

د Shingrix واکسینو جانبي عوارض معمولا خفیف وي او ډېر دوام نه کوي. د دغه واکسین ترټولو عام جانبي عوارض (چې د هرو 10 کسانو له ډلې په 1 هغه کې ظاهرېږي)، د تزریق په ساحه کې درد او سوروالی، د عضلاتو درد او سرخوږی دی.

تاسو کېدی شي د دغه Shingrix له تطبیق وروسته د ستړیا احساس وکړئ او تبه درته پیدا شي. په دې صورت کې کولی شئ استراحت وکړئ او په کافي اندازه پرستامول وخوړئ (په دې اړه د واکسینو په لارښود کې مندرجه سپارښتنو ته مراجعه وکړئ) ترڅو حالت مو سم شي. که چېرې ښه احساس نه لرئ، نو نقلیه واسطه یا موټر مه چلوئ.

تاسو باید د واکسینو له تطبیق څو ورځې وروسته بېرته ښه شئ خو که چېرې ستاسو اعراض او علائم دوام کوي، نو باید په دې اړه د خپل GP (عمومي ډاکټر) یا نرسې سره مشوره وکړئ.

تاسو کولی شئ د هرډول جانبي عوارضو په اړه د MHRA له card Yellow (زېر کارت) نه په استفادې سره چې په (yellowcard.mhra.gov.uk) کې د لاسرسۍ وړ دی، راپور ثبت کړئ - په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د لارښود شاتنۍ برخه وگورئ.

د Shingrix واکسین تر کومې کچې خوندي دی، آیا دغه واکسین په نورو هېوادونو کې استفاده شوی؟

لکه د نورو واکسینو په شان، د شپنګلز واکسین هم امتحان شوی او په UK یا بریتانیا کې موجود د مؤنیت او تجویز اړونده شرایط یې پوره کړي.

دغه واکسین په څو وروستیو کلونو کې په اروپا او شمالي امریکا کې په پراخه کچه استفاده شوی.

دغه واکسین تر کومې کچې اغېزمن دی؟

د دغه واکسین په تطبیق سره به تاسو وکولی شئ په شېنگلز ناروغۍ باندې د اخته کېدو ګواښ را کم کړئ.

وروسته له هغې چې د شېنگلز واکسین د لومړي ځل لپاره معرفي شو، په ۵ اولو کلونو کې په دې برخه کې محدود شمېر ۴۰,۵۰۰ GP یا عمومي ډاکټران او محدود شمېر ۱,۸۴۰ روغتونونه یا بسترونه موجود وو.^۲



که چېرې د شېنگلز ناروغي دوام کوي، ښائي اعراض او علائم یې خفیف و اوسي او موده یې د هغو اشخاصو په پرتله کمه وي چې دغه واکسین یې نه دي کړي. په بریتانیا کې استفادې کېدونکي د Shingrix یا شېنگرېکس واکسین ثابتې کړي ده چې غوره مصونیت رامنځ ته کوي.

څنګه او کله دغه واکسین تطبیقېږي؟

دغه واکسین هم لکه د نورو هغو په شان د مټ په پاسنۍ برخه کې د تزریق په شکل تطبیقېږي.

Shingrix یو غیر فعال واکسین دی او تاسو به اړتیا ولرئ چې د غوره او اوږدمهاله مصونیت رامنځ ته کولو په موخه د هغې دوه دوزه تطبیق کړئ.

د Shingrix واکسینو دوهم دوز به د ډېری خلکو لپاره له لومړي دوز ۶ میاشتې وروسته تطبیق شي. که چېرې تاسو د بدن خورا کمزوری دفاعي سیستم ولرئ، نو ستاسو د Shingrix واکسینو دوهم دوز باید ژر تطبیق شي، خو له لومړي دوز څخه باید حداقل ۸ اونۍ وروسته وي.

د دوهم دوز واکسینو لپاره د نوبت نیولو په اړه به ستاسو GP یا عمومي ډاکټر معلومات درکړي.

[۲] په انګلستان کې د تبخال یا هېریزوسټر واکسینو د پروګرام له معرفي پېنځه کاله وروسته په بستر شویو او عمومي ناروغانو باندې د هغې اغېزه: یوه داسې څېړنه چې اساس یا بنسټ یې په دې اړه د خلکو نظریات تشکیلوي (nih.gov)

ولې دمگری نه شم کولی دغه واکسین وکړم؟

د روان پروگرام د شرایطو په اساس هر هغه شخص چې عمر یې د 70 او 79 کلونو ترمنځ وي، د دغه واکسین د تطبیق لپاره په شرایطو برابر گڼل کېږي. دغه پروگرام په تدریجي ډول د تطبیق کېدو په حال کې دی، چې لومړی هغه کسان چې تر لور گواښ لاندې دي او د واکسینو د تطبیق د گډې کمېټې (JCVI) لخوا یې توصیه کېږي، واکسین کېږي. په راتلونکې 10 کلونو کې به دغه پروگرام بلاخره د په 60 کلنو اشخاصو هم تطبیق شي.

هغه اشخاص چې عمرونه یې د 50 کالو یا تر دې لوړ دي او د بدن جدي کمزوری دفاعي سیستم لري، له وړاندې د Shingrix واکسین لپاره په شرایطو برابر دي.

آیا زه د واکسینو د تطبیق لپاره کوم کار ترسره کولو ته اړتیا لرم؟

کله چې تاسو د شېنگلز واکسینو لپاره په شرایطو برابرېږئ، ستاسو GP یا عمومي جراح به د نوبت نیولو په موخه تاسو سره اړیکه ونیسي. نو که چېرې په دې اړه اندېښنه لرئ نو باید د مشورې لپاره خپل GP یا عمومي ډاکټر سره خبره وکړئ.

آیا داسې کسان شته چې نه شي کولی د Shingrix واکسین وکړي؟

که چېرې تاسو پخوا د واکسینو د کوم ترکیب یا موادو سره حساسیت کړی وي، نو ښايي تاسو ته یې د تطبیق توصیه و نه شي. ستاسو GP به په دې اړه تاسو ته مشوره درکړي.

آیا واکسین خپله د شېنگلز ناروغی لامل کېږي؟

د Shingrix واکسین د شېنگلز ناروغی لامل نه کېږي. که چېرې تاسو ته بخار پیدا کېږي، کولی شئ د 111 شمېرې له لارې NHS (د انگلستان د عامې روغتیا وزارت) سره په اړیکه کې شئ یا په دې اړه د مشورې لپاره خپل GP ته زنگ ووهئ.

که چېرې خپل دغه واکسین له لاسه ورکړو، څه به کېږي؟ آیا کولی شم وروسته یې وکړم؟

د ډېری خلکو لپاره به د شېنگلز واکسین د خپل عمر تر 80 کلنۍ پورې ورکړل شي. که څه هم که چېرې تاسو د بدن کمزوری دفاعي سیستم لرئ، واکسین کېدی شي په هر څو کلنۍ کې وشي.

د بشپړ مصونیت لپاره تاسو باید واکسین په خپل وخت سره وکړئ. د واکسینو د تطبیق د بل نوبت لپاره، خپل GP ډاکټر سره په اړیکه کې شئ.

که چپرې د Shingrix واکسینو له تطبیق مخکې Zostavax ناروغي ولرم، کولی شم دغه واکسین وکړم؟

که چپرې تاسو د 70 او 79 کلونو ترمنځ د خپلو ورځنیو نورمالو واکسینو د پروگرام مطابق د Zostavax واکسین کړې وي، نو په دې صورت کې د اوس مهال لپاره د Shingrix واکسینو 2 دوزونو ته اړتیا نه لرئ.

که په شرائطو برابر یاست، نو د واکسینو په تطبیق
کې ځنډ مه کوئ او هرڅومره ژر چې ممکنه وي دغه
واکسین وکړئ.



په یاد ولرئ، کله چې تاسو د واکسینو د تطبیق لپاره په شرائطو برابرېږئ، نو باید د واکسینو د تطبیق لپاره هرڅومره ژر چې کولی شئ نوبت ونیسئ، ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې تاسو په سم ډول مصنوعات یاست.

نور معلومات

که چېرې تاسو د واکسینو له تطبیق مخکې یا وروسته په دې اړه نورو معلوماتو ته اړتیا لرئ، نو د خپل GP ډاکټر یا نرس سره مشوره وکړئ. همدارنګه کولی شئ د www.nhs.uk/shingles له لارې د NHS وېب پاڼې ته هم مراجعه وکړئ. د شینګلز واکسینو د Shingrix® په اړه د نورو معلوماتو لپاره، د www.medicines.org.uk/emc/product/12054/pil وګورئ

که چېرې د بدن کمزوری دفاعي سیستم لرئ، نو تاسو ته به له 50 کلنۍ وروسته د شینګلز واکسین د تطبیق وړانديز کېږي

تاسو په 70 کلنۍ د دغه واکسین لپاره په شرائطو برابرېږئ

د پروګرام کال	د پروګرام د پیل نېټه	د زېږون نېټه	له خپلې زوکړې وروسته په شرائطو برابر
1 ی کال	د 2023 کال د سپتمبر 1 نېټه	د 1953 کال د سپتمبر له 1 ی د 1954 کال د اګسټ تر 31 مې پورې	 70م
2 م کال	د 2024 کال د سپتمبر 1 نېټه	د 1954 کال د سپتمبر له 1 ی نېټې - د 1955 کال د اګسټ تر 31 مې پورې	
3 م کال	د 2025 کال د سپتمبر 1 نېټه	د 1955 کال د سپتمبر له 1 ی نېټې - د 1956 کال د اګسټ تر 31 مې پورې	
4 م کال	د 2026 کال د سپتمبر 1 نېټه	د 1956 کال د سپتمبر له 1 ی نېټې - د 1957 کال د اګسټ تر 31 مې پورې	
5 م کال	د 2027 کال د سپتمبر 1 نېټه	د 1957 کال د سپتمبر له 1 ی نېټې - د 1958 کال د اګسټ تر 31 مې پورې	

تاسو د خپل په 65م کليزه باندې په شرائطو برابرېږئ

د پروګرام کال	د پروګرام د پیل نېټه	د زېږون نېټه	(د خپلې کليزې وروسته) له 65م کليزې وروسته په شرائطو برابر
1 ی کال	د 2023 کال د سپتمبر 1 نېټه	د 1958 کال د سپتمبر له 1 ی نېټې - د 1959 کال د اګسټ تر 31 مې پورې	 65م
2 م کال	د 2024 کال د سپتمبر 1 نېټه	د 1959 کال د سپتمبر له 1 ی نېټې - د 1960 کال د اګسټ تر 31 مې پورې	
3 م کال	د 2025 کال د سپتمبر 1 نېټه	د 1960 کال د سپتمبر له 1 ی نېټې - د 1961 کال د اګسټ تر 31 مې پورې	
4 م کال	د 2026 کال د سپتمبر 1 نېټه	د 1961 کال د سپتمبر له 1 ی نېټې - د 1962 کال د اګسټ تر 31 مې پورې	
5 م کال	د 2027 کال د سپتمبر 1 نېټه	د 1962 کال د سپتمبر له 1 ی نېټې - د 1963 کال د اګسټ تر 31 مې پورې	

واکسين

د دغې ناروغۍ مثبتې پېښې د پام وړ را کموي



به د هغو اشخاصو لپاره چې په يادې ناروغۍ اخته خو واکسين يې کړي وي، د اعراضو او علائمو شدت کم کړي




دغه واکسين د US (د امريکا متحده ايالاتو) او کاناډا په شان هېوادونو کې په پراخه کچه استفاده شوی دی



شېنگلز:

يوه عامه ناروغي ده چې کېدای مزمه، او شديد درد ولري



کېدای شي د جدې بخار او پوليو يا ټناکو لامل شي



کېدای شي د ژود په هر عمر کې پيدا شي، خو خطر، شدت او پېچلتاوې يې د عمر په لورېدو سره شديدې کېږي



د خپلې روغتيا د ساتنې لپاره غوره لار د شېنگلېز ورځنيو يا نورمالو واکسينو تطبيق دی، ترڅو وکولی شئ له خپل ژوند څخه د شېنگل له امله له رامنځ ته شويو دردونو پرته خوند واخلي.



تاسو کولی شی د Yellow Card Scheme (د زېر کارت د طرحې) له لارې د واکسینو او درملو د اعراضو او علائمو په اړه راپور ثبت کړئ

دا کار کولی شی په آنلاین ډول په
yellowcard.mhra.gov.uk کې ترسره کړئ یا د
0800 731 6789 شمېرې له لارې Yellow Card سره
په اړیکه کې شی. همدارنگه کولی شی دغه کار له QR
کوډ نه په استفادې سره یا د Yellow Card (زېر کارت)
اپلکشن په ډولودولو سره هم ترسره کړئ.

د شېنگلز ناروغۍ په برخه کې د ملاتړ ټولنه

وېب پاڼه: shinglesupport.org.uk مرستندویه شمېرې: 0845 123 2305 چې له دوشنبه تر
جمعې د سهار له 9am تر شپې تر 9pm بجو د لاسرسۍ وړ ده یا 020 7607 9661 شمېره چې د سهار له 9am
د شپې تر 8pm بجو د لاسرسۍ وړ د پوښتنې: 0300 030 9333



Facial Palsy

وېب پاڼه: facialpalsy.org.uk



د درد په صورت کې مرستندویه شمېره

تلفون: 0300 123 0789، ایمېل: help@painconcern.org.uk
وېب پاڼه: www.painconcern.org.uk



© Crown copyright 2024

Product code: C24SGX1PAS Pashto

(APS) 1p 100K OCT 2024

UK Health Security gateway number: 2024638

Larger font for accessibility

If you would like to order more copies of this leaflet, or another format such as large print, braille or as
a translated copy please visit www.healthpublications.gov.uk or phone: 0300 123 1002, Minicom: 0300 123 1003
(8am to 6pm, Monday to Friday)

www.nhs.uk/vaccinations