



آپ کو mpox سے بچانا

میں میں کے بارے Mpox ویکسین کے معلومات

MVA ویکسین میں mpox یا smallpox کا وائرس نہیں ہوتا اور یہ mpox یا smallpox کو پھیلا یا اس کی وجہ نہیں بن سکتی۔

Smallpox اور mpox سے بچانے کیلئے یوکے کی طرف سے Imvanex ویکسین کی اجازت دی گئی ہے، Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) کی طرف سے UK Health Security Agency (UKHSA) اور Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) نے mpox کے کیسز کے خلاف ردعمل کے حصے طور پر MVA ویکسین کے استعمال کی سفارش کی ہے۔

میں میں کے مدد کے لیے ویکسینیشن کیا ہے؟

آپ کو mpox سے بچانے میں مدد کے لیے ویکسینیشن پیش کی جا رہی ہے۔ MVA ویکسین (mpox and smallpox) کی اینفیکشن کی شدت کو روکنے یا کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔

اس ویکسین کو یورپ میں Bavarian Nordic نے تیار کیا ہے۔ جب آپ کو ویکسین دی جاتی ہے، تو آپ کا مدافعتی نظام (جسم کا قدرتی دفاعی نظام) mpox وائرس کے خلاف اینٹی بادیز پیدا کرتا ہے۔



Mpox (پہلے منکی پاکسٹن کے نام سے جانی تھی)، ایک سنگین متعددی بیماری ہے جو کہ جلدی نکلیف دہ زخموں کی صورت میں پائی جا سکتی ہے، یہ جسم کے کسی بھی حصے پر ظاہر ہو سکتے ہیں:

MVA کیسے دی جاتی ہے؟

MVA اینجیکشن، ترجیحاً اوپر والا بازو میں، لگانے کے لیے دو طریقے استعمال کے جاتے ہیں۔ ایک طریقے میں انجیکشن جلدے نیچے یا پھر میں میں لگتا ہے (زیادہ تر دوسری ویکسینوں کی طرح)، دوسرے میں TB کے خلاف BCG ویکسین کی طرح جلد میں انجیکشن لگتا ہے۔ دونوں طریقے انتہائی مؤثر ہیں۔

ڈرائیونگ کرنا اور مشینیں استعمال کرنا: اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ویکسین آپ کی ڈرائیونگ کرنے یا مشینیں استعمال کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرے گی۔ ویکسینیشن کے بعد یہوں ہونا بہت عام ہے، لہذا ڈرائیونگ کرنے سے پہلے آپ کو انجیکشن کے بعد پندرہ منٹ انتظار کرنا چاہیے۔

Mpox ویکسینیشن ریکارڈ

ذیل میں اپنی mpox ویکسینیشن کی تاریخ (تاریخیں) کا ریکارڈ رکھیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ تحفظ سے محروم نہ ہوں۔ یاد رکھیں، محفوظ رہنے کے لیے آپ کو ویکسین کا فل کورس مکمل کرنے کی ضرورت ہے:

تاریخ	Mpox (MVA-BN) ویکسین کی خوراک
	خوراک 1
	خوراک 2 پہلی خوراک کے کم از کم اٹھائیں دن بعد

اب میں کیا کروں؟

برائے مہربانی مزید تفصیلات کے لیے اپنے کلینک کی نرس یا ڈاکٹر سے پوچھیں۔ ویکسین (SHSs) Specialist Sexual Health services میں دستیاب ہے۔

Mpox کے بارے میں مزید معلومات اور ویکسینیشن سائٹ کہاں مل سکتی ہے کے لیے وزٹ کریں:

www.nhs.uk/conditions/mpox/find-a-mpox-vaccination-site

کیا کوئی ایسا ہے جو ویکسین نہیں لے سکتا؟

صرف وہ لوگ ویکسین نہیں لے سکتے ہیں جن کو ویکسین کی پچھلی خوراک، یا اس سے پہلے ویکسین کے کسی جزو سے اچانک جان لیوا الرجک رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ ویکسین میں چکن پروٹین، ciprofloxacin (antibiotics) اور gentamicin (antibiotics) benzonase کی نریس مقدار ہوتی ہے۔

ویکسینیشن میں تاخیر کسکے لیے بہتر ہو سکتی ہے؟

اگر آپ زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ یمار ہیں تو آپ کو یہ طریقے کرنے کے لیے جانچنے کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ آیا آپ mpox کی ابتدائی علامات ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی یماری کا تعلق mpox کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی آپ کو ویکسین دی جا سکتی ہے۔ معمولی انفیکشن، جیسے نزلہ، کی موجودگی میں ویکسینیشن ملتوی کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی چاہیے، لیکن پہلے اپنے ڈاکٹر یا نرس سے بات کر لیں۔

اور کس کو خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟

آپ کو ڈاکٹر یا نرس کو بتانا چاہیے اگر آپ نے ماضی میں ویکسین لی ہے یا اگر آپ کو atopic dermatitis ہے، ایسی صورت میں MVA ویکسین کے مضر اثرات کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔

اگر آپ HIV پاپیلیو ہیں یا آپ دیگر کسی ایسی حالت یا علاج میں ہیں جس سے مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے، تو ویکسین بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اپنے ڈاکٹر یا نرس کو بتائیں۔

میں جو دوسری دوائیں لے رہا ہوں ان کا کیا کریں؟

اپنے ڈاکٹر یا نرس کو بتائیں اگر آپ کوئی دوسری دوائیں لے رہے ہیں یا حال ہی میں لے چکے ہیں یا اگر آپ نے حال ہی میں کوئی دوسری ویکسین لی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں، ویکسین لگوانے کے لیے آپ کو ٹھیک ہونا چاہیے۔

ویکسین ان لوگوں کو محفوظ طریقے سے دی جا سکتی ہے جو HIV انفیکشن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جو PreP لے رہے ہیں اور ساتھ ہی دیگر اہم ویکسینوں بشمول HPV اور بیپاٹانٹس اٹے اور بیپاٹانٹس بی وائرس کے خلاف۔

ویکسین مکمل طور پر اینفیکشن کو نہیں روک سکتی لیکن اگر آپ Mpox کا شکار ہو گئے ہیں، تو علامات اتنی خراب نہیں ہوئی چاہیں۔

پہلی خوراک آپ کے مدافعائی نظام کو تیار کرتی ہے تاکہ جب آپ کو Mpox ہو جائے تو یہ بہت زیادہ تیزی سے رد عمل دکھا سکے۔ ویکسین کو اثر کرنے میں وقت بھی لگتا ہے۔ یہ چند روز بعد اثر کرنا شروع کر سکتی ہے اور تقریباً چار ہفتے تک اسے اعلیٰ ترین تحفظ تک پہنچنا چاہیے۔

دوسری خوراک اٹھائیں روز بعد دی جا سکتی ہے لیکن زیادہ بعد بلکہ چند مہینوں بعد بھی دی جا سکتی ہے۔ پہلی اور دوسری خوراک کے درمیان زیادہ وقفہ آپ کے طویل المدى تحفظ میں بہتری آئی چاہیے۔

آپ کو دو خوراکوں کے بعد بھی Mpox کے خطرات اور علامات سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اگر آپ میں علامات پیدا ہو جائیں، تو گھر پر رہیں اور 111 یا جنسی ہیلتھ کلینک پر کال کریں۔

کیا ویکسین مضر اثرات کا سبب بنتی ہے؟

ویکسین کا سیفی پروفائل بہت اچھا ہے۔ تمام دواؤں اور ویکسینوں کی طرح یہ مضر اثرات کا سبب بن سکتی ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر بلکہ اور قلیل المدى ہوتے ہیں اور ہر کسی کو نہیں ہوتے۔ Smallpox کی پرانی ویکسین کے برعکس، یہ ویکسینیشن داعنیوں چھوڑتی۔

مضر اثرات ان لوگوں میں زیادہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے پہلے لائیو smallpox ویکسین کی خوراک لی ہو۔ ان لوگوں کو اپنے موجودہ تحفظ کو بڑھانے کے لیے MVA کی صرف ایک خوراک درکار ہوتی ہے۔ عمومی مضر اثرات میں انجیکشن کی جگہ پر درد اور خارش اور سر درد، پیہوں میں درد، بیماری کی حالت اور تھکاؤٹ شامل ہیں۔ تقریباً دس میں سے ایک لوگوں کو سردی اور بخار ہو گا، لیکن یہ چند روز سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے۔

اگر آپ اوپر درج کیے گئے مضر اثرات میں سے کسی کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ کو آرام کرنا چاہیے اور علامات کو رفع کرنے میں مدد کے لیے آپ پیراسیٹامول کی صحیح خوراک لے سکتے ہیں۔

اگر آپ کو پہلے ہی atopic dermatitis (ایکزیما کی ایک شکل) ہے، تو آپ زیادہ شدید لوکل جلدی رد عمل (جیسا کہ لالی، سوجن اور خارش) اور دیگر عام علامات (جیسا کہ سر درد، پیہوں میں درد، بیماری یا تھکاؤٹ محسوس کرنا)، اس کے ساتھ آپ کی جلد کی حالت کا بہر کا اٹھنا یا خراب ہونا، کا شکار ہو سکتے ہیں۔

Mpox کیا ہے؟

ایک نایاب اینفیکشن ہے جو زیادہ تر وسط اور مشرق افریقہ میں پائی جاتی ہے۔

اینفیکشن ایسے لگ سکتی ہے:

• کے Mpox چھالوں یا خارش سے کوئی قریبی جسمانی رابطہ (بشمول جنسی رابطہ، بوسہ لینے، گلے لگانے یا ہاتھ پکڑنے کے دوران)؛

• والے کسی شخص کے استعمال شدہ کپڑوں، بستروں یا تولیوں کو چھوٹا:

• جسمانی رطوبتوں جیسا کہ تھوک، ناک کی ریزش یا بلغم کے ساتھ رابطہ۔

عموماً بلکہ ہوتی ہے اور بغیر علاج کے چند ہفتے میں بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے علامات زیادہ شدید ہیں اور آپ بیمار ہو جائے ہیں، تو آپ کو ہسپتال میں علاج کی ضرورت پوچھیں۔

MVA کس کے لیے تجویز کی جاتی ہے؟

UKHSA حال پر میں تجویز کرتی ہے کہ MVA ان کو دی جاتی ہے:

• ہیلتھ کیئر ورکر ز جو تصدیق شدہ Mpox والے مريض کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یا دیکھ بھال شروع کرنے والے ہیں

• پر جنس پرست، بائی سیکسسوٹل اور دوسرے مرد جو مردوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں۔ آپ کا معالج آپ کے لیے ویکسینیشن تجویز کرے گا اگر آپ کے متعدد پارٹنر ہیں، آپ گروپ سیکس میں حصہ لیتے ہیں یا 'سیکس آن پریمسس' کے مقامات میں شریک ہوتے ہیں

• وہ لوگ جن کا تصدیق شدہ Mpox والے مريض کے ساتھ رابطہ پوچکا ہو۔ ویکسینیشن ویکسین کی ایک خوراک کے ساتھ جلد از جلد دی جانی چاہیے (مثالی طور پر چار دن کے اندر لیکن بعض دفعہ چودہ دن میں)

• وہ لوگ جو کسی گروپ کے ممبر ہیں یا ایسی سینٹنگ میں شرکت کرتے ہیں جہاں کوئی کیس یا کلسٹر ہو، یا جہاں کچھ ممبران کسی کیس کے ساتھ قریبی رابطہ میں ہوں۔

کیا ویکسین کام کرتی ہے؟

کے خلاف اعلیٰ سطحی تحفظ فراہم کرنے کے لیے ویکسین کی دو خوراکیں دکھائی گئی ہیں۔ پہلی خوراک کے بعد بھی تحفظ بہت اچھا ہے، لیکن طویل المدى تحفظ کے لیے بعض دفعہ دوسری خوراک تجویز کی جاتی ہے۔

سنگین مضر اثرات

ویکسین لینے والے لوگوں میں کچھ دیگر صورتیں بہت شاذ و نادر ہی رپورٹ ہوئی ہیں۔ کھلے پنک جذبے کے ساتھ، ویکسین پروڈکٹ انسرٹ میں ان تمام صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بھی جو ایک ہس کیس سے رپورٹ ہوئی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویکسین ذمہ دار تھی۔ اگر آپ کو کوئی مضر اثرات ہوتے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر، فارماسٹ یا نرس سے بات کریں۔ اس میں کوئی بھی ممکنہ مضر اثرات شامل ہیں جو اس کتابچے میں درج نہیں۔

مضر اثرات رپورٹ کرنے سے آپ اس ویکسین کی سیفٹی کے بارے میں مزید معلومات مہیا کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔



اس دوائے بارے میں آپ اس پیکچ
انسرٹ سے مزید معلومات حاصل کریں
گ جو ڈاکٹر یا نرس آپ کو دین۔

یہ انسرٹ یورپین میڈیسنزر ایجننسی کی ویب سائٹ
پر بھی دستیاب ہے:

www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/Imvanex

برائے مہربانی ویب سائٹ پر ییلو کارڈ
سکیم کے ذریعے کسی بھی مشتبہ مضر
اثرات کی براہ راست اطلاع دیں:

yellowcard.mhra.gov.uk,

ییلو کارڈ اسکیم پر کال کرنا

08007316789 (صبح 9 سے شام

5 بجے تک)



مجھے اسکین کریں

