




Nu uitați cardul de înregistrare MenB

Veți avea nevoie de o a doua doză la cel puțin 4 săptămâni după prima doză pentru a beneficia de cea mai bună protecție împotriva gonoreei.



Nu uitați să faceți a doua doză de vaccin MenB pentru a vă proteja împotriva gonoreei



Card de înregistrare **pentru vaccinarea împotriva meningococului B (Bexsero)**



**Pentru mai multe informații
despre gonoree și boala
meningococică (meningită și
septicemie), vă rugăm să vizitați**



Simptomele gonoreei
conform NHS.UK



Simptomele gonoreei
conform THT.ORG.UK



Informații despre meningită
conform NHS.UK



**Meningitis Research Foundation
(Fundația pentru cercetarea meningitei)**
Linia de asistență gratuită 0808 800 3344



Meningitis Now
Linie de asistență telefonică 24 ore din 24
0808 801 0388

Dacă aveți întrebări, adresați-vă
consilierului dvs. medical.

**Confidențial. Fără a fi judecat(ă).
Fără să vă fie rușine. Fără stigmatizare.**



© Crown copyright 2025
1P 100K JUN 2025 (APS). Product code: MBG01RO Romanian
UK Health Security Agency Gateway number: 2025099
If you want to order more copies of this leaflet visit
www.healthpublications.gov.uk or call 0300 123 1002



UK Health
Security
Agency

NHS

Ghid privind vaccinul împotriva
meningococului B
**pentru protecție împotriva
gonoreei**



immunisation

Contribuim la protejarea tuturor, la orice vârstă



pentru bărbații homosexuali, bisexuali și alți bărbați care au relații sexuale cu bărbați

Începând din luna august 2025, bărbaților homosexuali, bisexuali și alți bărbați care au relații sexuale cu bărbați (GBMSM) considerați a fi expuși unui risc mai mare de infecție cu gonoree li se oferă vaccinul împotriva meningococului de grup B, numit „Bexsero”, pentru a-i proteja împotriva infecțiilor cu gonoree.

Vaccinul va contribui, de asemenea, la prevenirea cazurilor de meningită și septicemie cauzate de bacteria meningococică B.



Reducerea riscului de infecție

Gonoreea cauzată de bacteria *Neisseria gonorrhoeae* este una dintre cele mai frecvente infecții cu transmitere sexuală (STI) din Regatul Unit. Bărbații homosexuali/ bisexuali (GBMSM) care au relații sexuale cu mai mulți parteneri sunt expuși unui risc crescut de a contracta această infecție. Infecțiile cu gonoree pot crește, de asemenea, riscul de a contracta alte infecții. Infecția cu gonoree netratată poate provoca probleme grave, inclusiv infecții la testicule și la ochi.

Ce este Bexsero?

Bexsero este un vaccin care ajută la protejarea împotriva bacteriei *Neisseria meningitidis* grupul B (MenB), care poate provoca meningită (o infecție a membranei care învelește creierul și măduva spinării) și septicemie (otrăvire a sângelui). Vaccinul este utilizat în programul de imunizare de rutină pentru sugari din Marea Britanie din 2015 și a dus la o reducere cu 75% a bolilor MenB în grupurile vaccinate. Cercetări recente au arătat că vaccinul Bexsero poate oferi, de asemenea, o anumită protecție împotriva gonoreei.

Cum ajută Bexsero la protecția împotriva gonoreei?

Meningococul *Neisseria meningitidis* și gonococul (*Neisseria gonorrhoeae*) sunt strâns înrudite. Deși Bexsero este conceput în principal pentru a proteja împotriva infecțiilor meningococice (meningită și septicemie), studiile au arătat că vaccinul poate oferi și o anumită protecție împotriva gonoreei. Aceasta înseamnă că persoanele care primesc vaccinul Bexsero pot avea un risc redus de a contracta gonoreea în comparație cu cele care nu sunt vaccinate.

Pentru protecție, sunt necesare 2 doze de vaccin. A doua doză trebuie administrată la cel puțin 4 săptămâni după prima doză, dar poate fi administrată mai târziu, la următoarea vizită la clinică. Vaccinul se administrează prin injecție, de obicei în partea superioară a brațului.

Este normal să apară umflături, roșeață sau sensibilitate la locul injectării. De asemenea, puteți avea febră ușoară, greață, dureri de cap sau dureri musculare, dar aceste simptome ar trebui să dispară după una sau două zile.

Efectele secundare mai grave sunt rare. Puteți lua medicamente analgezice fără prescripție medicală, cum ar fi paracetamolul sau ibuprofenul, pentru a trata aceste simptome, dacă este necesar.

Cât de repede voi fi protejat?

Este nevoie de cel puțin 2 săptămâni de la administrarea celei de-a doua doze de vaccin pentru ca organismul dumneavoastră să producă anticorpi care să vă ofere un nivel adecvat de protecție. Vaccinul oferă o protecție de aproximativ 30-40% împotriva gonoreei, deci trebuie să continuați să utilizați prezervative pentru a vă proteja împotriva gonoreei și a altor infecții cu transmitere sexuală, cum ar fi sifilisul.

Mă va împiedica să contractez gonoreea?

Nu vă va împiedica complet să contractați infecția cu gonoree, dar va contribui la reducerea riscului de infecție și de transmitere către alți parteneri.

Mă va împiedica să contractez meningită și septicemie?

Meningita și septicemia sunt boli rare, dar grave, care pot provoca decesul sau pot lăsa persoane cu dizabilități și probleme de sănătate care le schimbă viața. Vaccinul protejează împotriva meningitei și septicemiei cauzate de bacteria MenB, dar și alte bacterii pot provoca meningită și septicemie, așa că trebuie să fiți în continuare atenți la semne și simptome.

<https://www.nhs.uk/conditions/meningitis/>

Semne și simptome

► Simptome ale gonoreei

- Multe infecții pot fi asimptomatice
- Pot include secreții galbene dense din penis
- Durere la urinare

Dacă sunteți îngrijorat(ă) cu privire la o infecție cu gonoree, contactați clinica locală de sănătate sexuală pentru sfaturi și teste.



Găsiți clinica locală de sănătate sexuală

www.nhs.uk/service-search/sexual-health/find-a-sexual-health-clinic/