



UK Health
Security
Agency

NHS

可能怀孕、正怀孕或正母乳喂养的妇女指南



冠状病毒疫苗已经过大量测试，确保其安全性。



如果您怀孕了，则应该接种两剂冠状病毒疫苗以保护您和您的宝宝。疫苗不会使您或您未出生的宝宝感染冠状病毒。



冠状病毒疫苗分为两剂剂量。如果您在怀孕前已注射过第一剂，只要第一剂没有任何严重副作用，您就可以继续注射第二剂。



辉瑞和莫德纳冠状病毒疫苗是怀孕妇女的首选。如果您第一剂已经接种了阿斯利康，则可以在第二剂接种该款疫苗，但请先与您的医生或护士讨论血栓的风险。



母乳喂养对您和您的宝宝都非常有好处。



疫苗和免疫联合委员会 (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, 简称 JCVI) 专家说, 母乳喂养的时候可以接种疫苗。

世界卫生组织 (World Health Organisation, 简称 WHO) 也同意母乳喂养的妇女可以接种疫苗。



如果您已经生下宝宝, 则应该尽快接种疫苗。



接种疫苗后怀孕是安全的。



接种疫苗, 有助保护最脆弱的人群。

© 皇家版权 2021年。产品编码: COV2021374V4ERCH Chinese 1p 5K AUG 2021 (APS).英国健康安全局 (UKHSA) 2021056.

这些小册子的其他版本有: 盲文版、英国手语版 (BSL)、许多其他语言的翻译版。请访问卫生出版物网站下载或订购: www.healthpublications.gov.uk