



UK Health
Security
Agency

NHS

Ghid pentru femeile care ar putea rămâne însărcinate, care sunt însărcinate sau își alăptează copilul




Vaccinul împotriva coronavirusului a fost testat de multe ori pentru a ne asigura că este sigur.



Dacă sunteți însărcinată, aveți nevoie de două doze de vaccin împotriva coronavirus pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe copilul dumneavoastră. Vaccinul nu vă poate transmite dumneavoastră sau copilului dumneavoastră infecția cu coronavirus.



Vaccinul împotriva Coronavirusului se administrează sub forma a două injecții. Dacă ați avut prima doză de vaccin înainte de a rămâne însărcinată vă puteți face și a doua doză în cazul în care nu ați avut efecte adverse în urma primei doze.



Vaccinurile Pfizer și Moderna sunt de preferat pentru femeile însărcinate. Dacă ați avut prima doză de vaccinare cu AstraZeneca, puteți avea a și a doua doză, dar discutați mai întâi cu doctorul sau asistenta dumneavoastră despre riscurile de formare a cheagurilor de sânge.



Alăptatul este benefic pentru dumneavoastră și pentru copilul dumneavoastră.



Experții din Comisia Mixtă de Vaccinare și Imunizare (JCVI) spun că vă puteți vaccina în timp ce alăptați.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) este de asemenea de acord că femeile care alăptează pot să se vaccineze.



Dacă ați născut deja ar trebui să vă administrați vaccinurile cât mai curând posibil.



Puteți rămâne însărcinată în siguranță după ce vi s-a administrat vaccinul.



Vaccinarea ajută la protejarea celor mai vulnerabili.

©Drepturile de autor ale Coroanei Regale 2021. Codul produsului: COV2021374V4ERRO Romanian 1p 5K AUG 2021 (APS). UK Health Security Agency 2021536.

Alte versiuni ale acestor broșuri sunt disponibile în Braille, BSL, traduse în multe limbi. Vă rugăm să vizitați Publicațiile de Sănătate pentru a le comanda sau descărca: www.healthpublications.gov.uk