



UK Health
Security
Agency

NHS

Juhend naistele, kes võivad rasestuda, on rasedad või imetavad rinnalast




Koroonaviiruse vastast
vaktsiini on selle ohutuse
kindlakstegemiseks palju
testitud.



Kui olete rase, tuleks teil
iseenese ja imiku kaitseks kaks
koroonaviiruse vastase vaktsiini
annust saada. Vaktsiinid ei
nakata teid ega teie sündimata
last koroonaviirusega.



Koroonaviiruse vastast vaktsiini
manustatakse kahe süstega.
Kui saite esimese süste enne
rasestumist, võite minna ja teise
süste saada, tingimusel, et teil ei
esinenud esimese süste järgselt
raskeid kõrvalmõjusid.



Rasedate naiste jaoks
eelistatakse Pfizeri ja Moderna
koroonaviiruse vastaseid
vaktsiine. Kui saite esimese
Astrazeneca süste, võite te
seda ka teise süstega saada, ent
konsulteerige arsti või medõega
trombiriski küsimuses.



Imetamine on teie ja teie imiku jaoks väga hea.



Vaktsineerimise ja Immuniseerimise Ühiskomitee (JCVI) ekspertide sõnul võite te vaktsiini saada, kui teie laps on rinnatoidul.

Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon (WHO) on samuti nõus sellega, et imetavad naisterahvad võivad vaktsiini saada.



Kui olete lapse sünnitanud, peaksite võimalikult kiiresti vaktsiini saama.



Vaktsiini saamise järgselt on rasestumine ohutu.



Vaktsineerimine, mis aitab kaitsta kõige kaitsetumaid.

Tootekood: COV2021374V4EREST Estonian 1p 5K AUG 2021 (APS). UK Tervishoiu Turvalisuse Amet 2021526.

Nende infolehtede muud versioonid on saadaval pimekirjas, briti viipekeeles ja on tõlgitud paljudesse keeltesse. Nende tellimiseks ja alla laadimiseks minge palun Tervishoiuväljaannetesse: www.healthpublications.gov.uk