



UK Health
Security
Agency

NHS

Vadovas moterims, kurios gali pastoti, yra nėščios arba kūdikį maitina krūtimi




Buvo atlikta daugybė tyrimų su koronaviruso vakcina, siekiant įsitikinti jos saugumu.



Jei esate nėščia, turėtumėte pasiskiepyti nuo koronaviruso dviem vakcinų dozėmis, kad apsaugotumėte save ir kūdikį. Vakcina neperduos jums ar jūsų negimusiam kūdikiui koronaviruso infekcijos.



Koronaviruso vakcina skiriama dviem injekcijomis. Jei pirmąją dozę gavote prieš pastojant, galite pasiskiepyti ir antrąja doze, jei po pirmojo skiepo nepatyrėte sunkių šalutinių poveikių.



Nėščioms moterims duodama „Pfizer“ ir „Moderna“ koronaviruso vakcina. Jei pirmoji dozė buvo „Astrazeneca“, ją galite gauti ir antrą kartą, tačiau pirmiausia pasikalbėkite su gydytoju arba slaugytoju apie kraujo krešulių riziką.



Maitinimas krūtimi yra labai naudingas jums ir jūsų kūdikiui.



Jungtinis vakcinacijos ir imunizacijos komiteto (angl. JCVI) specialistai sako, kad vakciną galite gauti maitindama krūtimi.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) taip pat patvirtina, kad krūtimi maitinančios moterys gali skiepytis.



Jeį susilaukėte kūdikio, turėtumėte kuo greičiau pasiskiepyti.



Pasiskiepijus jums bus saugu pastoti.



Vakcina padeda apsaugoti labiausiai pažeidžiamas žmones.

© Karūnos autorystės teisė 2021 m. Produkto kodas: COV2021374V4ERLI Lithuanian 1p 5K AUG 2021 (APS). JK Sveikatos apsaugos agentūra 2021532.

Šis lankstinukas pateikiamas įvairiu formatu: Brailio raštu, britų gestų kalba (angl. BSL) ir yra išverstas į kitas kalbas. Norėdami užsisakyti arba atsisiųsti lankstinuką, apsilankykite: www.healthpublications.gov.uk