



UK Health
Security
Agency

NHS



آپ کے بچے کو

COVID-19 ویکسینیشن ہونز کے بعد

لگ کیا توقع رکھی جائے



5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے
والدین کے لیے ایک ہدایت نامہ

nhs/CovidVaccine پر مزید معلومات ملاحظہ کریں



NHS کی جانب سے تمام اپل بچوں
کو COVID-19 ویکسین پیش کی
جا رہی ہے۔

یہ کتابچہ بتاتا ہے کہ آپ کے بچے کو
ویکسینیشن لگنے کے بعد اب کن امور
کی توقع کی جائے۔

منفی اثرات

دیگر تمام ادویاء کی طرح، ویکسینز بھی منفی اثرات مرتب کرسکتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر اثرات معمولی اور عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں اور تمام بچوں میں نمودار بھی نہیں ہوتے۔ انتہائی عمومی نوعیت کے منفی اثرات ایک یا دو دن میں ختم ہو جانے چاہئیں۔ Pfizer ویکسین کی دوسری خوراک کے بعد اس ویکسین کے منفی اثرات نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔

پہلے یا دوسرے دن سامنے آنے والے انتہائی عمومی منفی اثرات میں شامل ہیں:

- انجکشن لگائے گئے بازو میں تکلیف، بھاری پن کا احساس اور درد کی حساسیت
- تہکن محسوس کرنا
- سر درد، جسم میں درد اور کپکپاہٹ

ان میں ایک یا دو دن کے لیے فلو جیسی علامات بھی نمودار ہو سکتی ہیں جن میں وقفہ وقفہ سے کپکپاہٹ اور لرزہ طاری ہو سکتا ہے۔ تاہم، تیز بخار اس بات کا بھی اظہار ہو سکتا ہے کہ انھیں COVID-19 یا کوئی اور انفیکشن ہے۔

انھیں آرام کرنا چاہیے۔ طبیعت میں آرام کے لیے آپ انھیں پیراسیٹامول دے سکتے ہیں۔ براہ کرم یہ یقینی بنا لیجیے گا کہ پیراسیٹامول کی مقدار اور قسم ان کی عمر کے حساب سے ہو۔

آپ پیراسیٹامول سے متعلق مزید معلومات یہاں www.nhs.uk/ medicines/paracetamol-for-children ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

ایک غیر عمومی منفی اثر یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ ویکسین لگائے گئے بازو کی طرف کے بغل یا گردن کے غددوں سوج جائیں۔ یہ اثرات 10 دن تک برقرار رہ سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے زائد عرصہ تک جاری رہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

اگر آپ ان علامات کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہوں تو کیا کرنا چاہیے

یہ علامات عموماً ایک ہفتے سے کم دورانی کے لیے برقرار رہتی ہیں۔ اگر ان کی علامات مزید بگڑتی ہوئی نظر آئیں یا آپ فکرمندی کا شکار ہوں، تو آپ NHS کو کال کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر یا نرس سے مشورہ طلب کریں، تو انھیں اپنے بچوں کی ویکسینیشن کے بارے میں مطلع کرنا نہ بھولیں (انھیں ویکسینیشن کا رد دکھائیں) تاکہ وہ آپ کے بچے کا درست طور پر تجزیہ کرسکیں۔

آپ ویکسینز اور ادویاء کے منفی اثرات کے شبہات کی اطلاع Yellow Card اسکیم کے ذریعے آن لائن یا آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی دے سکتے ہیں۔



coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

کیا زیادہ سنگین نوعیت کے منفی اثرات بھی رونما ہوتے ہیں؟

حال ہی میں، COVID-19 ویکسینز کے بعد دل کی سوزش (جسے مایوکارڈیٹس یا پیری کارڈیٹس کہتے ہیں) کے انتہائی شاذ و نادر کیسز سامنے آئے ہیں۔

یہ کیسز زیادہ تر نو عمر افراد میں ویکسینیشن کے بعد چند دنوں کے اندر اندر دیکھے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر افراد آرام اور سادہ علاج کے بعد تیزی سے صحتیاب ہو گئے اور بہتر محسوس کرنے لگا۔

اگر آپ کے بچے میں درج ذیل علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر طبی مشورے کے لیے رجوع کریں:

- سینے میں درد
- سانس لینے میں دشواری
- دل کی دھڑکن کا تیز رفتار ہونا، دل لرزنے یا زور زور سے دھڑکنے کا احساس ہونا

کیا آپ کا بچہ ویکسین سے COVID-19 میں مبتلا ہو سکتا ہے؟

آپ کا بچہ ویکسین سے COVID-19 میں مبتلا نہیں ہو سکتا لیکن یہ ممکن ہے کہ اسے پہلے سے ہی COVID-19 ہو چکا ہو اور ویکسینیشن کے دن تک یہ علامات سامنے نہ آئی ہوں۔

COVID-19 کی اہم ترین علامات میں درج ذیل میں سے کسی عارضے کا حال ہی میں نمودار ہونا شامل ہے:

- مسلسل رینے والی نئی کھانسی
- تیز بخار
- معمول کی ذاتی کی حس یا سونگھنے کی حس (اینوزمیا)
- کا ختم یا تبدیل ہوجانا

اگرچہ ویکسینیشن کے ایک یا دو دن کے اندر بخار ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے بچے میں COVID-19 کی کوئی اور علامت ظاہر ہو یا بخار زیادہ دنوں تک برقرار رہے تو گھر پر رہیں اور ٹیسٹ کروائیں کا انتظام کریں۔

اسکے بعد کیا کرنا ہوگا



اپنے بچے کی ویکسینیشن کے بعد، آپ کو ایک ریکارڈ کارڈ دیا جائے گا۔ اگر آپ کے بچے کو دوسری خوراک کی ضرورت ہوئی، تو اگلا اپائٹمنٹ تقریباً 8 سے 12 ہفتوں کے بعد ہوگا۔ دوسری خوراک انہیں زیادہ طویل عرصے کے لیے تحفظ فراہم کرے گی۔

اپنے بچے کے ریکارڈ کارڈ کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کے بچے کو دوسری خوراک کی ضرورت ہو، تو اپنے اگلے اپائٹمنٹ کے لیے ضرور حاضر ہوں۔

اگر آپ کا بچہ طبیعت ناساز ہونے کے باعث اپائٹمنٹ کے لیے نہ جاسکے

اگر آپ کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ طبیعت مکمل طور پر بحال ہونے تک ویکسینیشن نہ کروائی جائے۔

اگر آپ کا بچہ سیلف آئسولیشن میں ہو یا COVID-19 ٹیسٹ کا انتظار کر رہا ہو تو اسے ویکسین اپائٹمنٹ کے لیے نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ کے بچے کا COVID-19 ٹیسٹ مثبت آجائے تو سب سے مناسب یہ ہے کہ مثبت نتیجہ آنے کے بعد 12 ہفتوں تک انتظار کیا جائے اور اگر بچہ COVID-19 کے زیادہ خطرے سے دوچار ہو تو کم از کم 4 ہفتے انتظار کیا جائے۔

کیا ویکسین آپ کے بچے کو تحفظ دے گی؟

آپ کے بچے کو لگائی جانے والی COVID-19 ویکسین سے یہ ثبوت ملے ہیں کہ یہ COVID-19 کے مرض میں ان کے مبتلا ہونے کے امکانات کو کم کر دیتی ہے۔

دنیا بھر میں اس ویکسین کی لاکھوں خوراکیں دی جا چکیں ہیں۔ یہ ویکسین بچوں اور نو عمر افراد میں انتہائی مؤثر ہے۔

آپ کے بچے کا جسم اس ویکسین سے حفاظتی اثر تخلیق کرنے میں چند ہفتے لے سکتا ہے۔ دیگر تمام ادویاء کی طرح، کوئی بھی ویکسین مکمل طور پر مؤثر نہیں ہوئے، لہذا اپنے بچے کو مرض کے انفیکشن سے بچانے کے لیے آپ کو تجویز کردہ ہدایات پر عمل جاری رکھنا چاہیے۔

بعض بچوں کو ویکسینیشن کروائے کے بعد بھی COVID-19 ہو سکتا ہے، لیکن تب یہ اتنا شدید نہیں ہوتا۔

ویکسین لینے کے بعد آپ کا بچہ کیا کرسکتا ہے

ویکسین آپ کے بچے میں COVID-19 کا انفیکشن داخل نہیں کرسکتی اور یہ ان کے بیمار ہونے کے امکان کو کم کر دے گی۔

اس کے باوجود حالیہ قومی ہدایات پر عمل جاری رکھنا ضروری ہے۔ آپ کا بچہ ویکسین لگوانے کے بعد اسکول جانا جاری رکھ سکتا ہے۔

خود کو اور اپنی فیملی، دوستوں اور ساتھ کام کرنے والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، آپ کو ویکسین کے بعد بھی ان باتوں کا لازماً خیال رکھنا ہوگا:

- سماجی فاصلے کو ذہن میں رکھیں
- حسب ہدایت چہرے پر ماسک لگائیں
- اپنے ہاتھوں کو دھیان سے اور بار بار دھوئیں
- تازہ ہوا اندر آنے کے لیے کھڑکیاں کھولیں
- حالیہ ہدایات پر عمل کریں ([gov.uk/coronavirus](https://www.gov.uk/coronavirus))



COVID-19 کیسے پھیلتا ہے

ناک یا منہ سے سانس کے راستے باہر نکلنے والے بخارات سے پھیلتا ہے، خصوصاً بولتے یا کھانستے ہوئے۔
یہ جراثیم زدہ اشیاء اور سطحون کو ہاتھ لگانے کے بعد اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو چھوٹنے کے باعث ہی ہوسکتا ہے۔

مزید معلومات

براءہ کرم Coronavirus Yellow Card کی ویب سائٹ پر ویکسین، بشمول ممکنہ منفی اثرات، کی مزید تفصیلات کے لیے پروڈکٹ کی معلومات کا کتابچہ پڑھیں۔
آپ اسی ویب سائٹ پر یا پھر Yellow Card ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے مشتبہ منفی اثرات کی اطلاع بھی دے سکتے ہیں۔ مزید معلومات www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ پر دستیاب ہیں۔



© Crown copyright 2022. V1 1p 500K JAN 2022 (APS)
UK Health Security Agency gateway number: 20211196.
Product code: C22W511UR Urdu.

This leaflet is also available as an Easy Read version, braille, large print, and in Albanian, Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese, Estonian, Greek, Gujarati, Hindi, Panjabi, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Brazilian, Romany, Romanian, Russian, Somali, Spanish, Turkish, Twi, Ukrainian and Urdu paper copies.

اس کتابچے کی مزید نقول آرڈر کرنے کے لیے www.healthpublications.gov.uk وزٹ کریں
یا اس نمبر پر فون کریں: 0300 123 1002 (صبح 8 سے شام 6 تک، پیر تا جمعہ)۔