



COVID-19 疫苗

用于免疫系统较弱的人

建议免疫系统严重减弱的人接种第三剂COVID-19疫苗。这是为了帮助提升您从前2剂中可能已建立的任何保护，并在您的加强剂之前给予。

什么是COVID-19或冠状病毒？

COVID-19是一种由SARS-CoV-2病毒引起的传染性很强的呼吸道疾病。对于免疫系统较弱的人来说，这可能会非常严重。尽管一些新测试的治疗方法确实有助于降低并发症的风险，但COVID-19没有特效药。

为什么要为我提供第三剂COVID-19疫苗？

第三剂疫苗将提供给所有在接种前两剂COVID-19疫苗时免疫系统较弱的5岁及以上人群。您对疫苗的反应可能没有像其他人那么好。这第三剂可能有助于提升您的免疫反应，并为您提供更好的保护。

您的专家可以建议这是否适用于您。通过接种第三剂，您可能会减少感染COVID-19的机会。

而且，如果您有接种，与未接种第三次疫苗相比，症状可能较轻且病程较短。

需要第三剂的人是那些在接种前两剂时免疫系统严重减弱的人。这包括那些曾经或目前有以下情况的人：

- 血癌（如白血病或淋巴瘤）
- 因治疗（如类固醇药物、生物疗法、化学疗法或放射疗法）导致免疫力下降
- 因遗传性免疫系统疾病导致免疫力下降
- 器官或骨髓移植
- 影响免疫系统的疾病，例如控制不佳的艾滋病毒（HIV）
- 您的专科医生建议的其他疾病或治疗

我应该什么时候接种第三剂？

您将需要额外的1剂来提升您得到的保护。您的额外（第三）剂应在第二剂后至少8周给予。

之后，您可能还需要加强剂以延长您的保护 - 任何加强剂都应在您额外（第三次）剂量的3个月后给予。

副作用

非常常见的副作用包括：

- 注射部位的手臂有疼痛、沉重的感觉和压痛。这往往在疫苗接种后1到2天左右最为严重
- 感觉累
- 头痛
- 全身疼痛，或轻度流感样症状

您可以休息并服用扑热息痛 (paracetamol) (遵循包装中的剂量建议) 以帮助您感觉好转。尽管在2到3天内感到发烧并不少见，但很少发生高烧，这可能表明您感染了COVID-19 或有其他感染。

接种疫苗后的症状通常持续不到一周。如果您的症状似乎变得更糟或您担心的话，您可以拨打NHS 111。

如何得到疫苗接种

您可以上网预订或前往步入式诊所接种第三剂。为了帮助诊所检查您是否符合条件，请携带您的全科医师 (GP) 或专科医生的任何信件或您正在服用的药物的详细信息。

不应该接种第三次疫苗的人

如果您对上一剂疫苗有非常严重的反应，您应该与您的医生讨论这个问题。

如果您错过了疫苗接种

如果您还没有接种前2剂疫苗中的任何一剂，您应该尽快接种。

如果距您的第二次接种已经超过8周，请尽快安排您的额外（第三）剂接种。

如果您的年龄在12岁或以上，您还需要一次加强剂。您的加强剂应在第三剂后3个月给予。

如果您已经接种了加强剂，那么今年春天您也将有资格获得另一次加强剂。

如果尚未接种加强剂，那么作为春季推广活动的一部分，您不久后就可以接种加强剂。

今年秋天您可能需要另一次加强剂。



更多信息

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/

您可以在此处阅读COVID-19疫苗接种后的预期结果

www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination

© Crown copyright 2021. UK Health Security Agency gateway number: 20211345.

Product code: C22WI2CH Simplified Chinese. 500K 2p MAR 2022 (APS). Version 3. 02/03/2022. If you want to order more copies of this leaflet using the product code C22WI2CH Simplified Chinese, please visit: www.healthpublications.gov.uk