



Vaccinul împotriva COVID-19

pentru persoanele care au un sistem imunitar slăbit

Persoanele care au un sistem imunitar slăbit în mod sever sunt sfătuite să primească o a treia doză de vaccin împotriva COVID-19. Acest lucru are rolul de a ajuta la îmbunătățirea oricărei protecții pe care ați obținut-o din primele 2 doze și se administrează înaintea rapelurilor.

Ce este COVID-19 sau coronavirusul?

COVID-19 este o boală respiratorie foarte infecțioasă, cauzată de virusul SARS-CoV-2. Poate fi foarte gravă la persoanele care au un sistem imunitar slăbit. Nu există un leac pentru COVID-19, deși unele tratamente nou testate ajută la reducerea riscului de complicații.

De ce mi se oferă o a treia doză de vaccin împotriva COVID-19?

Această a treia doză este oferită tuturor persoanelor cu vârsta de 5 ani și peste care aveau un sistem imunitar slăbit în perioada în care au primit primele 2 doze de vaccin anti-COVID-19. Este posibil să nu fi răspuns la fel de bine ca alte persoane. Această a treia doză poate ajuta la îmbunătățirea răspunsului imunitar și vă poate oferi o protecție mai bună.

Specialistul vă poate spune dacă acest lucru este valabil pentru dumneavoastră. Administrându-vă a treia doză, vă puteți reduce riscul de a contracta infecția cu COVID-19.

Și, dacă o contractați, simptomele pot fi mai puțin severe și boala mai scurtă decât dacă nu ați fi făcut al treilea vaccin.

Persoanele care au nevoie de o a treia doză sunt cele care au avut un sistem imunitar slăbit în mod sever în perioada în care au primit primele 2 doze. Aici se includ cei care au avut sau au:

- cancer de sângeră (precum leucemia sau limfomul)
- imunitate scăzută din cauza unui tratament (cum ar fi medicamente cu steroizi, terapie biologică, chimioterapie sau radioterapie)
- imunitate scăzută din cauza tulburărilor moștenite ale sistemului imunitar
- un transplant de organe sau măduvă osoasă
- boli care afectează sistemul imunitar, cum ar fi HIV slab controlat
- alte boli sau tratamente conform sfatului specialistului



Când trebuie să primesc a treia doză?

Veți avea nevoie de 1 doză suplimentară pentru a vă îmbunătăți protecția. Doza dumneavoastră suplimentară (a treia) trebuie administrată la cel puțin 8 săptămâni după a doua doză.

După aceea, este posibil să aveți nevoie și de doze de rapel pentru a vă extinde protecția – orice rapel trebuie administrat începând cu 3 luni după doza dumneavoastră suplimentară (a treia).

Reacții adverse

Reacțiile adverse foarte frecvente includ:

- o senzație dureroasă, greoaie și de sensibilitate la nivelul brațului, la locul în care s-a efectuat injecția. Aceasta tinde să se acutizeze la aproximativ 1-2 zile după vaccin
- senzație de oboseală
- durere de cap
- dureri generale sau simptome ușoare asemănătoare gripei

Puteți să vă odihniți și să luați paracetamol (respectați doza recomandată în prospectul din ambalaj) pentru a vă ajuta să vă simțiți mai bine. Deși starea febrilă nu este neobișnuită timp de 2-3 zile, o temperatură ridicată este neobișnuită și ar putea indica faptul că suferiți de COVID-19 sau de o altă infecție.

Simptomele de după vaccinare durează, în mod normal, mai puțin de o săptămână.

Dacă simptomele dumneavoastră par să se agraveze sau dacă sunteți îngrijorat(ă), puteți apela NHS 111.

Cum să primiți vaccinarea

Puteți face o programare online sau puteți merge direct la o clinică pentru a treia doză. Pentru a ajuta clinica să verifice dacă sunteți eligibil(ă), vă rugăm să aduceți orice scrisori de la medicul dumneavoastră de familie sau de la specialist sau detalii despre medicamentele pe care le luați.

Persoane care nu ar trebui să primească a treia vaccinare

Dacă ați avut o reacție foarte severă la doza anterioară de vaccin, trebuie să discutați acest lucru cu medicul dumneavoastră.

Dacă ați omis o vaccinare

Dacă nu ați efectuat niciuna dintre primele 2 doze de vaccin, trebuie să le efectuați în cel mai scurt timp posibil.

Dacă au trecut acum mai mult de 8 săptămâni de la a doua doză, vă rugăm să aranjați să primiți (a treia) doză suplimentară cât mai curând posibil.

Dacă aveți 12 ani sau mai mult, veți avea nevoie și de un rapel. Rapelul trebuie administrat începând cu 3 luni după a treia dumneavoastră doză.

Dacă ați făcut deja rapelul, veți deveni eligibil(ă) și pentru un alt rapel în această primăvară.

Dacă nu, atunci puteți face rapelul în curând, ca parte a campaniei de primăvară.

Probabil că veți avea nevoie de un alt rapel în această toamnă.



Informații suplimentare

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/

și puteți citi broșura La ce să vă așteptați după vaccinarea împotriva COVID-19

www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination

© Crown copyright 2021. UK Health Security Agency gateway number: 20211359.

Product code: C22WI2RO Romanian. 500K 2p MAR 2022 (APS). Version 3. 02/03/2022. If you want to order more copies of this leaflet using the product code C22WI2RO Romanian, please visit: www.healthpublications.gov.uk