



UK Health
Security
Agency

NHS

له COVID-19 واکسیناسیون

وروسته څه طمع



د هغو خلکو لپاره معلومات
چې اوس اوس یې د COVID-19
واکسین کړی



نور معلومات دلته ترلاسه کړئ nhs.uk/CovidVaccine

هغه خلکو ته چې د کورونا وایروس (COVID-19) له پیچلتیاو څخه خورا ډیر خطر لري د COVID-19 واکسين وړاندیز کېږي. دا ورځه تاسو ته وایی چې د واکسين کولو څخه وروسته څه تمه ولری

سائید ایفکټس یعني اړخیزې اغېزې یې څه دي؟

د ټولو درملو په څیر، واکسين کولای شي د اړخیزو اغیزو لامل شي. چې اکثره یې کمزورې او لنډمهاله وي، او ټول خلک یې نه لري. د COVID-19 واکسين عامې اړخیزې اغیزې په یوه ورځ کې پیل کېږي او ممکن د څو ورځو لپاره دوام وکړي.

چې پکې دا شامل دي:

- په لاس کې د دردناک، دروند احساس او نرمښت درلودل
- چیرې چې تاسو انجیکشن لگولی وي
- د ستړیا احساس کول
- سردرد، درونو او سارۍ

تاسو ممکن د فلو په څیر نښې هم ولری چې د یو یا دوه ورځو لپاره د لړزیدو او رپیدلو دورې به هم ورسره وي. په هرصورت، د تودوخې لوړه درجه دا هم په گوته کوي چې تاسو COVID-19 یا بل انفیکشن لری (په 4 مخ کې مشوره وگورئ). تاسو کولای شئ آرام وکړئ او د پاراسیتامول نورمال خوراک واخلي (په پاکټ کې موجوده مشوره تعقیب کړئ) چې په ښه احساسولو کې ستاسو سره وکړي.

یو غیر معمولي اړخیزه اغیزه په بغل یا غاړه کې پرسیډلي غدې دي چې د لاس په ورته اړخ کې وي چې تاسو پکې واکسين کړی و دا تر 10 ورځو دوام کولای شي خو که زیات دوام وکړي نو باید خپل ډاکټر ووينئ. که تاسو د واکسين څخه وروسته په څو اونیو کې میموگرام ته اړتیا لری، نو تاسو باید د راتلو په وخت د دې ذکر وکړئ.

محتوى

سائيد ايفكتس يعني اړخيزې اغېزې يې څه دي؟

ما اوريدلي چې واکسين کولای شي د غير منظم حيض يا غير متوقع وينې بهيدنې لامل شي؟

زه بايد څه وکړم که زه د خپلو نښو په اړه انديښمن يم؟

آيا کوم نورې جدي جانبي عوارض يې شته؟

آيا زه بايد له واکسين کولو وروسته 15 دقيقې انتظار وکړم؟

زه خپل ورځني معمولات بيا کله پيلولای شم؟ آيا واکسين؟

به ما خوندي کړي؟

مهرباني وکړئ د خپل واکسين په اړه د نورو معلوماتو لپاره د محصول معلوماتي ورقچه ولولئ، په شمول د ممکنه جانبي عوارضو، د په لټولو **Coronavirus Yellow Card**.

تاسو هم په دغه ويب سايټ د مشتبه جانبي عوارضو يا د **Yellow Card app** په ډاونلوډ کولو هم رپورټ کولای شئ.



yellowcard.mhra.gov.uk

آيا كوم نورې زياتې جدي جانبي عوارض يې شته؟

د زړه د پرسوب نادرې پېښې (د مايوکارډيټس يا پيريکارډيټس په نوم ياديږي) د Pfizer او Moderna COVID-19 واکسينونو وروسته راپور شوي. دا قضيې د واکسين کولو وروسته په څو ورځو کې په ځوانو نارينه وو کې ليدل شوي.

د دې خلکو ډيری روغ شوي او د آرام او ساده درملنې وروسته ښه احساس شوي.



ما اوریدلي چې واکسين کولای شي د غیر منظم حیض یا غیر متوقع وینې بهیدنې لامل شي؟

د حیض ستونزې خورا عامې دي او د مختلف فاکتورونو له امله رامینځته کیدای شي پشمول د ذهني فشار او نورو لنډمهاله ناروغيو.

ځینې خلک ممکن د واکسين کولو څخه وروسته په میاشت کې د نورمال حیض څخه ډیره زیاته وینه تجربه کړي. په داسې حال کې چې د واکسين کولو وروسته د ځینو خلکو لخوا د حیض نور بدلونونه راپور شوي، داسې شواهد نشته چې دا دې د واکسين له امله وي.

زه باید څه وکړم که زه د خپلو نښو په اړه اندیښمن یم؟

دا نښې په نورمله توګه تر یوې هفتې لږ دوام لري. که ستاسو نښې خرابې ښکاري یا تاسو اندیښنه لرئ، NHS 111 ته زنګ ووهئ. که تاسو د ډاکټر یا نرس څخه مشوره غواړئ، ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو دوی ته د خپل واکسين په اړه ووايست (هغوی ته خپل د واکسيناسیون کارت وروښایست) چې هغوی ستاسو صحیح ارزونه وکړای شي.

تاسو کولای شئ د Yellow Card scheme (ژیر کارت سکیم) له لارې د واکسينونو او درملو شکمنې اړخیزې اغیزې هم راپور کړئ. تاسو کولای شئ دا آنلاین د Yellow Card لټولو له لارې ترسره کړئ یا د Yellow Card app په ډاونلوډ کولو هم (مهرباني وکړئ صفحه 2 وګورئ)

آيا واکسين به ما خوندي کړي؟

د COVID-19 واکسينونه چې تاسو لگولي دي، ښودل شوي چې ستاسو د شديد COVID-19 ناروغۍ احتمال کموي.

دا ممکن ستاسو د بدن لپاره د محافظت رامینځته کولو لپاره د لومړي دوز څخه وروسته یو څو اونۍ وخت ونيسي. ستاسو بدن باید د اضافي خوراکونو وروسته ډیر چټک غبرگون پیل کړي (څو ورځې وروسته). د ټولو درملو په څیر، هیڅ واکسين په بشپړه توګه اغیزمن نه دی، نو تاسو باید د انتان څخه د مخنیوي لپاره د پام وړ احتیاطي تدابیرو ته دوام ورکړئ. د د واکسين کولو باوجود هم COVID-19 ولري، خو دا به کم جدي وي.

واکسين نشي کولای تاسو ته د COVID-19 انفیکشن درکړي، او بشپړ کورس به ستاسو د جدي ناروغه کیدو چانس کم کړي.

**Don't forget your
COVID-19 vaccination**

NHS

**Make sure you keep this record
card in your purse or wallet**

For more information on the
COVID-19 vaccination or what
to do after your vaccination,
see www.nhs.uk/covidvaccine

COVID-19 immunisation
Protect yourself.



خپل کارت خوندي ساتئ-
تاسو د NHS App هم چیک کولای شئ-

تاسو باید سمدستي طبي مشوره وغواړئ که تاسو تجربه کوئ:

- د سینې درد
- ساه راماتېدل
- د زړه تېزه درزا، د زړه بې ارامي یا د زړه ډېر په لوړ
اواز درزېدل

آیا زه باید له واکسین کولو وروسته 15 دقیقې انتظار وکړم؟

کله چې موږ په لومړي ځل د Moderna او Pfizer واکسینونه کارول، خلک به د واکسین کولو وروسته د 15 دقیقو لپاره د لیدلو لپاره پاتې کېدل. د الرجیک عکس العمل خورا ټیټې شرحې له امله، یوازې هغه خلک چې د جدي الرجی تاریخ لري یا هغه چا چې د پخواني COVID-19 واکسین په اړه عکس العمل درلود باید دې وخت ته انتظار وباسي.

په هرصورت، د بې هوشۍ د خطر له امله، هیڅوک باید د واکسین لگولو لږ تر لږه 15 دقیقې وروسته موټر و نه چلوي.

زه خپل ورځني معمولات بیا کله پیلولای شم؟

تاسو باید وکوالی شئ هغه فعالیتونه بیا پیل کړئ چې ستاسو لپاره نورمال دي تر هغه چې تاسو ښه احساس کوئ. که ستاسو لاس په ځانگړې توگه دردمند وي، تاسو ممکن د درنو شیانو پورته کولو ستونزمن ومومئ. که تاسو ځان ناروغه یا ډیر ستړی احساسوئ نو تاسو باید آرام وکړئ او د ماشینونو یا موټر چلولو څخه ډډه وکړئ.

واکسیناسیون، د هغه خلکو حفاظت کوي

که تاسو د COVID-19 واکسین په اړه نورو معلوماتو ته اړتیا لرئ
مهرباني وکړئ ولاړ شئ دلته:

[www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/](http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/)



UK Health
Security
Agency

© Crown copyright 2023

V7. 3M MAR 2023 (APS). Product Code: COV23WTPAS Pashto

UK Health Security Agency gateway number: 2022816

دا ورځپاڼه په بریل، BSL، ویډیو، ستر پرنټ، د ایزي رید Easy Read بڼې په توګه
هم موجوده ده او له 26 څخه زیاتو ژبو کې د راغوښتلو لپاره دلته موجوده ده
www.healthpublications.gov.uk یا 0300 123 1002 ته زنگ ووهئ.