

Herhangi bir yan etkisi var mıdır?

Enjeksiyon yerinde bir miktar şişlik, kızarıklık veya hassasiyet olması sık görülen bir durumdur. Bazen ağrısız küçük bir şişlik gelişir, ancak bu genellikle birkaç hafta içinde kaybolur. Daha ciddi etkiler nadir olmakla birlikte ateş, baş ağrısı, baş dönmesi veya baygınlık hissi, hasta hissetme ve bezlerin şişmesi görülebilir.


Aşıdan sonra kendinizi iyi hissetmiyorsanız, parasetamol alın. Şişe veya paket üzerindeki talimatları dikkatlice okuyun ve yaşıınıza uygun dozu alın. Gerekirse, 4 - 6 saat sonra ikinci bir doz alın.

İkinci dozdan sonra vücut sıcaklığınız hala yüksekse, doktorunuzla konuşun veya ücretsiz 111 numaralı NHS yardım hattını arayın.

Aşıdan olduğu şüphelenilen herhangi bir yan etki yaşarsanız, bunları Sarı Kart web sitesinde veya 0800 731 6789 numaralı telefonu arayarak (Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9'dan akşam 5'e kadar) veya Sarı Kart uygulamasını indirerek bildirebilirsiniz. www.mhra.gov.uk/yellowcard

Şimdi, tüm aşılarınızın güncel olup olmadığını kontrol etmek için iyi bir zaman.

Gençlerde aşılamalar



NHS aşıları



Gençlerde aşılamalarla ilgili daha fazla bilgi için www.nhs.uk/vaccinations adresini ziyaret edin veya <https://qrco.de/YoungPeopleImms> yazısını okuyun



Atlamış olabileceğiniz dozları yakalamak için çok geç değil.

Bu broşür Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından hazırlanmıştır.

© Crown copyright 2023. 1P 100K JULY 2023 (APS). Product code: YP3BG1TK Turkish. UK Health Security Agency gateway number: 2023188.

Bu broşür şu adresten sipariş edilebilir veya indirilebilir: www.healthpublications.gov.uk, telefon: 0300 123 1002 (hatlar Pazartesi-Cuma arasında 8.00-18.00 saatleri arasında açıktır)

Bu broşürün İngilizce basılı kopyaları sipariş edilebilir.

Bu broşürün tercüme edilmiş versiyonları da sipariş edilebilir.



UK Health
Security
Agency

Td/IPV genç 3'ü 1 arada takviye aşısı



14 yaşında veya okulun 9. yılında, tetanoz, difteri ve çocuk felcini önleyen aşının 3'ü 1 arada gençlik aşısı için uygun hale gelirsiniz. **Td/IPV aşısı, vücudunuzun, siz büyüdükçe bu bulaşıcı hastalıklara karşı azalmış olabilecek bağışıklığınızı artıracaktır.**

Bu aşı beni neye karşı korur?

T

Tetanoz

Tetanoz sinir sistemini etkileyen, kas spazmlarına yol açabilen, solunum problemlerine yol açabilen ve öldürebilen ağırlı bir hastalıktır. Toprakta ve gübrede bulunan mikropların açık kesikler veya yanıklar yoluyla vücuda girmesiyle oluşur. Tetanoz insandan insana geçmez.

D

Difteri

Difteri, genellikle boğaz ağrısıyla başlayan ve hızla solunum problemlerine neden olabilen ciddi bir hastalıktır. Kalbe ve sinir sistemine zarar verebilir ve ağır vakalarda ölüme neden olabilir.

IPV

Polio (Çocuk felci)

Çocuk felci, sinir sistemine saldıran ve kaslarda kalıcı felçlere neden olabilen bir virüstür. Çocuk felci, göğüs kaslarını veya beyni etkiliyorsa ölüme neden olabilir.

Gençlere yönelik pekiştirici aşının adı Revaxis'tir, www.medicines.org.uk/emc/product/5581/pil adresindeki Hasta Bilgi Broşürünü okuyabilirsiniz.

Çocukken tetanoz, difteri ve çocuk felcine karşı aşılandıysam hala tam olarak korunuyorum mu?

Hayır, daha önce aldığınız korumayı tamamlamak için yine de bir takviyeye ihtiyacınız olacak.

Ne kadar takviye almam gerekir?

Bağışıklığınızı oluşturmak ve korumak için toplam 5 doz tetanoz, difteri ve çocuk felci aşısına ihtiyacınız vardır.

Aşağıda belirtilen aşılara olmuş olmanız gerekir:



İlk 3 doz
bebekken



4. doz
3 -5 yaşları arasındayken,
okul öncesi takviye dozudur



5. doz
9. yılda zorunlu hale gelir
(13-14 yaşları)

Gelecekte daha fazla takviyeye ihtiyacım olacak mı?

Muhtemelen bu aşılar için daha fazla takviyeye ihtiyacınız olmayacak. Bununla birlikte, bazı ülkeleri ziyaret ediyorsanız veya bir yaralanmanız varsa, bazı aşıların ekstra dozlarına ihtiyacınız olabilir, başka bir tetanoz enjeksiyonuna ihtiyacınız olabilir. Aile sağlığı merkezindeki hemşirenize danışın.

Td/IPV takviyesi bana nasıl uygulanacak?

Üst kolunuzdan 1 enjeksiyon yapılacaktır. Kimse iğneyi sevmez, ama bu çok hızlı olacak. Kullanılan iğneler küçüktür ve sadece ufak bir sinek ısırığı hissetmelisiniz. Enjeksiyon yaptırmada konusunda biraz gerginseniz, iğne olmadan önce hemşireye veya doktora söyleyin.

Yaptırmam gereken başka aşılar var mı?

Td/IPV güçlendirici aşınızı yaptırırken MenACWY aşınız için de uygun olacaksınız. Okuldan ayrılmadan bu aşığı olmalısınız. Eğer atladıysanız ve hala okuldaysanız, okul hemşirenizle konuşun. Okuldan ayrıldıysanız, aşı için aile hekiminizle iletişime geçmelisiniz. HPV ve MMR (kızamık, kabakulak ve kızamıkçık) dahil olmak üzere diğer tüm aşılarınızın güncel olup olmadığını aile hekiminizden kontrol etmeniz iyi bir fikirdir.

**Hiç MMR aşısı
olmadıysanız,
kızamık, kabakulak
ve kızamıkçık
korunmak için şimdi
bir doz ve 1 ay
sonra bir doz daha
yaptırmalısınız.**

