

## Há algum efeito colateral?

É comum ter um pouco de inchaço, vermelhidão ou sensibilidade no local da injeção. Às vezes, surge um pequeno nódulo indolor, mas ele geralmente desaparece em algumas semanas. Efeitos colaterais mais graves são raros, mas podem incluir febre, dor de cabeça, tontura ou sensação de desmaio, enjoo e glândulas inchadas.

Caso se sinta mal após a imunização, tome paracetamol. Leia atentamente as instruções fornecidas no frasco ou na embalagem e tome a dose correta para sua idade. Se necessário, tome uma segunda dose depois de 4 a 6 horas.

Se a febre continuar alta após a segunda dose, fale com seu médico de família (GP) ou ligue para a linha de assistência gratuita do NHS através do número 111.

Em caso de suspeita de efeitos colaterais da vacina, é possível relatá-los no site do Yellow Card ou ligando para 0800 731 6789 (das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira) ou baixando o aplicativo Yellow Card.

[www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard)

**Agora é um bom momento para verificar se você está em dia com todas as suas imunizações**

## Imunizações para jovens



## Vacinas oferecidas pelo NHS



Para obter mais informações sobre vacinas para adolescentes, visite o site [www.nhs.uk/vaccinations](http://www.nhs.uk/vaccinations) ou leia <https://qrco.de/YoungPeopleImms>



**Nunca é tarde demais para colocar em dia as doses que talvez não tenha recebido.**

Este folheto foi produzido pela Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido.

© Crown copyright 2023. 1P 100K JULY 2023 (APS). Product code: YP3BG1BRP  
Brazilian Portuguese. UK Health Security Agency gateway number: 2023164.

Você pode solicitar ou baixar o folheto acessando o site [www.healthpublications.gov.uk](http://www.healthpublications.gov.uk) ou ligando para 0300 123 1002 (o horário de atendimento é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira).

Estão disponíveis para pedido cópias impressas deste folheto na versão em inglês.

Também estão disponíveis para pedido versões traduzidas deste folheto.



UK Health  
Security  
Agency

**Td/IPV reforço para adolescentes 3 em 1**



Aos 14 anos de idade ou durante o 9º ano escolar, é possível receber a dose de reforço 3 em 1 (trivalente) para adolescentes da vacina que previne contra tétano, difteria e poliomielite. **A vacina Td/IPV aumenta a imunidade do seu corpo contra essas doenças infecciosas, que pode ter diminuído com o passar dos anos.**

## Contra o que essa vacina me protege?

### Tétano

O tétano é uma doença dolorosa que afeta o sistema nervoso e pode levar a espasmos musculares, causar problemas respiratórios e pode ser fatal. Essa doença é causada por germes encontrados no solo e no esterco que entram no corpo por meio de cortes abertos ou queimaduras. O tétano não é transmissível de pessoa para pessoa.

### Difteria

A difteria é uma doença grave que geralmente começa com uma dor de garganta e pode rapidamente causar problemas respiratórios. Essa doença pode danificar o coração e o sistema nervoso e, em casos graves, pode ser fatal.

### Poliomielite

A poliomielite é causada por um vírus que ataca o sistema nervoso e pode levar à paralisia permanente dos músculos. Se a doença afetar os músculos do tórax ou o cérebro, a poliomielite pode ser fatal.

A vacina de reforço para adolescentes chama-se Revaxis. É possível ler a bula da vacina no site [www.medicines.org.uk/emc/product/5581/pil](http://www.medicines.org.uk/emc/product/5581/pil)

**T**

### Difteria

**D**

### IPV

**IPV**

## Se fui imunizado contra tétano, difteria e poliomielite quando criança, ainda estou totalmente protegido?

Não, você ainda precisará de um reforço para completar a proteção que recebeu anteriormente.

## Quantos reforços eu preciso tomar?

É necessário um total de 5 doses de vacinas contra o tétano, a difteria e a poliomielite para desenvolver e manter a imunidade.

Você deve ter recebido:



### as 3 primeiras doses

quando bebê



### 4ª dose

para crianças entre 3 e 5 anos de idade, esse é o reforço pré-escolar



### a 5ª dose

deve ser administrada no 9º ano escolar (de 13 a 14 anos de idade)

## Vou precisar de mais reforços no futuro?

Provavelmente, não será necessário receber novas doses de reforço dessas vacinas. No entanto, talvez sejam necessárias doses extras de algumas vacinas se viajar para determinados países ou se tiver um ferimento, poderá precisar de outra injeção contra tétano. Consulte a enfermeira do consultório do seu médico de família.

## Como receberei o reforço da vacina Td/IPV?

Você receberá uma injeção na parte superior do braço. Ninguém gosta de injeções, mas é muito rápido. As agulhas usadas são pequenas, e sente-se só uma picadinha. Caso tenha certo receio de tomar a injeção, informe a enfermeira ou o médico antes de tomá-la.

## Preciso tomar algum outro tipo de vacina agora?

Quando receber o reforço da vacina Td/IPV, também terá direito a receber a vacina anti-meningocócica (MenACWY). Você deve receber essa vacina antes de terminar a escola. Se não tiver recebido a vacina e ainda estiver na escola, entre em contato com a enfermeira da escola. Se tiver saído da escola, conte ao seu médico de família para ficar em dia com a vacina. É uma boa ideia verificar com seu médico de família se todas as suas outras vacinas estão em dia, incluindo HPV e MMR (sarampo, caxumba e rubéola).

**Caso nunca tenha tomado a vacina MMR, você deve tomar uma dose agora e outra depois de 1 mês para se proteger contra sarampo, caxumba e rubéola.**

