

有没有副作用？

注射部位通常会出现肿胀、发红或压痛。有时会出现没有痛楚的小肿块，但这通常会在几周内便消失。更严重的副作用很少见，但包括发烧、头痛、头晕或感觉虚弱、感觉恶心和腺体肿胀。

如果在接种疫苗后感到不适，请服用扑热息痛 (paracetamol)。仔细阅读瓶子或包装上的说明，并服用适合您年龄的正确剂量。如有需要，请在4到6小时后服用第二剂。

如果您的体温在服用第二剂后依然偏高，请联络您的全科医生 (GP) 或致电国民保健服务 (NHS) 的免费求助热线111。

如果您有任何疑似的疫苗副作用，您可以在 Yellow Card 网站上报告情况，或致电 0800 731 6789 (周一至周五上午9点至下午5点) 或下载 Yellow Card 应用程序。

www.mhra.gov.uk/yellowcard

趁现在确认您已接种了所有建议您接种的疫苗

针对年轻人的 疫苗接种

NHS疫苗



有关青少年疫苗接种的更多信息，请访问
www.nhs.uk/vaccinations或阅读
<https://qrco.de/YoungPeopleImms>



现在补上您可能错过的
剂量还为时不晚。

本传单由英国健康安全局 (UK Health Security Agency) 制作。
© Crown copyright 2023. 1P 100K JULY 2023 (APS). Product code:
YP3BG1CHS Chinese (Simplified). UK Health Security Agency
gateway number: 2023166.

本传单可以在以下网站索取或下载：
www.healthpublications.gov.uk, 或致电：0300 123 1002
(热线开放时间为周一至周五上午8点至下午6点)

本传单的英文版纸质版可供索取。

本传单的翻译版本也可供索取。



Td/IPV 青少年 3合1增强剂



14岁或在校九年级时，您就有资格接种三合一青少年增强剂疫苗，以预防破伤风、白喉和脊髓灰质炎。**Td/IPV疫苗将增强您身体对这些传染病的免疫力，而随着您的成长，这些免疫力可能会下降。**

这疫苗可保护我免受什么伤害？

破伤风

T 破伤风是一种影响神经系统的痛苦疾病，可导致肌肉痉挛、呼吸问题，甚至致命。这是由于土壤和粪便中的细菌通过开放性伤口或烧伤进入体内而引起的。破伤风不会人传人。

白喉

D 白喉是一种严重的疾病，通常以喉咙痛开始，很快就会导致呼吸问题。它会损害心脏和神经系统，严重时甚至会致命。

脊髓灰质炎

IPV 脊髓灰质炎是一种攻击神经系统的病毒，可导致肌肉永久性瘫痪。如果脊髓灰质炎影响胸部肌肉或大脑，则可能致命。

青少年疫苗增强剂称为Revaxis，您可以在以下网站阅读患者信息传单：
www.medicines.org.uk/emc/product/5581/pil

如果我小时候接种过破伤风、白喉和脊髓灰质炎疫苗，我是否仍能得到充分保护？

不能，您仍然需要接种增强剂，以重新增强您以往接种时所得到的保护。

我需要接种多少次增强剂？

您总共需要接种5剂破伤风、白喉和脊髓灰质炎疫苗来增强和保持免疫力。

您应已接种过：



最初3剂

在婴儿时期



第4剂

当您3至5岁时，
这是学前增强剂



第5剂

在校9年级时要接种
(13至14岁)

我在将来需要再接种更多增强剂吗？

您应该不需要继续接种这些疫苗的增强剂。但是，如果您前往某些国家/地区，或者如果您受伤，您可能需要再次注射破伤风疫苗。请咨询您的全科医生诊所的执业护士。

我将如何获得 Td/IPV疫苗增强剂？

您将在上臂接受1次注射。没有人喜欢接受注射，但过程会很快速。使用的针头很小，您应该只会感觉到微小的针刺。如果您对注射感到有点紧张，请在注射前告诉护士或医生。

我现在还需要进行其他免疫接种吗？

当您接种Td/IPV疫苗增强剂时，您也将有资格接种MenACWY疫苗。您应在离校前接种此疫苗。如果您仍在校而错过了此疫苗，请告知学校护士。如果您已离校，您应该联络您的全科医生诊所安排补充注射。最好咨询您的全科医生诊所，确保您的所有其他免疫接种都是最新的，包括HPV和MMR（麻疹、腮腺炎和风疹）。

