

Kas on mingeid kõrvalnähtusid?

Süstekohas tekib sageli turse, punetus või hellus. Mõnikord tekib väike valu punn, kuid tavaliselt kaob see mõne nädalaga. Tõsisemad kõrvalnähtud on haruldased, kuid nende hulka kuuluvad palavik, peavalu, pearinglus või minestustunne, iiveldus ja näärmete turse.

Kui tunnete end pärast vaktsineerimist halvasti, võtke parasetamooli. Lugege hoolikalt pudelil või pakendil olevaid juhiseid ja võtke oma vanusele vastav annus. Vajadusel võtke teine annus 4 – 6 tunni pärast.

Kui teil on pärast teist annust endiselt kõrge palavik, rääkige oma perearstiga või helistage tasuta NHS-i abitelefoni 111.

Kui teil esineb vaktsiini kahtlustatavaid kõrvalnähte, saate neist teada anda the Yellow Card - kollase kaardi võrgulehel või helistades numbril 0800 731 6789 (esmaspäevast reedeni kell 9.00–17.00) või laadides alla Yellow Card'i rakenduse. www.mhra.gov.uk/yellowcard

Nüüd on õige aeg kontrollida, kas olete kõik oma vaktsiinid saanud

Vaktsineerimised noortele



NHS-i vaktsineerimised



Teismeliste vaktsineerimise kohta lisateabe saamiseks külastage võrgulehte www.nhs.uk/vaccinations või lugege siit <https://qrco.de/YoungPeopleImms>



Kui teil on mõni annus vahele jäänud, ei ole kunagi hilja seda tagantjärele saada.

Käesoleva infolehe on koostanud Ühendkuningriigi tervisekaitseamet.
© Crown copyright 2023. 1P 100K JULY 2023 (APS). Product code: YP3BG1EST Estonian. UK Health Security Agency Gateway number: 2023168.
Infoteleht saab tellida või alla laadida aadressilt www.healthpublications.gov.uk, või helistades numbril 0300 123 1002 (telefoniliinid on avatud 8.00 - 18.00 esmaspäevast reedeni).
Tellimiseks on saadaval selle infolehe ingliskeelsed paberkoopiad.
See infoteleht on tellimiseks saadaval ka tõlgituna.



UK Health
Security
Agency

Td/IPV teismeliste
kolm-ühes
tõhustusdoos



14-aastaselt või 9. kooliaasta jooksul on teil reeglina lubatud saada teetanust, difteeriat ja lastehalvatust ära hoidva vaktsiini kolm-ühes teismeliste tõhustusdoos. **Td/IPV vaktsiin suurendab teie organismi immuunsust nende nakkushaiguste suhtes, mis võib olla vähenenud teie kasvades.**

Mille eest see vaktsiin mind kaitseb?

T

Teetanus

Teetanus on vaevaline närvisüsteemi mõjutav haigus, mis võib põhjustada lihasspasme, hingamisprobleeme ja surma. See tekib siis, kui pinnases ja sõnnikus leiduvad mikroobid satuvad lahtiste lõikehaavade või põletuste kaudu kehasse. Teetanust ei saa inimeselt inimesele edasi anda.

D

Difteeria

Difteeria on tõsine haigus, mis algab tavaliselt kurguvaluga ja võib kiiresti põhjustada hingamisprobleeme. See võib kahjustada südant ja närvisüsteemi ning rasketel juhtudel tappa.

IPV

Lastehalvatus

Poliomüeliidi viirus ründab närvisüsteemi, mis võib põhjustada püsivat lihaste halvatus. Kui see mõjutab rindkere lihaseid või aju, võib lastehalvatus surmav olla.

Teismeliste tõhustusdoos kannab nime Revaxis, patsiendi infolehte saate lugeda aadressil www.medicines.org.uk/emc/product/5581/pil

Kui mind lapsena vaktsineeriti teetanuse, difteeria ja lastehalvatuse vastu, kas olen siis endiselt täielikult kaitstud?

Ei, varem saadud kaitse täiendamiseks vajate siiski tõhustusdoosi.

Kui mitu tõhustusdoosi ma pean saama?

Immuunsuse ülesehitamiseks ja säilitamiseks vajate kokku 5 annust teetanuse, difteeria ja lastehalvatuse vaktsiine.

Te oleksite pidanud saama:



esimesed 3 annust
imikueas



4. annus
kui olite 3–5-aastane; see on eelkooliealiste tõhustusdoos



5. annus
antakse 9. kooliaastal (13-14. a. vanuselt)

Kas mul on edaspidi vaja veel tõhustusdoose?

Tõenäoliselt ei vaja te nende vaktsiinide puhul tõhustusdoose. Siiski, kui külastate teatud riike või kui te olete saanud vigastuse, võib teil täiendavalt vaja olla veel üht teetanuse süsti. Arutamiseks pöörduge oma perearstikeskuse õe vastuvõtule.

Kuidas mulle Td/IPV tõhustusdoosi manustatakse?

Te saate 1 süsti õlavarde. Süstid ei meeldi kellelegi, kuid see tehakse väga kiiresti. Kasutatakse väga väikesi nõelu ja te tunnete vaid väikest nõelatorget. Kui süstimine hirmutab teid, rääkige sellest enne õele või arstile.

Kas mul on praegu vaja muid vaktsiine?

Td/IPV tõhustusdoosi saamise ajal on teil õigus saada ka MenACWY vaktsiini. Selle peaksite saama enne koolist lahkumist. Rääkige oma kooliõega, kui jäite koolis sellest ilma, kuid käite endiselt koolis. Kui olete koolist lahkunud, võtke ühendust oma perearstiga tagantjärei vaktsineerimise kokku leppimises. Hea mõte on küsida oma perearstilt, kas kõik teie muud vaktsineerimised, sealhulgas HPV ja MMR (leetrid, mumps ja punetised) on ajakohased.

Kui te pole kunagi MMR-vaktsiini saanud, peaksite saama leetrite, mumpsi ja punetiste eest kaitseks ühe annuse nüüd ja teise annuse üks kuu hiljem.

