

¿Tiene efectos secundarios?

Es frecuente que se produzca cierta hinchazón, enrojecimiento o sensibilidad en el lugar de la inyección. A veces aparece un pequeño bulto que no produce dolor, pero suele desaparecer en unas semanas. Los efectos más graves son poco frecuentes, pero incluyen fiebre, dolor de cabeza, mareos o sensación de desmayo, náuseas e inflamación de los ganglios.

Toma paracetamol si te encuentras mal después de la vacunación. Lee atentamente las instrucciones del envase y toma la dosis adecuada para tu edad. En caso necesario, toma una segunda dosis entre 4 y 6 horas más tarde.

Si tu temperatura sigue siendo alta después de la segunda dosis, habla con tu médico de cabecera o llama al teléfono gratuito de ayuda del NHS 111.

Si experimentas algún posible efecto secundario de la vacuna, puedes notificarlo en el sitio web de Yellow Card o llamando al 0800 731 6789 (de 9 a 17 horas de lunes a viernes) o descargando la aplicación Yellow Card. www.mhra.gov.uk/yellowcard

Ahora es un buen momento para comprobar que tienes al día todas tus vacunas.

Vacunación para los más jóvenes



Vacunas del NHS



Para más información sobre las vacunas para adolescentes, visita www.nhs.uk/vaccinations o consulta <https://qrco.de/YoungPeopleImms>.



Nunca es tarde para ponerse al día con las dosis que no hayas recibido.

Este folleto ha sido elaborado por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido.

© Crown copyright 2023. 1P 100K JULY 2023 (APS). Product code: YP3BG1ESP Spanish. UK Health Security Agency gateway number: 2023185.

El folleto puede solicitarse o descargarse en:

www.healthpublications.gov.uk, llamando por teléfono: 0300 123 1002 (las líneas están abiertas de 8.00 a 18.00 de lunes a viernes).

Puedes solicitar ejemplares impresos de este folleto en inglés.

También puedes solicitar versiones traducidas de este folleto.



UK Health
Security
Agency

**Td/IPV refuerzo
3 en 1 para
adolescentes**



A los 14 años, o durante el noveno curso de la escuela, puedes recibir la dosis de refuerzo 3 en 1 de la vacuna que previene el tétanos, la difteria y la poliomielitis. **La vacuna Td/IPV reforzará la inmunidad de tu cuerpo frente a estas enfermedades infecciosas, ya que puede haber disminuido a medida que has ido creciendo.**

¿Contra qué me protege esta vacuna?

T **Tétanos**
El tétanos es una enfermedad dolorosa que afecta al sistema nervioso y puede provocar espasmos musculares, problemas respiratorios e incluso la muerte. Se produce cuando los gérmenes que se encuentran en la tierra y el estiércol penetran en el organismo a través de cortes abiertos o quemaduras. El tétanos no se transmite de una persona a otra.

D **Difteria**
La difteria es una enfermedad grave que suele comenzar con dolor de garganta y puede causar problemas respiratorios en muy poco tiempo. Puede dañar el corazón y el sistema nervioso y, en casos graves, puede causar la muerte.

IPV **Poliomielitis**
La poliomielitis es un virus que ataca el sistema nervioso y puede causar la parálisis permanente de los músculos. Puede ser mortal si afecta a los músculos del tórax o al cerebro.

La vacuna de refuerzo para adolescentes se llama Revaxis, puedes leer el prospecto de información al paciente en www.medicines.org.uk/emc/product/5581/pil

Si de niño me vacunaron contra el tétanos, la difteria y la poliomielitis, ¿sigo estando totalmente protegido?

No, seguirás necesitando una dosis de refuerzo para completar la protección que hayas recibido anteriormente.

¿Cuántas dosis de refuerzo necesito?

Necesitas un total de 5 dosis de vacunas contra el tétanos, la difteria y la poliomielitis para desarrollar y mantener tu inmunidad.

Deberías haber tenido:



las 3 primeras dosis
de bebé



dosis 4
cuando tenías entre 3 y 5 años,
este es el refuerzo preescolar



la dosis 5
debe administrarse en
el noveno curso escolar
(de 13 a 14 años)

¿Necesitaré más dosis de refuerzo en el futuro?

No es probable que necesites más dosis de refuerzo de estas vacunas. Sin embargo, es posible que necesites dosis adicionales de algunas vacunas si vas a visitar determinados países o si tienes una lesión, es posible que necesites otra inyección antitetánica. Consulta con la enfermera de tu centro de salud.

¿Cómo se me administrará la vacuna de refuerzo Td/IPV?

Te pondrán 1 inyección en la parte superior del brazo. A nadie le gustan las inyecciones, pero es algo muy rápido. Las agujas utilizadas son pequeñas y solo sentirás un pequeño pinchazo. Si te pone un poco nervioso ponerte la inyección, dáselo a la enfermera o al médico antes de ponértela.

¿Hay alguna otra vacuna que deba ponerme ahora?

Cuando recibas la vacuna de refuerzo Td/IPV también podrás recibir la vacuna MenACWY. Deberías recibirla antes de finalizar tus estudios. Si no la has recibido y todavía estás escolarizado habla con la enfermera de tu colegio. Si ya no estás escolarizado, debes ponerte en contacto con tu médico de cabecera para organizar la administración de las dosis pendientes. Es aconsejable comprobar en tu centro de salud que todas las demás vacunas están al día, incluidas las del VPH y la triple vírica (sarampión, paperas y rubéola).

Si nunca te han puesto la vacuna triple vírica, debes ponerte una dosis ahora y otra 1 mes más tarde para protegerte del sarampión, las paperas y la rubéola.

