

Sú nejaké vedľajšie účinky?

V mieste vpichu injekcie sa bežne vyskytuje opuch, začervenanie alebo citlivosť. Niekedy sa vytvorí malá nebolestivá hrčka, ktorá však zvyčajne do niekoľkých týždňov zmizne. Závažnejšie účinky sú zriedkavé, ale patria medzi ne horúčka, bolesť hlavy, závraty alebo pocit na omdlenie, pocit, že je človek chorý a opuchnuté žľazy.

Ak sa po očkovaní necítiš dobre, uži paracetamol. Pozorne si prečítaj pokyny na fľaši alebo obale a uži správnu dávku určenú pre tvoj vek. V prípade potreby uži druhú dávku 4 až 6 hodín po prvej dávke.

Ak budeš mať aj po druhej dávke vysokú teplotu, obráť sa na svojho praktického lekára alebo zavolaj na bezplatnú linku NHS 111.

Ak sa u teba vyskytnú akékoľvek podozrenia na vedľajšie účinky vakcíny, môžeš ich nahlásiť na webovej stránke Yellow Card, na telefónnom čísle 0800 731 6789 (od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00) alebo cez aplikáciu Yellow Card. www.mhra.gov.uk/yellowcard

Teraz je ten správny čas skontrolovať, či máš všetky potrebné očkovania.

Očkovanie pre mladých



Očkovania v rámci NHS



Ďalšie informácie o očkovaní dospelých nájdeš na stránke www.nhs.uk/vaccinations alebo na <https://qrco.de/YoungPeopleImms>



Ešte nie je neskoro dohnať vynechané dávky.

Tento leták vypracovala UK Health Security Agency (úrad pre zdravotnú bezpečnosť).

© Crown copyright 2023. 1P 100K JULY 2023 (APS). Product code: YP3BG1SL Slovak. UK Health Security Agency gateway number: 2023183.

Leták si môžeš objednať alebo stiahnuť zo stránky: www.healthpublications.gov.uk alebo telefonátom na číslo: 0300 123 1002 (linky sú otvorené od pondelka do piatku od 8:00 do 18:00).

Môžeš si objednať vytlačené kópie tohto letáku v angličtine.

Rovnako si môžeš objednať vytlačené kópie tohto letáku v preklade.



UK Health
Security
Agency

**Posilňovacia dávka očkovania
pre dospelých proti**

Td/IPV 3 v 1



Vo veku 14 rokov alebo počas 9. ročníka školy máš nárok na posilňovaciu dávku vakcíny 3 v 1 pre dospelých proti tetanu, záškrtu a detskej obrne. **Vakcína Td/IPV posilní imunitu tvojho tela voči týmto infekčným ochoreniam. Tá sa mohla od prvého očkovania znížiť.**

Pred čím ma toto očkovanie chráni?

T

Tetanus

Tetanus je bolestivé ochorenie postihujúce nervový systém, ktoré môže viesť k svalovým kŕčom, problémom s dýchaním a môže spôsobiť aj smrť. Vzniká, keď sa mikróby nachádzajúce sa v pôde a hnoji dostanú do tela cez otvorené rany alebo popáleniny. Tetanus sa neprenáša z človeka na človeka.

D

Záškrt

Záškrt je závažné ochorenie, ktoré sa zvyčajne začína bolesťou hrdla a môže rýchlo spôsobiť problémy s dýchaním. Môže poškodiť srdce a nervový systém a v závažných prípadoch môže spôsobiť aj smrť.

IPV

Detská obrna

Detská obrna je vírus, ktorý napáda nervový systém a môže spôsobiť trvalé ochrnutie svalov. Ak obrna postihne svaly hrudníka alebo mozog, môže spôsobiť smrť.

Posilňovacia vakcína pre dospelých sa nazýva Revaxis, informačný leták pre pacienta si môžeš prečítať na stránke www.medicines.org.uk/emc/product/5581/pil

Ak som bol/-a ako dieťa očkovaný/-á proti tetanu, záškrtu a detskej obrne, som pred nimi stále plne chránený/-á?

Nie, budeš potrebovať posilňovaciu dávku na doplnenie ochrany.

Koľko posilňovacích dávok budem potrebovať?

Na vytvorenie a udržanie imunity je potrebných celkovo 5 dávok vakcíny proti tetanu, záškrtu a detskej obrne.

Mal/-a si mať:



prvé 3 dávky
ako bábätko



4. dávku
vo veku od 3 do 5 rokov,
je to posilňovacia dávka
v predškolskom veku



5. dávka
sa má podať v 9. ročníku
(vo veku 13 až 14 rokov)

Budem v budúcnosti potrebovať ďalšie posilňovacie dávky?

Ďalšie posilňovacie dávky týchto očkovaní pravdepodobne nebudeš potrebovať. Môže sa však stať, že budeš potrebovať ďalšie dávky niektorých očkovaní pri cestách do niektorých krajín alebo ďalšiu injekciu proti tetanu v prípade úrazu. Informuj sa u zdravotnej sestry v ambulancii svojho všeobecného lekára.

Ako sa bude podávať posilňovacia dávka očkovania proti Td/IPV?

Dostaneš jednu injekciu do hornej časti paže. Nikto nemá rád injekcie, ale je to veľmi rýchle. Používajú sa malé ihly a mal/-a by si cítiť len malé pichnutie. Ak máš z injekcie trochu stres, povedz to zdravotnej sestre alebo lekárovi ešte pred jej podaním.

Musím teraz absolvovať nejaké ďalšie očkovania?

Pri podávaní očkovania Td/IPV budeš mať nárok aj na očkovanie MenACWY. Toto očkovanie by si mal/-a dostať predtým, než skončíš školu. Ak si ho vynechal/-a a stále chodíš do školy, obráť sa na školskú zdravotnú sestru. Ak si ukončil/-a školskú dochádzku, musíš sa obrátiť na svojho všeobecného lekára a dohodnúť sa na dobehnutí očkovania. Je dobré skontrolovať si u svojho všeobecného lekára, či máš v poriadku aj všetky ostatné očkovania vrátane HPV a MMR (osýpky, mumps a rubeola).

Ak ešte nemáš očkovanie proti MMR, mal/-a by si dostať jednu dávku teraz a druhú o mesiac neskôr. Ochráni ťa to pred osýpkami, mumpsom a rubeolou.

