

Ar yra kokių nors šalutinių poveikių?

Injekcijos vietoje dažnai atsiranda patinimas, paraudimas ar jautrumas. Kartais susiformuoja nedidelis neskausmingas gumbelis, tačiau jis paprastai išnyksta per kelias savaites. Sunkesni reiškiniai pasitaiko retai, bet apima karščiavimą, galvos skausmą, galvos svaigimą ar alpimą, pykinimą ir liaukų patinimą.


Jei po skiepo pasijutote blogai, išgerkite paracetamolio. Atidžiai perskaitykite ant buteliuko ar pakuotės esančias instrukcijas ir vartokite tinkamą dozę pagal savo amžių. Jei reikia, po 4-6 valandų išgerkite antrą dozę.

Jei po antrosios dozės temperatūra išlieka aukšta, kreipkitės į savo šeimos gydytoją arba skambinkite nemokama NHS pagalbos linija 111.

Jei pastebėjote bet kokį įtariamą vakcinos šalutinį poveikį, apie jį galite pranešti Yellow Card svetainėje arba paskambinę telefonu 0800 731 6789 (nuo pirmadienio iki penktadienio 9-17 val.) arba atsisiuntę Yellow Card programėlę. www.mhra.gov.uk/yellowcard

Dabar tinkamas laikas patikrinti, ar esate gavę visus skiepus

Jaunuolių
imunizacija



NHS
skiepai



Daugiau informacijos apie paauglių skiepus rasite apsilankę www.nhs.uk/vaccinations arba perskaitę <https://qrco.de/YoungPeopleImms>



Dar nevėlu gauti dozes, kurias galbūt praleidote.

Šį lankstinuką parengė JK Sveikatos apsaugos agentūra.

© Crown copyright 2023. 1P 100K JULY 2023 (APS). Product code: YP3BG1LIT Lithuanian. UK Health Security Agency gateway number: 2023175.

Lankstinuką galima užsisakyti arba atsisiųsti iš: www.healthpublications.gov.uk, skambinant: 0300 123 1002 (linijos veikia nuo 8 iki 18 val. nuo pirmadienio iki penktadienio).

Galima užsisakyti popierines šio lankstinuko kopijas anglų kalba.

Taip pat galima užsisakyti šio lankstinuko vertimus.



UK Health
Security
Agency

Td/IPV „trys viename“
sustiprinamoji dozė
paaugliams



Sulaukę 14 metų arba 9 klasėje jūs galite gauti sustiprinamąją „trys viename“ vakcinos dozę paaugliams, kuri apsaugo nuo stabligės, difterijos ir poliomieliito. **Td/IPV vakcina sustiprins jūsų organizmo imunitetą šioms infekcinėms ligoms, kuris gali sumažėti jums augant.**

Nuo ko mane apsaugo ši vakcina?

T

Stabligė

Stabligė yra skausminga nervų sistemos liga, galinti sukelti raumenų spazmus, kvėpavimo sutrikimus ir mirtį. Ji atsiranda, kai per atvirus įpjovimus ar nudegimus į organizmą patenka dirvožemyje ir mėšle randamų mikrobu. Užsikrėsti stablige nuo kito žmogaus negalima.

D

Difterija

Difterija yra rimta liga, kuri paprastai prasideda gerklės skausmu ir gali greitai sukelti kvėpavimo sutrikimus. Ji gali pažeisti širdį ir nervų sistemą, o sunkiais atvejais – ir baigtis mirtimi.

IPV

Poliomielitas

Poliomielitas yra virusas, kuris puola nervų sistemą ir gali sukelti nuolatinį raumenų paralyžių.

Poliomielitas veikia krūtinės raumenis ar smegenis, todėl gali sukelti net mirtį.

Paauglių sustiprinamoji vakcina vadinama „Revaxis“. Apie ją galite perskaityti paciento informaciniame lapelyje, kurį rasite www.medicines.org.uk/emc/product/5581/pil

Jei vaikystėje buvau skiepytas (-a) nuo stabligės, difterijos ir poliomieliito, ar vis dar esu pilnai apsaugotas (-a)?

Ne. Jums vis tiek reikės sustiprinamosios dozės, kad papildytumėte anksčiau gautą apsaugą.

Kiek sustiprinamųjų dozių man reikia?

Norint sukurti ir išlaikyti imunitetą, iš viso reikia 5 stabligės, difterijos ir poliomieliito vakcinų dozių.

Turėjote gauti:



pirmąsias 3 dozes
kūdikystėje



4 dozė,
kai jums buvo nuo 3 iki 5 metų; tai yra sustiprinamoji priešmokyklinė dozė



5 dozė
turi būti suleista 9 klasėje (13-14 metų amžiaus)

Ar ateityje reikės daugiau sustiprinamųjų dozių?

Jums tikriausiai nereikės papildomų šių vakcinų sustiprinamųjų dozių. Tačiau jums gali prireikti papildomų kai kurių vakcinų dozių, jei lankysitės tam tikrose šalyse, o jei susižeisite, jums gali prireikti dar vieno skiepo nuo stabligės. Pasitarkite su savo bendrosios praktikos klinikos slaugytoju (-a).

Kaip man bus suleista Td/IPV sustiprinamoji dozė?

Jums bus suleista 1 injekcija į žastą. Injekcijos niekam nepatinka, bet visas atliekama labai greitai. Adatos yra mažos, todėl turėtumėte pajusti tik nedidelį dūrį. Jei šiek tiek nerimaujate dėl injekcijos, pasakykite apie tai slaugytojui (-ai) arba gydytojui (-ai).

Ar yra kitų vakcinų, kuriomis turėčiau pasiskiepyti dabar?

Pasiskiepijus Td/IPV sustiprinamąja doze, taip pat galėsite skiepytis MenACWY vakcina. Turėtumėte ją pasiskiepyti prieš baigiant mokyklą. Pasikalbėkite su mokyklos slaugytoju (-a), jei praleidote šį skiepą ir vis dar mokotės mokykloje. Jei baigėte mokyklą, turėtumėte susisiekti su savo bendrosios praktikos gydytoju (-a), kad susitartumėte, kaip pasiskiepyti. Pravartu susisiekti su savo bendrosios praktikos klinika ir patikrinti, ar esate gavę visas reikalingas skiepų dozes, įskaitant ŽPV ir MMR (tymų, kiaulytės ir raudonukės).

Jei niekada nebuvote skiepyti MMR vakcina, turėtumėte gauti vieną dozę dabar, o kitą - po 1 mėnesio, kad būtumėte apsaugoti nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės.

