

Czy są jakieś skutki uboczne?

W miejscu wstrzyknięcia często występuje obrzęk, zaczerwienienie lub bolesność. Czasami rozwija się mały, bezbolesny guzek, który zwykle znika w ciągu kilku tygodni. Poważniejsze skutki uboczne są rzadkie, mogą obejmować gorączkę, ból głowy, zawroty głowy lub uczucie omdlenia, nudności i obrzęk węzłów chłonnych.


Jeśli po szczepieniu źle się poczujesz, zażyj paracetamol. Przeczytaj uważnie instrukcje na butelce lub opakowaniu i weź odpowiednią dawkę dla swojego wieku. W razie potrzeby drugą dawkę należy przyjąć 4 do 6 godzin później.

Jeśli po drugiej dawce temperatura nadal jest wysoka, porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym lub zadzwoń na bezpłatną infolinię NHS 111.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek skutki uboczne szczepionki, można je zgłosić na stronie internetowej poświęconej żółtej karcie lub dzwoniąc pod numer 0800 731 6789 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00) lub pobierając aplikację Yellow Card. www.mhra.gov.uk/yellowcard

**Teraz jest odpowiedni czas,
aby sprawdzić, czy masz aktualne
wszystkie szczepienia**

Szczepienia dla młodzieży



Szczepienia NHS



Aby uzyskać więcej informacji na temat
szczepień nastolatków, odwiedź stronę
www.nhs.uk/vaccinations lub przeczytaj
<https://qrco.de/YoungPeopleImms>



**Nie jest za późno, aby nadrobić
dawki, które mogłeś przegapić.**

Niniejsza ulotka została wydana przez brytyjską Agencję ds. Bezpieczeństwa Zdrowia.

© Crown copyright 2023. 1P 100K JULY 2023 (APS). Product code: YP3BG1PO Polish. UK Health Security Agency gateway number: 2023179.

Ulotkę można zamówić lub pobrać z:

www.healthpublications.gov.uk, dzwoniąc pod numer: 0300 123 1002 (linie są czynne od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku).

Papierowe kopie tej ulotki w języku angielskim są dostępne na zamówienie.

Przetłumaczone wersje tej ulotki są również dostępne na zamówienie.



UK Health
Security
Agency

**Szczepionka
przypominająca
szczepienie
3 dawki w 1 dla nastolatków**

Td/IPV



W wieku 14 lat lub w 9 klasie szkoły,
kwalifikujesz się do szczepionki przypominającej:
3 dawki w 1 szczepionce przypominającej
dla nastolatków, która zapobiega tężcowi,
błonicy i polio. **Szczepionka Td/IPV zwiększy
odporność organizmu na te choroby zakaźne,
która mogła się zmniejszyć wraz z wiekiem.**

Przed czym chroni mnie ta szczepionka?

T

Tężec

Tężec to bolesna choroba atakująca układ nerwowy, która może powodować skurcze mięśni, powodować problemy z oddychaniem i może doprowadzić do śmierci. Choroba powstaje, gdy zarazki znajdujące się w glebie i oborniku dostają się do organizmu przez otwarte skaleczenia lub oparzenia. Chorobą tężca nie można zarazić się poprzez przenoszenie choroby z człowieka na człowieka.

B

Błonica

Błonica jest poważną chorobą, która zwykle zaczyna się od bólu gardła i może szybko spowodować problemy z oddychaniem. Może uszkodzić serce i układ nerwowy, a w ciężkich przypadkach może nawet prowadzić do śmierci.

IPV

Polio (Paraliż mięśni)

Polio to wirus atakujący układ nerwowy, który może powodować trwałe paraliż mięśni. Jeśli zaatakuje mięśnie klatki piersiowej lub mózg, polio może doprowadzić do śmierci.

Szczepionka przypominająca dla nastolatków nosi nazwę Revaxis. Z ulotką dla pacjenta można zapoznać się na stronie www.medicines.org.uk/emc/product/5581/pil

Jeśli jako dziecko byłem szczepiony przeciwko tężcowi, błonicy i polio, czy nadal jestem w pełni chroniony?

Nie, nadal będziesz potrzebować dawki przypominającej, aby uzupełnić ochronę, którą otrzymałeś jako dziecko.

Ile dawek przypominających muszę otrzymać?

Potrzebujesz łącznie 5 dawek szczepionki przeciwko tężcowi, błonicy i polio, aby zbudować i utrzymać swoją odporność.

Powinieneś być otrzymać:



pierwsze 3 dawki
jako niemowlę



dawka 4
kiedy miałeś od 3 do 5 lat, przedszkolna dawka przypominająca



dawka 5
podawana jest w 9 klasie (w wieku od 13 do 14 lat)

Czy będę potrzebować więcej dawek przypominających w przyszłości?

Prawdopodobnie nie będziesz potrzebować kolejnych dawek przypominających tych szczepionek. Jednak możesz potrzebować dodatkowych dawek niektórych szczepionek, jeśli odwiedzasz niektóre kraje lub jeśli doszło do zranienia, możesz potrzebować kolejnego zastrzyku przeciw tężcowi. Skontaktuj się ze swoją pielęgniarką w przychodni lekarza pierwszego kontaktu.

W jaki sposób otrzymam dawkę przypominającą Td/IPV?

Otrzymasz 1 zastrzyk w ramię. Nikt nie lubi zastrzyków, ale są one bardzo szybkie. Używane igły są małe co spowoduje odczucie nieznacznego ukłucia. Jeśli jesteś trochę zdenerwowany przed wykonaniem zastrzyku, powiedz o tym pielęgniarce lub lekarzowi.

Czy są jakieś inne szczepienia, które muszę teraz przyjąć?

Kiedy otrzymasz dawkę przypominającą Td/IPV, będziesz również uprawniony do otrzymania szczepionki MenACWY. Powinieneś ją otrzymać przed opuszczeniem szkoły. Porozmawiaj ze swoją pielęgniarką szkolną, jeśli ją przegapiłeś, ale nadal chodzisz do szkoły. Jeśli ukończyłeś szkołę, powinieneś skontaktować się z przychodnią lekarską, aby umówić się na zaległe szczepienie. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie w przychodni lekarskiej czy wszystkie inne szczepienia, w tym HPV i MMR (odra, świnka i różyczka), są aktualne.

Jeśli nigdy nie otrzymałeś szczepionki MMR, powinieneś przyjąć jedną dawkę teraz i kolejną 1 miesiąc później, aby chronić się przed odra, świnką i różyczką.

