

Există efecte secundare?

Este normal să apară anumite reacții de umflare, înroșire sau sensibilitate la locul de administrare a injecției. Uneori se dezvoltă un mic nodul nedureros, dar acesta dispare de obicei în câteva săptămâni. Efectele mai grave sunt rare, dar printre acestea se numără: febră, dureri de cap, amețeli sau senzație de leșin, senzație de rău și inflamarea glandelor.

Dacă te simți rău după imunizare, poți lua paracetamol. Citește cu atenție instrucțiunile de pe flacon sau pachet și ia doza corectă pentru vârsta ta. Dacă este necesar, ia o a doua doză la 4-6 ore.

Dacă ai temperatura ridicată și după a doua doză, discută cu medicul de familie sau sună la linia de asistență gratuită a serviciului NHS 111.

Dacă suspectezi că ai reacții adverse la vaccin, le poți raporta pe site-ul web Yellow Card sau sunând la 0800 731 6789 (9:00 - 17:00 de luni până vineri) sau descărcând aplicația Yellow Card. www.mhra.gov.uk/yellowcard

Acum este un moment bun pentru a verifica dacă ești la zi cu toate imunizările

Imunizări pentru tineri



Vaccinări NHS



Pentru mai multe informații despre vaccinarea adolescenților vizitează www.nhs.uk/vaccinations sau citește <https://qrco.de/YoungPeopleImms>



Nu este prea târziu să recuperezi dozele pe care este posibil să le fi omis.

Acest pliant a fost realizat de Agenția pentru Securitatea Sănătății din Regatul Unit (UK Health Security Agency).

© Crown copyright 2023. 1P 100K JULY 2023 (APS). Product code: YP3BG1RO Romanian. UK Health Security Agency gateway number: 2023180.

Pliantul poate fi comandat sau descărcat de la: www.healthpublications.gov.uk, sunând la: 0300 123 1002 (liniile sunt deschise de la 8:00 la 18:00, de luni până vineri).

Copii pe hârtie ale acestui pliant în limba engleză sunt disponibile la comandă. Versiunile traduse ale acestui pliant sunt, de asemenea, disponibile la comandă.



UK Health
Security
Agency

**Rapelul Td/IPV
pentru adolescenți
3 în 1**



La 14 ani sau în timpul anului 9 de școală devii eligibil pentru doza de rapel 3 în 1 pentru adolescenți a vaccinului care previne tetanosul, difteria și poliomielita. **Vaccinul Td/IPV îți va spori imunitatea organismului la aceste boli infecțioase, care este posibil să fi scăzut pe măsură ce ai crescut.**

Care sunt afecțiunile de care mă protejează acest vaccin?

T **Tetanos**
Tetanusul este o boală dureroasă care afectează sistemul nervos și care poate duce la spasme musculare, probleme de respirație și chiar deces. Este o boală cauzată atunci când germenii din sol și dejecții animale intră în organism prin tăieturi deschise sau arsuri. Tetanusul nu poate fi transmis de la o persoană la alta.

D **Difterie**
Difteria este o boală gravă care debutează de obicei cu o durere în gât și poate provoca rapid probleme de respirație. Poate afecta inima și sistemul nervos și, în cazuri severe, poate duce la deces.

IPV **Poliomielită**
Poliomielita este un virus care atacă sistemul nervos și poate provoca paralizia permanentă a mușchilor. Dacă afectează mușchii pieptului sau creierul, poliomielita poate duce la deces.

Vaccinul de rapel pentru adolescenți se numește Revaxis. Poți citi prospectul cu informații pentru pacient la adresa www.medicines.org.uk/emc/product/5581/pil

Dacă am fost imunizat împotriva tetanosului, difteriei și poliomielitei în copilărie, mai sunt încă pe deplin protejat?

Nu, vei avea de un rapel pentru a întări protecția pe care ai primit-o anterior.

Câte rapeluri trebuie să fac?

Ai nevoie de 5 doze de vaccinuri împotriva tetanosului, difteriei și poliomielitei pentru a-ți consolida și a-ți menține imunitatea.

Ar trebui să fi făcut deja:



primele 3 doze
la vârsta de bebeluș



doza 4
când aveai între 3 și 5 ani,
acesta este rapelul preșcolar



doza 5
este necesară în anul 9
(la vârsta cuprinsă între
13 și 14 ani)

Voi avea nevoie de mai multe rapeluri în viitor?

Probabil că nu vei avea nevoie de alte rapeluri ale acestor vaccinuri. Cu toate acestea, este posibil să ai nevoie de doze suplimentare pentru unele vaccinuri dacă vizitezi anumite țări sau dacă suferi o leziune, este posibil să ai nevoie de o altă injecție împotriva tetanosului. Consultă asistentul medical de la cabinetul medicului tău de familie.

Cum mi se va administra rapelul Td/IPV?

Vei primi o injecție în partea superioară a brațului. Nimănui nu-i plac injecțiile, dar procedura este una foarte rapidă. Acele folosite sunt mici și în mod normal vei simți doar o mică înțepătură. Dacă ai emoții în legătură cu injecția, comunică-i acest aspect asistentei sau medicului înainte.

Mai sunt și alte imunizări pe care trebuie să le fac?

Când vei face rapelul Td/IPV, vei fi, de asemenea, eligibil pentru vaccinul MenACWY. Va trebui să faci acest vaccin înainte de a termina școala. Vorbește cu asistentul medical de la școală dacă ai omis vaccinul și încă mai ești la școală. Dacă ai terminat școala, va trebui să contactezi medicul de familie pentru a programa o recuperare. Este bine să verifici la cabinetul medicului de familie dacă toate celelalte imunizări sunt la zi, inclusiv HPV și MMR (ROR - rujeolă, oreion și rubeolă).

Dacă nu ai făcut niciodată vaccinul MMR, trebuie să faci o doză acum și încă una la o lună mai târziu pentru a te proteja de rujeolă, oreion și rubeolă.

