

MEASLES

لا تدعها تصيب طفلك

MMR

قوم بتحصينهم بـ لقاح

- إذا كان من المقرر أن طفلك يتلقى جرعتين من MMR ولكن لم يتناولهما بعد، بغض النظر عن العمر، يجب عليك الاتصال بطبيبك للحصول على تطعيم في أقرب وقت ممكن.*
- إذا كنت لا تستطيع تذكر ما إذا كان طفلك قد تلقى أي جرعة أو اخذ جرعة واحدة أو جرعتين من تطعيم MMR، فتحقق من سجل صحة الطفل الشخصي (الدفتر الأحمر). إذا لم يساعد ذلك، فتحدث إلى طبيبك.
- إذا كنت لا تعرف عدد الجرعات التي قد تلقيها طفلك، فمن الأفضل إعطائهم جرعتين من لقاح MMR الآن بدلاً من المخاطرة بتركهم دون حماية.
- الحصبة في الأخبار مرة أخرى. كانت هناك تفشيات خطيرة في ويلز وإنجلترا وعدد الأطفال المصابين بالحصبة في ارتفاع. يمكن أن تكون الحصبة مرضًا خطيرًا جدًا، مما يؤدي إلى التهاب الأذن والصدر، وتشنجات، وإسهال، وتلف للمخ. يمكن للحصبة أن تقتل.
- يكون طفلك معرضًا لخطر الحصبة إذا لم يكن قد تلقى لقاح MMR.
- هناك حاجة إلى جرعتين من لقاح MMR للحصول على أفضل حماية.

*استجابة لنفسي المرض المحلي، يمكن إعطاء الجرعتين وبينما يفصل بينهما شهراً واحداً منذ عمر 18 شهراً.

بعض الأسئلة الشائعة حول الحصبة ولقاح MMR
مدرجة على ظهر هذه النشرة

immunisation

الطريقة الأسلم لحماية طفلك

إجابات لبعض الأسئلة الشائعة حول الحصبة ولقاح MMR

هل سيكون هناك أي آثار جانبية للتطعيم؟

قد يصاب طفلك بأعراض الحصبة والnakaf وال Hutchinson's rash، لمدة تصل إلى ستة أيام بعد التطعيم ولكن بشكل أخف. هذا يثبت أن اللقاح ي العمل وأن طفلك يبني مقاومة للاتصال في المستقبل مع الفيروسات التي تسبب الأمراض الثلاثة. لا يظهر جميع الأطفال هذه الأعراض ولكن هذا لا يعني أن اللقاح لا يعمل.

هل يجب تحسين الآباء والأمهات في مناطق تفشي المرض ضد الحصبة؟

كما هو الحال مع العديد من الأمراض، بمجرد إصابةك بالحصبة، فإنك لا تصاب بها مرة أخرى لأنك قد اكتسبت مقاومة طبيعية لها. لذا، إذا كان لديك حصبة أو تلقيت جرعتين من لقاح MMR، فلن تحتاج إلى تحسين الأن.

لماذا نرى تفشي الحصبة؟

الحصبة مرض شديد العدوى، ينتشر بسرعة من شخص لآخر، وخاصة في المدارس. إن الطفل المصابة بالحصبة سوف يصيب جميع الأطفال غير المصنعين تقريباً الذين لديهم اتصال معهم. منذ نهاية عام 2017، كانت هناك زيادة في الحصبة على مستوى العالم مما أثر على المملكة المتحدة. وقد نتج عن هذا انتشار في بعض المجتمعات الأوسع، وخاصة في المجموعات التي لم تحسن بشكل كافٍ.

متى يتم إعطاء لقاحات MMR عادة؟

تتراوح أفضل الأوقات بين 12 و 13 شهراً ومرة أخرى عند تلات سنوات أربع سنوات، جرعة واحدة في كل مناسبة. ولكن، إذا لم يتم تطعيم طفلك حتى الآن، فيمكن أن يتم تطعيمه في أي عمر بجرعتين كل شهر.

لمزيد من المعلومات حول الحصبة و MMR، اذهب إلى
[/www.nhs.uk/conditions/measles](http://www.nhs.uk/conditions/measles)



معلومات التحسين

This is an Arabic translation of the measles dont let your child catch it – English version. There are also versions in Afrikaans, Bengali, Cantonese, simplified Chinese, French, German, Hebrew, Hindi, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Swahili, Tagalog, Tamil, Turkish, Ukrainian and Urdu. If you would like more copies of this leaflet or any other immunisation publications please visit www.healthpublications.gov.uk or call 0300 123 1002