

MEASLES

اپنے بچے کو یہ لگنے نہ دیجیئے
- انہیں ایم ایم آر ویکسین دیجیئے

- اگر آپ کے بچے کا ایم ایم آر کے دو ٹوز لینے کا وقت ہو چکا ہے لیکن تاحال اسے نہیں دیا گیا ہو، تو اس کی عمر کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اپنے جی پی سے رابطہ کر لینا چاہئے تاکہ اسے جلد سے جلد ویکسین دیا جائے۔*
- اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ آپ کے بچے نے ایم ایم آر ویکسین کا کوئی بھی ٹوز لیا ہے یا ایک یا دو ٹوز لئے ہیں، تو اپنے بچے یا بچی کا پرسنل چائلڈ ریکارڈ (سرخ کتاب) دیکھ لیجئے۔ اگر اس سے کام نہیں بنا تو پھر آپ اپنے جی پی سے بھی بات کر لیں
- اگر آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آپ کے بچے نے کتنے ٹوز لئے ہیں، تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ آپ اسے ایم ایم آر ویکسین کے دو ٹوز دے دیں، بجائے اس کے کہ اسے عدم حفاظت کا خطرہ لاحق ہو۔
- خسرے کے بارے میں پھر سے خبریں آرہی ہیں۔ ویلز اور انگلینڈ میں یہ شدت کیساتھ پھیل رہا ہے اور جن بچوں کو خسرہ لگ رہا ہے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔
- اس بات کا امکان ہے کہ خسرہ ایک شدید مرض بن جائے جس کے نتیجے میں کان او سینے کی انفیکشن، دورے، ڈائریا او دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خسرہ کیوجہ سے موت واقع ہوسکتی ہے۔
- اگر آپ نے اپنے بچے کو ایم ایم آر ویکسین نہیں دیا ہے تو اسے خطرہ لاحق ہے۔
- بہترین حفاظت کیلئے ایم ایم آر ویکسین کے دو ٹوز ضروری ہیں۔

* مقامی طور پر پھیلاؤ سے نمٹنے کیلئے 18 ماہ کی عمر کے علاوہ دو ٹوز دئے جاسکتے ہیں۔

خسرے اور ایم ایم آر ویکسین سے متعلق چند عام سوالات اس لیفلٹ کی پشت پر درج کئے گئے ہیں۔

i mmunisation

آپ کے بچے کی حفاظت کا محفوظ ترین طریقہ

خسرے اور ایم ایم آر ویکسین سے متعلق چند عام سوالات کے جوابات

کیا ویکسینیشن کے کوئی سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں؟

ویکسینیشن کے بعد چھ ہفتوں تک آپ کے بچے پر خسرے، ممپس اور روپیلا کے علامات نمودار ہوسکتے ہیں مگر بہت ہی ملایم شکل میں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ویکسین کام کر رہا ہے اور مستقبل میں ان تینوں بیماریوں سے مقابلہ کرنے کیلئے آپ کے بچے کی مدافعت بڑھ رہی ہے۔ تمام بچوں میں ایسے علامات نمودار نہیں ہوتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ویکسین کام نہیں کر رہا ہے۔

کیا پھیلاؤ والے علاقوں میں والدین کو بھی ویکسین دیا جانا چاہئے؟

دیگر کئی بیماریوں کی طرح خسرہ بھی اگر ایک بار آپ کو لگ جائے تو پھر دوبارہ یہ آپ کو نہیں ہوگا کیونکہ آپ میں قدرتی طور پر اس کے خلاف مدافعت پیدا ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک بار خسرہ لگ چکا ہو یا یہ کہ آپ نے ایم ایم آر ویکسین کے دو ڈوز لے لئے ہوں تو اب پھر آپ کو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے۔

خسرے کے پھیلاؤ سے ہمیں کیوں واسطہ پڑتا ہے؟

خسرہ انتہائی تیزی کیساتھ پھیلنے والی ایسی بیماری ہے جو فوراً ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتی ہے، خاص طور پر سکولوں میں۔ جس بچے کو خسرہ لگ چکا ہو اس سے ان تمام غیر محفوظ بچوں کو لگ جائے گا جن کا اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ 2017 کے اختتام سے پوری دنیا میں خسرہ بڑھ رہا ہے جس سے برطانیہ بھی متاثر ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بعض وسیع تر گروہوں میں پھیل گیا، خاص طور پر ان میں جن کی پوری ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے۔

ایم ایم آر ویکسینیشن عام طور پر کس وقت ہوتی ہے؟

12 اور 13 سال کی عمر اور پھر تین سال اور چار ماہ کی عمر بہترین اوقات ہیں، ان تمام مواقع پر ایک ایک ڈوز دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے بچے کو ویکسین نہیں دیا گیا ہو تو پھر اسے کسی بھی عمر میں ایک ماہ کے وقفے کیساتھ ویکسین کے دو ڈوز دئے جاسکتے ہیں۔

خسرے او ایم ایم آر سے متعلق مزید معلومات کیلئے ملاحظہ کریں
www.nhs.uk/conditions/measles



ایمونیٹائزیشن کی معلومات

This is an Urdu translation of the measles don't let your child catch it - English version. There are also versions in Afrikaans, Arabic, Bengali, Cantonese, simplified Chinese, French, German, Hebrew, Hindi, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Romani, Romanian, Spanish, Swahili, Tagalog, Tamil, Turkish and Ukrainian. If you would like more copies of this leaflet or any other immunisation publications please visit www.healthpublications.gov.uk or call 0300 123 1002