

MEASLES

Proteggete vostro figlio dal morbillo

– scegliete il vaccino MPR

- Il morbillo fa di nuovo notizia. Sono stati individuati pericolosi focolai in Galles e Inghilterra e il numero di bambini che contraggono il morbillo sta aumentando.
- Il morbillo può essere una malattia molto grave, che porta a otite, infezioni respiratorie, convulsioni, diarrea e danni cerebrali. Il morbillo può essere mortale.
- Vostro figlio rischia di contrarre il morbillo se non ha ricevuto il vaccino MPR.
- Sono necessarie due dosi di vaccino MPR per ottenere la migliore protezione.
- Se vostro figlio è candidato a ricevere due dosi di vaccino MPR ma non le ha ancora ricevute, indipendentemente dalla sua età, vi invitiamo a contattare il vostro medico di base per fare in modo che riceva il vaccino il prima possibile.*
- Se non ricordate se vostro figlio ha ricevuto una, due o nessuna dose di vaccino MPR, controllate il libretto vaccinale del bambino (noto come Red Book nel Regno Unito). Se questo non aiuta, rivolgetevi al vostro medico di base.
- Se non sapete quante dosi di vaccino ha ricevuto vostro figlio, è meglio somministrargli immediatamente due dosi di vaccino MPR, anziché rischiare di lasciarlo scoperto.

*In risposta a un focolaio locale, le due dosi possono essere somministrate a un mese di distanza dal 18mo mese di età.



Risposte ad alcune domande frequenti sul morbillo e sul vaccino MPR

Perché stiamo assistendo alla comparsa di questi focolai di morbillo?

Il morbillo è una malattia altamente infettiva, che si trasmette rapidamente da una persona all'altra, soprattutto nelle scuole. Un bambino affetto da morbillo infetterà tutti i bambini non protetti con cui entrerà in contatto. Dalla fine del 2017 è cresciuto il numero di casi di morbillo a livello globale e questo fenomeno ha interessato anche il Regno Unito. Ciò ha provocato una certa diffusione nelle comunità più ampie, soprattutto nei gruppi non vaccinati.

Quando vengono somministrati generalmente i vaccini MPR?

Il momento migliore per la somministrazione del vaccino è dai 12 ai 13 mesi di età e poi di nuovo a tre anni e quattro mesi, con una dose ogni volta. Tuttavia, se vostro figlio non è stato vaccinato in questi momenti specifici, può ricevere il vaccino a qualsiasi età, con due dosi somministrate a un mese di distanza l'una dall'altra.

Possono manifestarsi effetti collaterali associati alla vaccinazione?

Vostro figlio può manifestare i sintomi di morbillo, parotite e rosolia fino a sei settimane dopo la vaccinazione, seppure in forma molto più lieve. Questo prova che il vaccino sta funzionando e che il vostro bambino sta sviluppando una resistenza al contatto futuro con i virus che causano queste tre malattie. Non tutti i bambini manifestano questi sintomi, ma ciò non vuol dire che il vaccino non stia funzionando.

È consigliabile per i genitori che vivono nelle aree interessate dai focolai vaccinarsi contro il morbillo?

Come accade per molte malattie, le persone che hanno già avuto il morbillo non possono contrarlo di nuovo poiché hanno sviluppato una resistenza naturale alla malattia. Pertanto, le persone che hanno avuto il morbillo o hanno ricevuto due dosi di vaccino MPR non devono vaccinarsi di nuovo.

Per ottenere maggiori informazioni sul morbillo e sul vaccino MPR, visitare la pagina www.nhs.uk/conditions/measles/