

MEASLES

אל תתנו לילדכם להידבק במחלה

חסנו אותם בחיסון ה-MMR

- אם ילדכם היו אמורים לקבל שתי מנות MMR אך טרם קיבלו אותן, לא משנה מהו גילם, עליכם ליצור קשר עם רופא המשפחה על מנת לחסנם בהקדם האפשרי.*
- אם אינכם זוכרים אם ילדכם קיבלו חיסון MMR, או אם אינכם זוכרים אם ילדכם קיבלו מנת חיסון אחת או שתיים, בדקו את רשומת הבריאות האישית שלהם (הספר האדום). אם זה לא הועיל, דברו עם רופא המשפחה שלכם.
- אם לא ידוע לכם כמה מנות ילדכם קיבלו, עדיף שיקבלו עכשיו שתי מנות של חיסון MMR מאשר להסתכן ולהשאיר אותם ללא הגנה.
- מחלת החצבת שוב בחדשות. התפרצויות חמורות של המחלה אירעו בוויילס ובאנגליה ומספר הילדים הנדבקים במחלה נמצא בעלייה.
- חצבת עלולה להתפתח למחלה קשה מאוד, המובילה לדלקות באוזן ובחזה, התקפות, שלשול ופגיעה במוח. החצבת מסוגלת לגרום למוות.
- ילדכם נמצאים בסכנת הידבקות אם הם לא חוסנו ב MMR (חיסון נגד חצבת, אדמת, חזרת).
- להגנה הטובה ביותר דרושות שתי מנות של חיסון MMR.

* כתגובה להתפרצות מקומית בעבר ניתן לתת את שתי המנות בהפרש של חודש ביניהם מגיל 18 חודשים.

תשובות לכמה שאלות נפוצות בנושא חצבת וחסיון MMR

האם החיסונים מלווים בתופעות לוואי?

תסמינים של חצבת, חזרת ואדמת עשויים להופיע אצל ילדכם עד שישה שבועות לאחר החיסון, אך בצורה מתונה מאוד. זה מוכיח שהחיסון פועל וילדכם מפתחים עמידות בפני מגע עתידי עם הנגיפים הגורמים לשלוש מחלות אלו. לא אצל כל הילדים מופיעים תסמינים אלו, אך זה לא אומר שהחיסון לא פועל.

האם על הורים באזורי התפרצות המחלה להתחסן נגד חצבת?

כמו עם מחלות רבות, לאחר שחליתם בחצבת, אינכם נדבקים בה שוב מכיוון שפיתחתם עמידות טבעית נגדה. לכן, אם חליתם בחצבת או קיבלתם שתי מנות של חיסון MMR, אינכם צריכים להתחסן עכשיו.

מדוע אנו עדים להתפרצויות כאלו של חצבת?

חצבת היא מחלה מדבקת ביותר, המתפשטת במהירות מאדם לאדם, במיוחד בבתי ספר. ילד עם חצבת ידביק כמעט את כל הילדים הלא מוגנים שאיתם הוא בא במגע. מאז סוף 2017, חלה עלייה בחצבת בכל רחבי העולם שהשפיעה גם על בריטניה. זה הביא למספר מקרים שהתפשטו בין קהילות רחבות יותר, בפרט בקרב קבוצות לא מחוסנות.

מתי בדרך כלל ניתנים חיסוני MMR?

הזמנים הטובים ביותר לחיסוני MMR הם בין גילאי 12 ו-13 חודשים, ושוב בגיל שלוש וארבעה חודשים, מנה אחת בכל פעם. אך אם ילדכם לא חוסנו בגילאים אלו ניתן לחסנם בכל גיל עם שתי מנות בהפרש של חודש ביניהם.

למידע נוסף על חצבת ו- MMR היכנסו לאתר
www.nhs.uk/conditions/measles