

ویکسین کے ذریعے
میننچائس اور
سینیسیمیا
سے خود کو بچائیں



مجھے ویکسین لگوانے کی ضرورت کیوں ہے؟

نسبتاً بڑے ٹین ایجرز اور نوجوانوں کو مینجنجوکوکل عارضہ ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لہذا خود کو محفوظ بنانے کے لیے ابھی ویکسین لگوانا ضروری ہے۔ یہ ایک محفوظ اور بہت مؤثر ویکسین ہے جو 2015 سے معمولی کے ٹین ایج پروگرام کا حصہ رہی ہے۔ یہ آپ کے اردگرد موجود دیگر لوگوں میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ بھی کم کرتی ہے۔ پوسکتا ہے آپ کو شیرخواری یا بہت چھوٹی عمر میں MenC ویکسینیشن دی گئی ہو لیکن یہ آپ کو دیگر مینجنجوکوکل گروپس کے خلاف تحفظ نہیں دے گی۔

MenC ویکسین کے خلاف آپ کے تحفظ میں اضافہ کرے گی اور آپ کو تین دوسرے مینجنجوکوکل گروپس (A، W اور Z) کے خلاف محفوظ رکھنے میں مدد دے گی۔ یہ ویکسین آپ کو ہر قسم کے مینجنجوکوکل عارضے کے خلاف تحفظ نہیں دے گی، جیسے کہ MenB کے خلاف، لہذا نشانیوں اور علامات سے آگاہ رہنا پھر بھی اہم ہے۔

کیا مجھے MenACWY ویکسین لازماً لگوانی ہوگی؟

نہیں، لیکن خود کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ MenACWY ویکسین لگوانا ہی ہے۔ آپ، یا آپ کے والدین/سرپرست، کو ویکسین لگوانے کے لیے رمضانی کا اظہار کرنا ہوگا۔ آپ کو عموماً اسکول کے سال 9 میں ویکسین دی جائے گی جب آپ کی عمر 13-14 سال ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ویکسینیشن رہ گئی ہے تو فکر نہ کریں، اگر آپ ابھی بھی اسکول میں ہیں تو اپنی 25 ویں سالگرہ تک اپنے اسکول نرس یا اسکول کی مدافعت کاری ٹیم سے مفت MenACWY ویکسین لگوانے کے اپل ہیں۔ 3 MenACWY ویکسینز دستیاب ہیں، ان کے نام MenQuadfi، MenVeo Nimenrix اور MenQuadfi ہیں، آپ مریض کی معلومات کے کتابچے یہاں پڑھ سکتے ہیں:

medicines.org.uk/emc/product/12818/pil :MenQuadfi

medicines.org.uk/emc/product/4118/pil :Nimenrix

medicines.org.uk/emc/product/2939/pil :MenVeo

کیا ویکسین تکلیف کا باعث بنتی ہے؟

کسی کو بھی انجکشن لگانا پسند نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت تیز رفتاری سے لگ جاتا ہے۔ استعمال کردہ سوئیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور آپ کو بس معمولی سی چبھن محسوس ہوگی۔ اگر آپ انجکشن لگوانے کے حوالے سے تھوڑے نرس ہوں، تو انجکشن لگنے سے پہلے نرس یا ڈاکٹر کو بتا دیں۔

مینجوکوکل عارضہ

مینجوکوکل عارضہ شاذو نادر ہوتا ہے لیکن بہت سنگین ہے اور اسکے لیے اسپتال میں فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زندگی بدل دینے والی معذوریوں جیسے کہ عضو کو کاٹ کر علیحدہ کرنے، سماعت ختم ہونے، دماغ میں نقص واقع ہونے اور چلد پر گھرے نشانات کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ مینجوکوکل بیکٹیریا کے باعث پیدا ہوتا ہے جو کئی گروپس میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے عام A، B، C، W اور Z ہیں۔ شیر خوار بچ، چھوٹے بچے، ٹین ایجر اور نوجوانوں کو مینجوکوکل عارضہ کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔



مینجوکوکل بیکٹیریا مینجاٹس (دماغ کی جھلی کی سوزش) اور سپیٹیسیمیا (جب بیکٹیریا خون کی زبریت پیدا کرنے کے لیے خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں) کا سبب بن سکتے ہیں۔ دونوں امراض بہت سنگین ہیں اور موت کا سبب بن سکتے ہیں، خصوصاً اگر ابتدا میں ہی ان کی تشخیص نہ کی جائے۔

مینجاٹس اور سپیٹیسیمیا دونوں سپیسیس کو ابھار سکتے ہیں۔ سپیسیس ایک چھا جانے والا اور زندگی کے خطرہ بن جانے والا کسی بھی انفیکشن کے خلاف مدافعتی رد عمل ہے اور یہ ٹشوک نقص، اندرونی عضو کی مکمل خرابی اور موت کا باعث بن سکتا ہے۔

خواہ آپ کو ویکسین لگ چکی ہو پھر بھی مینجائز اور سیپیٹیسیمیا کی نشانیوں اور علامات کو جانتا اپنے کیونکہ ان عوارض کے دیگر بہت سے اسباب ہیں۔

چمکدار روشنی اچھی نہ لگنا

تیز رفتار سانس

ق/دست

پیٹ میں مروڑ

زرد داغ دار چلد

* ریش/خراش زدہ ریشز

جوڑوں یا عضلات میں درد

در علامات سے آگاہ رہیں

ان میں سے کوئی ایک یا زیادہ علامات پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ کسی بھی ترتیب میں ظاہر ہو سکتی ہیں اور دو امراض کے درمیان خلط ملٹ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے کسی دوست میں تشویشناک علامات یا ایسا عارضہ پیدا ہو جو تیزی سے بگڑ رہا ہو تو فوراً طبی مشورہ حاصل کرنا ضروری ہے۔

نشانیوں اور علامات

ابتدا میں مینجوکوکل کا عارضہ بگڑے ہوئے نزلہ زکام کی طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس مرض سے متاثر فرد عموماً چند ہی گھنٹوں میں شدید بیمار ہو جائے گا۔ فوری علاج آپ کی زندگی بچا سکتا ہے لہذا چند بنیادی نشانیوں اور علامات سے آگاہ رہنا سمجھداری کا تقاضہ ہے۔

شدید سر درد

جکڑی ہوئی گردن

بلند درجہ حرارت

دورے/چکرا کر گرنا

غنوڈگی یا نیند سے جاگنے میں مشکل

ذہنی الجھن اور/یا چینی

ٹھنڈے باتھ اور پاؤں

مینجاٹس اور سیپیسیسیمیا کی نشانیوں اور علامات کی مکمل تفصیل تصاویر اور ویڈیوز کے ہمراہ www.meningitis.org اور www.meningitisnow.org پر دیکھی جا سکتی ہے۔

*صفحہ کے دوسری جانب 'گلاس ٹیسٹ انجام دین' دیکھیں

کیا اسکے کوئی مضر اثرات ہیں؟


انجکشن لگنے کے مقام پر تھوڑی سی سوجن، سرخی یا درد کی حساسیت ہونا عام ہے۔ آپ کو سر درد بھی پوسکتا ہے یا عموم سطح پر طبیعت ناساز محسوس ہو سکتی ہے لیکن یہ علامات ایک یا دو دن میں غائب ہو جانی چاہئیں۔ اگر آپ کسی علامات کے حوالے سے فکرمند ہوں، تو NHS111 کے ذریعے یا حسب معمول اپنے GP پریکٹس سے طبی مشورہ حاصل کریں۔



گلاس ٹیسٹ انجام دین

سینیٹیسیمیا میں مبتلا فرد میں بخار کے ساتھ چند دھبے یا پھیلے ہوئے ریشز پیدا ہو سکتے ہیں۔ بعد میں ریشز جامنی داغوں میں بدل سکتے ہیں جو دباؤ ڈالنے پر دھنڈلاتے نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھنے کے لیے پانی پینے کے گلاس کا ایک حصہ ریشز پر دباؤ کر ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بخار اور ریشز ہوں، اور دباؤ ڈالنے پر ریشز نہ دھنڈلاتیں، تو 999 پر کال کر کے فوراً طبی امداد حاصل کریں یا کوئی ایسا فرد ڈھونڈیں جو آپ کو قریب ترین اسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لے جائے۔ ریشز کا انتظار نہ کریں۔ یہ تاخیر سے پیدا ہونے والی علامت ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے ریشز پیدا ہی نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور طبیعت بگڑ رہی ہے تو فوراً طبی امداد حاصل کریں۔

گہرے رنگ کی چلد پر، آنکھ کے پیوٹوں کے اندر ورنی حصے یا منه کے اندر تالوں چیک کریں جہاں دھبے زیادہ نمایاں ہو سکتے ہیں۔



اگر آپ کو ویکسین سے کوئی مشتبہ مضر اثرات محسوس ہوں، تو آپ ان کی اطلاع یلو کارڈ ویب سائٹ پر جا کر، 0800 731 6789 پر (پیر تا جمعہ، صبح 9 سے شام 5 بجے تک) کال کرک یا یلو کارڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دے سکتے ہیں۔

میننجائیس کے لیے، درج ذیل فلاہی ادارے معلومات، مشاورت اور معاونت فراہم کرتے ہیں:

میننجائیس ریسرچ فاؤنڈیشن،

مفت بیلپ لائن - 0800 8800 3344

پیر تا جمعہ، صبح 9 سے شام 5 بجے تک

میننجائیس ناؤ، مفت بیلپ لائن

- 0808 10 388 پیر تا جمعرات صبح 9 سے سہ 4 بھر 4 بجے اور

جمعہ صبح 9 سے دو بھر 1 بجے تک

اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا مزید معلومات درکار ہوں، تو اپنے ڈاکٹر، اسکول نرس یا اپنے ڈاکٹر کی سرجری (دفتر) میں پریکٹس نرس سے بات کریں۔