



UK Health  
Security  
Agency

**NHS**

Protejați-vă împotriva  
**meningitei și  
septicemiei**  
cu vaccinul MenACWY



**i**mmunisation  
the safest way to protect your health

# Boala meningococică

**Boala meningococică este rară, dar foarte gravă, și necesită tratament spitalicesc de urgență. Poate duce la dizabilități care vă pot schimba viața, precum amputații, pierderea auzului, leziuni și cicatrici cerebrale. Este cauzată de bacteriile meningococice, care sunt divizate în mai multe grupuri. Cele mai frecvente sunt A, B, C, W și Y. Sugarii, copiii mici, adolescenții și tinerii adulți prezintă cel mai ridicat risc de boală meningococică.**

Bacteriile meningococice pot cauza meningită (inflamarea membranei din jurul creierului) și septicemie (când bacteriile pătrund în fluxul sanguin și otrăvesc sângele). Ambele boli sunt foarte grave și pot fi letale, în special dacă nu sunt diagnosticate din timp.

Atât meningita, cât și septicemia pot declanșa sepsisul. Sepsisul este o reacție intensă și cu risc letal a sistemului imunitar la orice infecție și poate cauza lezarea țesuturilor, insuficiență de organe și deces.

## De ce trebuie să mă vaccinez?

---

Adolescenții de vârstă mai mare și tinerii adulți prezintă un risc mai ridicat de a face boala meningococică, așaadar, trebuie să vă vaccinați acum pentru a vă proteja. Acesta este un vaccin sigur și foarte eficace, care face parte din programul de rutină pentru adolescenți din anul 2015. De asemenea, reduce riscul ca alte persoane din jurul dvs. să fie infectate. Este posibil să fi făcut vaccinul MenC când erați bebeluși sau sugari, dar acesta nu vă va proteja împotriva altor grupuri meningococice.

Vaccinul MenACWY va crește nivelul dvs. de protecție împotriva MenC și vă va ajuta să vă protejați împotriva altor trei grupuri meningococice (A, W și Y). Acest vaccin nu vă va proteja împotriva tuturor formelor de boală meningococică, de exemplu MenB, așaadar, este important în continuare să acordați atenție semnelor și simptomelor.

## Este obligatoriu să fac vaccinul MenACWY?

---

Nu, dar cel mai bun mod de a vă proteja este să faceți vaccinul MenACWY. Dvs. sau părintele/tutorele dvs. trebuie să vă acordați consimțământul pentru a face vaccinul. De obicei, posibilitatea de a face vaccinul este oferită în școală, în clasa a IX-a, la vârsta de 13-14 ani. Nu vă faceți griji dacă ați ratat vaccinul, căci sunteți eligibili să primiți vaccinul MenACWY gratuit de la asistenta medicală a școlii sau echipa de imunizare a școlii dacă încă sunteți elevi sau de la medicul de familie până împliniți vârsta de 25 de ani. Există 3 vaccinuri MenACWY, denumite MenQuadfi, Nimenrix și MenVeo, puteți citi prospectele cu informații pentru pacient aici:

MenQuadfi: [www.medicines.org.uk/emc/product/12818/pil](http://www.medicines.org.uk/emc/product/12818/pil)

Nimenrix: [www.medicines.org.uk/emc/product/4118/pil](http://www.medicines.org.uk/emc/product/4118/pil)

MenVeo: [www.medicines.org.uk/emc/product/2939/pil](http://www.medicines.org.uk/emc/product/2939/pil)

## Vaccinul doare?

Nimănui nu îi plac injecțiile, dar este foarte rapid. Acele utilizate sunt mici și ar trebui să simțiți doar o ușoară înțepătură. Dacă aveți emoții cu privire la administrarea injecției, spuneți-i asistentei medicale sau medicului înainte de administrare.

Protejați-vă împotriva meningitei și septicemiei

## Semne și simptome

La început, boala meningococică poate părea o gripă severă. Însă, de obicei, o persoană afectată se va îmbolnăvi grav în câteva ore. Tratamentul precoce vă poate salva viața, așadar, este important să conștientizați care sunt unele dintre semnele și simptomele principale.

Durere de cap severă .....

Gât înțepenit .....

Temperatură mare .....

Convulsii/crize .....

Somnolență sau  
dificultăți la trezire .....

Confuzie și/sau iritabilitate .....

Mâini și picioare reci .....

**Acordați atenție  
semnelor și simptomelor**

Unul sau mai multe dintre aceste simptome se pot agrava și pot apărea în orice ordine și în oricare dintre cele două boli. Este important să solicitați asistență medicală din timp dacă dvs. sau un prieten de-al dvs. prezentați simptome îngrijorătoare sau o stare care se agravează rapid.

Este important să cunoașteți semnele și simptomele de meningită și septicemie, chiar dacă sunteți vaccinați, deoarece există multe alte cauze ale acestor afecțiuni.



Sensibilitate la lumină intensă

Respirație accelerată

Vărsături/diaree

### atenție acestor simptome frecvente

Crampe stomacale

Piele palidă cu pete

Erupecție cutanată/vânătăi\*

Durere articulară sau musculară


O descriere completă a semnelor și simptomelor de meningită și septicemie, inclusiv imagini și videoclipuri, poate fi găsită pe [www.meningitis.org](http://www.meningitis.org) și [www.meningitisnow.org](http://www.meningitisnow.org)

\*consultați secțiunea „Efectuați testul paharului” de pe pagina următoare

## Efectuați testul paharului

O persoană cu septicemie poate prezenta câteva pete sau o erupție extinsă cu febră. Ulterior, erupția se poate agrava și transforma în pete mov care nu se estompează sub presiune. Puteți face un test pentru acest simptom apăsând partea laterală a unui pahar de apă pe erupție. Dacă aveți febră și erupție cutanată, iar erupția nu se estompează sub presiune, solicitați imediat asistență medicală apelând 999 sau rugând pe cineva să vă ducă la cea mai apropiată secție de urgențe. Nu așteptați niciodată să apară erupția cutanată. Aceasta poate fi un semn tardiv sau poate să nu apară deloc. Dacă o persoană este bolnavă și starea sa se agravează, solicitați imediat asistență medicală.

Pe pielea închisă la culoare, verificați partea interioară a pleoapelor sau cerul gurii, unde petele pot fi mai vizibile.



## Există reacții adverse?

---

Se întâmplă frecvent ca locul injecției să prezinte o ușoară umflare, roșeață sau sensibilitate. De asemenea, este posibil să aveți dureri de cap sau să vă simțiți în general puțin rău, dar aceste simptome ar trebui să dispară după una sau două zile. Dacă aveți îngrijorări cu privire la orice simptom, solicitați asistență medicală prin intermediul NHS111 sau al medicului dvs. de familie, ca de obicei.



Dacă suferiți orice reacție adversă suspectată a vaccinului, o puteți raporta pe site-ul web Yellow Card, apelând 0800 731 6789 (între orele 9:00 și 17:00, de luni până vineri) sau descărcând aplicația Yellow Card.

---

**Pentru meningită, următoarele organizații caritabile oferă informații, consultanță și asistență:**

**Meningitis Research Foundation,**

linie de asistență gratuită 080 8800 3344 –  
de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00

**Meningitis Now,** linie de asistență gratuită  
0808 80 10 388 – de luni până joi între orele 9:00 și  
16:00 și vinerea între orele 9:00 și 13:00

---

Dacă aveți întrebări sau doriți mai multe informații, discutați cu medicul dvs., asistenta medicală a școlii sau asistenta cabinetului medicului dvs.

Această broșură a fost produsă de UK Health Security Agency

© Crown copyright 2024

1P 100K AUG 2023 (APS). Product code: YPMACWY1RO Romanian.

UK Health Security Agency gateway number: 2024071.

Broșura poate fi comandată sau descărcată de pe:

**[www.healthpublications.gov.uk](http://www.healthpublications.gov.uk)**, apelând: 0300 123 1002

(linii disponibile între orele 8:00 și 18:00, de luni până vineri). Exemplarele tipărite ale acestei broșuri în limba engleză sunt disponibile la comandă.