

دليل التطعيمات
للأطفال في عمر
سنة واحدة



جدول التطعيمات اعتبارًا من سبتمبر/أيلول 2024

برنامج تطعيم الأطفال

تذكر إحضار دفتر التطعيمات الأحمر معك في كل موعد.



يمكنك الحصول على نسخ لهذه الدفاتر من عيادتك أو عيادة الطبيب. راجع أيضًا www.nhs.uk/vaccinations

تعرض هذه النشرة جدول التطعيمات اعتبارًا من سبتمبر
2024/أيلول

ملخص

ما التطعيمات التي سيتلقاها طفلي في عمر سنة واحدة؟

سيتلقى طفلك 4 حقن خلال زيارة التطعيمات للطفل في عمر سنة واحدة وتشمل:

- الجرعة المعززة لتطعيم **المكورات السحائية B**
- تطعيم **المستدمية النزلية من النوع b/المكورات السحائية المجموعة C** ضد:

■ Hib (المستدمية النزلية النوع b)، و
■ المكورات السحائية المجموعة C (MenC)

- الجرعة المعززة لتطعيم **PCV13** ضد:
- مرض المكورات الرئوية الذي تسببه بعض أنواع بكتيريا المكورات الرئوية
- أول تطعيم **MMR** للطفل ضد:

■ الحصبة
■ النكاف
■ الحصبة الألمانية



للأطفال في عمر سنة واحدة

تطعيمات الأطفال في عمر سنة واحدة

**الحماية ضد المستدمية النزلية النوع b، والمكورات السحائية
المجموعين B وC، والمكورات الرئوية، والحصبة، والنكاف،
والحصبة الألمانية**

ما هي المستدمية النزلية من النوع b؟

المستدمية النزلية من النوع b هي عدوى قد تسبب عددًا من الأمراض
الرئيسية مثل التهاب السحايا (التهاب بطانة الدماغ)، وتسمم الدم
والالتهاب الرئوي، لا سيما لدى الأطفال الصغار.

يُعرف لقاح المستدمية النزلية من النوع b/المكورات السحائية المجموعة C
باسم Menitorix، ويمكنك مشاهدة نشرة معلومات المريض على الموقع
www.medicines.org.uk/emc/product/167/pil

ما هو مرض المكورات السحائية؟

مرض المكورات السحائية هو عدوى خطيرة قد تسبب أيضًا التهاب السحايا
وتسمم الدم لدى الأطفال والشباب.

وتعتبر بكتيريا المكورات السحائية المجموعة B مسؤولة حاليًا عن أغلب
حالات مرض المكورات السحائية في المملكة المتحدة، فيما لا تعتبر
المكورات السحائية المجموعة C شائعة حاليًا لأن أغلب الأطفال واليافعين
يتلقون التطعيمات ضد المكورات السحائية المجموعة C بشكل منتظم.

يُعرف لقاح المكورات السحائية المجموعة B باسم Bexsero، ويمكنك
مشاهدة نشرة معلومات المريض على الموقع
www.medicines.org.uk/emc/product/5168/pil

أي اللقاحات سيتم استخدامها؟

سيُلقى طفلك جرعة مُجمعة للقاحي المستدمية النزلية النوع b/المكورات السحائية المجموعة C إلى جانب جرعة معززة للقاح المكورات السحائية المجموعة B. سَتُعطى هذه اللقاحات في عضلة الفخذ أو أعلى الذراع.

لماذا يحتاج طفلي للجرعات المعززة للقاحات؟

تُعطى الجرعات المعززة للقاحات لرفع مستوى الحماية التي وفرتها بالفعل التطعيمات التي تلقاها طفلك من قبل. فيمكن أن تزول الحماية التي توفرها التطعيمات للطفل بعد مرور بعض الوقت. وتعمل الجرعة المعززة على مد فترة الحماية لتشمل المراحل اللاحقة من العمر.

هل للقاحات المستدمية النزلية من النوع b/المكورات السحائية المجموعة C والمكورات السحائية المجموعة B أي أعراض جانبية؟

قد يعاني طفلك من بعض الاحمرار أو التورم أو الألم في موضع الحقنة. وقد يصبح نصف الأطفال الذين يتلقون هذه اللقاحات عصبية المزاج، وبعضهم يصاب بحمى خفيفة. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات في هذا الشأن من طبيبك العام، أو الممرضة الممارسة أو الزائر الصحي.



للأطفال في عمر سنة واحدة

ما هو مرض المكورات الرئوية؟

يعتبر مرض المكورات الرئوية واحدًا من الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب السحايا البكتيري لدى الأطفال، ولكنه أيضًا يسبب تسمم الدم والالتهاب الرئوي وعدوى الأذن (التهاب الأذن الوسطى) وغيرها من الأمراض الخطيرة. هناك أكثر من 90 نوعًا مختلفًا من البكتيريا المسببة لمرض المكورات الرئوية.

أي لقاح سيتم استخدامه؟

اللقاح المستخدم هو جرعة معززة للقاح المكورات الرئوية المقترن (PCV13) ويوفر الحماية ضد 13 نوعًا مختلفًا من أنواع المكورات الرئوية الأكثر شيوعًا لمرض المكورات الرئوية لدى الأطفال. سيُعطى اللقاح في عضلة الفخذ أو أعلى الذراع خلال نفس الزيارة الخاصة بتلقي لقاحات المستدمية النزلية من النوع b/المكورات السحائية المجموعة C والمكورات السحائية المجموعة B.

هل سيكون للقاح المكورات الرئوية المقترن أي أعراض جانبية؟

قد يصاب 1 أو 2 من كل 10 أطفال رُضع بتورم أو احمرار أو ألم في موضع الحقن أو حمى خفيفة. يُعرف لقاح المكورات الرئوية المقترن باسم Prevenar 13، ويمكنك مشاهدة نشرة معلومات المريض على الموقع www.medicines.org.uk/emc/product/453/pil.

ما هي الحصبة؟

تحدث الإصابة بالحصبة بسبب فيروس شديد العدوى. جميع من يلتقطون العدوى تقريبًا يصابون بحمى شديدة وطفح جلدي ووعكة صحية بوجه عام. تشمل مضاعفات الحصبة عدوى الصدر ونوبات التشنج (الصرع) والتهاب الدماغ (عدوى في الدماغ)، إلى جانب تلف الدماغ. وقد تؤدي الحصبة إلى الوفاة في بعض الحالات شديدة الخطورة.

ما هو النكاف؟

تحدث الإصابة بالنكاف بسبب فيروس قد يؤدي إلى الحمى والصداع وآلم وتورم الغدد في الوجه والعنق والفك. وقد يسبب الصمم الدائم والتهاب السحايا الفيروسي والتهاب الدماغ (التهاب وتورم الدماغ).

ما هي الحصبة الألمانية؟

الحصبة الألمانية هي مرض يسببه أحد الفيروسات. بالنسبة للأطفال، تكون الإصابة خفيفة وقد تزول بشكل غير ملحوظ، غير أن الحصبة الألمانية أثناء الحمل تكون شديدة الخطورة على الأجنة. ويمكن أن تسبب الأضرار الخطيرة للبصر والسمع والقلب والدماغ لديهم. تُعرف هذه الحالة بمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية (CRS).

ما هو لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية؟

يحتوي على نُسَخ موهنة من فيروسات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية الحية. ونظرًا لأن الفيروسات موهنة، لا يسبب متلقو اللقاح العدوى للآخرين. لدينا في المملكة المتحدة لقاحين للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. ومفعولهما جيد للغاية، أحدهما يحتوي على جيلتين الخنزير والآخر خالٍ منه، إذا كنت ترغب أن يتلقى طفلك اللقاح المجاني الخالي من جيلتين الخنزير، فنناقش هذا الأمر مع الممرضة الممارسة أو الطبيب العام.

كيف ومتى يُعطى اللقاح؟

يُحقن اللقاح في عضلة الفخذ أو أعلى الذراع. ويُعطى للطفل في عمر سنة واحدة بعد زوال المناعة التي يحصل عليها الرضيع من والدته. وينبغي إعطاء الطفل جرعة ثانية من اللقاح مرة أخرى قبل التحاق الطفل بالمدرسة في عمر 3 سنوات و4 شهور تقريبًا.



ما مدى فاعلية لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية؟

لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية هو المسؤول عن القضاء على هذه الأمراض الثلاثة تقريبًا لدى الأطفال الصغار في المملكة المتحدة منذ بدء تعميمه في 1988.

هل سيكون للقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية أي أعراض جانبية؟

يظهر مفعول الفيروسات الثلاثة المختلفة في اللقاح في أوقات مختلفة وقد يسببوا الأعراض الجانبية التالية بعد الجرعة الأولى:

■ 6 إلى 10 أيام بعد التطعيم، لأن الحصبة التي تعتبر جزءًا من اللقاح تنشط، غير أن واحد من كل 10 أطفال قد يصاب بالحمى وبعضهم قد يصاب بطفح جلدي خفيف شبيه بالحصبة ويفقدون الشهية للطعام

■ قد يصاب واحد من كل 1000 طفل تلقى التطعيم تقريبًا بنوبة تشنج بسبب الحمى. وهي تُعرف بتشنجات الحمى. غير أن الأطفال الذين لم يتلقوا التطعيم ويصابون بالحصبة يكونون أكثر عرضةً ثلاث مرات للإصابة بنوبة تشنج

■ بعد تطعيم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية بثلاثة أسابيع تقريبًا، عندما ينشط جزء النكاف من اللقاح، قد تظهر على بعض الأطفال أعراض شبيهة بالنكاف في حالات نادرة (الحمى وتورم الغدد)

لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية هو أكثر الطرق أمنًا لحماية طفلك من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

وفي حالات نادرة للغاية، قد يصاب الأطفال بطفح جلدي عبارة عن بُقع صغيرة شبيهة بالكدمات خلال 6 أسابيع بعد التطعيم. وهذا يحدث غالبًا بسبب جزء الحصة أو الحصة الألمانية من اللقاح. إذا شاهدت بقعًا مماثلة، فاصطحب طفلك إلى الطبيب لفحصه. وسيخبرك الطبيب بكيفية التعامل مع الطفح الجلدي وكيفية حماية طفلك في المستقبل

قد يصاب أقل من واحد من كل مليون طفل بالتهاب الدماغ (التهاب وتورم الدماغ) بعد تلقي لقاح الحصة والنكاف والحصة الألمانية. ولكن إذا التقط الطفل الحصة، فإن فرص الإصابة بالتهاب الدماغ تتراوح بين واحد من كل 200 طفل وواحد من كل 5000 طفل

ماذا لو كان طفلي الرضيع مصابًا بحساسية تجاه البيض؟

يمكن إعطاء لقاح الحصة والنكاف والحصة الألمانية بأمان للأطفال المصابين بحساسية شديدة (رد فعل تحسسي) تجاه البيض. إذا كانت لديك أي شواغل، فتحدث مع الزائر الصحي أو الممرضة الممارسة أو الطبيب.

هل يحتوي لقاح الحصة والنكاف والحصة الألمانية على الجيلاتين؟

لدينا في المملكة المتحدة لقاحين للحصة والنكاف والحصة الألمانية ومفعولهما جيد للغاية. أحدهما يحتوي على جيلاتين الخنزير والآخر خالٍ منه. إذا كنت تفضل الحصول على اللقاح غير المحتوي على جيلاتين الخنزير، فتحدث مع الممرضة الممارسة أو الطبيب العام. يمكنك مشاهدة نشرات معلومات المريض الخاصة بلقاح الحصة والنكاف والحصة الألمانية على:

:Priorix

www.medicines.org.uk/emc/product/1159/pil

:MMRVAXPRO

www.medicines.org.uk/emc/product/6307/pil

انتبه لالتهاب السحايا وتسمم الدم

يعتبر التهاب السحايا وتسمم الدم خطيران للغاية، ومن المهم إدراك العلامات والأعراض ومعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها في حالة ظهورها. ربما تكون الأعراض المبكرة لالتهاب السحايا وتسمم الدم مماثلة لنزلة البرد أو الإنفلونزا (الحمى، القيء، العصبية والتلملل). غير أن المصابين بالتهاب السحايا أو تسمم الدم قد يصبحون في حالة مرضية خطيرة في غضون ساعات، ولذلك من المهم التعرف على علامات وأعراض هذين المرضين.



للأطفال في عمر سنة واحدة

ما هو التهاب السحايا؟

التهاب السحايا هي عدوى تصيب بطانة الدماغ. وتحدث الإصابة به بسبب عدة أنواع من البكتيريا أو الفيروسات.

قد تسبب العدوى ببكتيريا المكورات السحائية التهاب السحايا وتسمم الدم والتهاب غلاف القلب (التهاب بطانة الكيس الذي يحتوي على القلب) والتهاب المفاصل.

بالنسبة للأطفال الرضع، قد تشمل أعراض التهاب السحايا:

- البكاء بصوت أنين عالٍ
- العصبية عند الالتقاط
- اليافوخ الناقص
- النعاس وضعف الاستجابة - صعوبة الإيقاظ
- الارتخاء والكسل
- التيبس المصحوب بحركات متشنجة (التشنجات/نوبات الصرع)
- رفض التغذية، القيء
- شحوب الجلد أو البقع الجلدية أو الزرققة
- الحمى

ما هو تسمم الدم؟

تسمم الدم هو حالة خطيرة للغاية من جراء عدوى تصيب مجرى الدم. ويمكن أن تظهر على المصاب علامات برودة اليدين والقدمين، وشحوب الجلد، والقيء والنعاس الشديد أو صعوبة الإيقاظ بسرعة كبيرة. إذا اشتبهت في تسمم الدم، فالتمس المساعدة على الفور. بالنسبة للأطفال الرضع، قد تشمل أعراض تسمم الدم:

- أنماط التنفس السريع أو غير المعتاد
- شحوب الجلد أو البقع الجلدية أو الزرقة
- حمى مع برودة شديدة في اليدين والقدمين
- الرعشة
- القيء ورفض التغذية
- بقع حمراء أو أرجوانية لا تزول تحت الضغط (قم بإجراء اختبار الزجاج الموضح في الصفحة التالية)*
- الألم أو العصبية من جراء ألم العضلات أو ألم الأطراف أو المفاصل الشديد
- الارتخاء
- النعاس الشديد

من المهم معرفة أن الجميع لا تظهر عليهم كل الأعراض المذكورة، وأن قائمة الأعراض هذه ليست شاملة لجميع الأعراض. إذا ظهرت على شخص ما بعض الأعراض، لا سيما البقع الحمراء أو الأرجوانية، فالتمس المساعدة الطبية على الفور. إذا لم تتمكن من التواصل مع طبيبك، أو كنت لا تزال قلقًا بعد الحصول على المشورة، فاتبع حدسك واصطحب طفلك إلى قسم الطوارئ بأقرب مستشفى إليك.

*يمكن فحص الجزء الداخلي من الجفون أو سقف الحلق لدى أصحاب البشرة السمراء حيث تكون البقع أكثر وضوحًا



اختبار الزجاج

استخدم كوبًا زجاجيًا شفافًا واضغط به بقوة على الطفح الجلدي حتى تستطيع رؤية ما إذا كان سيختفي بفعل الضغط أم لا. إذا لم يتغير لون الطفح الجلدي، فيجب الاتصال بالطبيب على الفور.

أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟

توفر هذه المنظمات الخيرية المعلومات والنصائح والدعم:

Meningitis Research Foundation

خط المساعدة المجاني 080 8800 3344

(9 صباحًا إلى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، 10 صباحًا إلى 8 مساءً خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية) www.meningitis.org

Meningitis Now

خط المساعدة الذي يعمل على مدار 24 ساعة 0808 8010 388

www.meningitisnow.org

يمكنك أيضًا استشارة الطبيب أو الممرضة الممارسة أو الزائر الصحي، أو الاتصال بـ **NHS** على رقم 111.

يمكن لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية المشتبه بها للقاحات والأدوية عن طريق برنامج البطاقة الصفراء Yellow Card Scheme.

يمكنك القيام بذلك عبر الإنترنت بزيارة الموقع yellowcard.mhra.gov.uk أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن للبطاقة الصفراء Yellow Card على رقم **0800 731 6789**. يمكنك أيضًا استخدام رمز الاستجابة السريعة QR أو تنزيل تطبيق Yellow Card.



للأطفال في عمر سنة واحدة

برنامج تطعيمات الأطفال الدورية اعتبارًا من سبتمبر/أيلول 2024

سن الاستحقاق	الأمراض التي توفر الحماية منها	اللقاح المُعطى
ثمانية أسابيع	الدفتريا، التيتانوس، السعال الديكي (الشاهوق)، شلل الأطفال، المستدمية النزلية النوع b والتهاب الكبد B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	المكورات السحائية المجموعة B (MenB)	MenB
	التهاب المعدة والأمعاء الناتج عن فيروس الروتا	Rotavirus ²
اثنا عشر أسبوعًا	الدفتريا، التيتانوس، السعال الديكي، شلل الأطفال، المستدمية النزلية من النوع b والتهاب الكبد B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	عدوى المكورات الرئوية (13 نمطًا مصليًا)	لقاح المكورات الرئوية المقترن (PCV)
	فيروس الروتا	Rotavirus ²
سنة عشر أسبوعًا	الدفتريا، التيتانوس، السعال الديكي، شلل الأطفال، المستدمية النزلية من النوع b والتهاب الكبد B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	لقاح المكورات السحائية B	MenB
	المستدمية النزلية من النوع b والمكورات السحائية المجموعة C	Hib/MenC
	عدوى المكورات الرئوية	الجرعة المعززة للقاح PCV
	الحصبة، النكاف والحصبة الألمانية	MMR
سنة واحدة (في عيد ميلاد الطفل الأول أو بعده)	لقاح المكورات السحائية B	الجرعة المعززة للقاح MenB
	الإنفلونزا (كل سنة اعتبارًا من سبتمبر/أيلول)	لقاح الإنفلونزا الحي الموهّن LAIV ^{4,6}
	الدفتريا، التيتانوس، السعال الديكي، وشلل الأطفال	dTaP/IPV
	الحصبة، النكاف والحصبة الألمانية	MMR (تحقق من الجرعة الأولى المُعطاة للطفل)
ثلاث سنوات وأربعة شهور أو بعد ذلك بمدة وجيزة	السرطان والتأليل التناسلية التي تسببها أنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)	⁵ HPV
	التهانوس والدفتريا وشلل الأطفال	Td/IPV (تحقق من حالة الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية)
أربع عشرة سنة (الصف الدراسي التاسع)	المكورات السحائية المجموعات A و C و W و Y	MenACWY

[1] الحقن في العضل داخل العضلة الدالية أعلى الذراع أو الجانب الأمامي الوحشي للخصد، [2] ينبغي إعطاء لقاح فيروس الروتا فقط بعد التحقق من نتيجة فحص نقص المناعة المشترك الشديد SCID. [3] يحتوي على جيلاتين الخنزير، [4] راجع رسالة الإنفلونزا السنوية على الموقع: www.gov.uk/government/collections/annual-flu-programme. [5] راجع الفصل 18a حول فيروس الورم الحليمي البشري في Green Book للتعرف على تفاصيل بشأن تطعيم الشباب المصابين بنقص المناعة الذين يحتاجون إلى 3 جرعات. [6] إذا كانت هناك موانع لاستعمال لقاح الإنفلونزا الحي الموهّن (LAIV) أو كان غير مناسب، فيمكن استخدام لقاح الإنفلونزا المعطل (راجع الفصل 19 في Green Book للتعرف على التفاصيل). [7] راجع الفصل 28a حول الوباء النطاقي في Green Book للتعرف على تفاصيل عن المجموعات العمرية المؤهلة وتشمل المصابين بالكتبت المناعي الحاد من عمر 50 سنة.

اللقاحات الإضافية للأفراد المصابين بحالات مرضية مؤكدة

الحالة الطبية	الأمراض التي توفر الحماية منها	اللقاحات المطلوبة ¹
انعدام الطحال أو اختلال وظائف الطحال (بما في ذلك بسبب الإصابة بالأنيميا المنجلية والأمراض الباطنية)	المكورات السحائية المجموعات A و B و C و W و Y عدوى المكورات الرئوية الإنفلونزا	MenACWY MenB PCV13 (حتى سن 10 سنوات) ² PPV23 (من عمر سنتين) لقاح الإنفلونزا السنوي
قوقعة الأذن المزروعة	عدوى المكورات الرئوية	PCV13 (حتى سن 10 سنوات) ² PPV23 (من عمر سنتين)
أمراض الجهاز التنفسي أو القلب المزمنة (مثل الربو الحاد، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وفشل القلب)	عدوى المكورات الرئوية الإنفلونزا	PCV13 (حتى سن 10 سنوات) ² PPV23 (من عمر سنتين) لقاح الإنفلونزا السنوي
أمراض الجهاز العصبي المزمنة (مثل باركنسون أو داء العصبون الحركي، أو صعوبات التعلم)	عدوى المكورات الرئوية الإنفلونزا	PCV13 (حتى سن 10 سنوات) ² PPV23 (من عمر سنتين) لقاح الإنفلونزا السنوي
مرض السكري	عدوى المكورات الرئوية الإنفلونزا	PCV13 (حتى سن 10 سنوات) ² PPV23 (من عمر سنتين) لقاح الإنفلونزا السنوي
مرض الكلى المزمن (يشمل الغسيل الكلوي)	عدوى المكورات الرئوية (المرحلة 4 و 5 من مرض الكلى المزمن) الإنفلونزا (المرحلة 3 و 4 و 5 من مرض الكلى المزمن) التهاب الكبد B (المرحلة 4 و 5 من مرض الكلى المزمن)	PCV13 (حتى سن 10 سنوات) ² PPV23 (من عمر سنتين) لقاح الإنفلونزا السنوي Hepatitis B
أمراض الكبد المزمنة	عدوى المكورات الرئوية الإنفلونزا التهاب الكبد A التهاب الكبد B	PCV13 (حتى سن 10 سنوات) ² PPV23 (من عمر سنتين) لقاح الإنفلونزا السنوي Hepatitis A Hepatitis B
الهييموفيليا	التهاب الكبد A التهاب الكبد B	Hepatitis A Hepatitis B
تثبيط المناعة بسبب مرض أو علاج ما ⁴	عدوى المكورات الرئوية لقاح الهربس النطاقي الإنفلونزا	PCV13 (حتى سن 10 سنوات) ^{2,3} PPV23 (من عمر سنتين) Shingrix - فوق عمر 50 سنة ⁵ لقاح الإنفلونزا السنوي
اضطرابات المناعة (بشمل ذلك من يتلقون علاجاً مثبطاً مناعياً)	المكورات السحائية المجموعات A و B و C و W و Y عدوى المكورات الرئوية الإنفلونزا	MenACWY MenB PCV13 (حتى سن 10 سنوات) ² PPV23 (من عمر سنتين) لقاح الإنفلونزا السنوي

[1] راجع الفصل ذا الصلة في Green Book للتعرف على الجدول الزمني المحدد: www.gov.uk/government/collections/immunisation-against-infectious-disease-the-green-book. [2] إذا كان في عمر سنتين إلى أقل من 10 سنوات وغير مُحصّن أو مُحصّن جزئياً ضد عدوى المكورات الرئوية، يُعطى جرعة PCV13 واحدة. [3] لأي عمر لدى المصابين بالكتبت المناعي الحاد. [4] يجب مراعاة إعطاء لقاح الإنفلونزا السنوي لجميع أفراد الأسرة ومن يعتنون بأفراد مصابين بهذه الأمراض. [5] راجع الفصل 28a حول الهربس النطاقي في Green Book - www.gov.uk/government/publications/shingles-herpes-zoster-the-green-book. chapter-28a.

برنامج تطعيم الأطفال الانتقائي

المجموعة المستهدفة	العمر والجدول الزمني	المرض	اللقاحات المطلوبة
مواليد الأمهات المصابات بالتهاب الكبد B	عند الولادة، أربعة أسابيع و12 شهرًا ^{1,2}	التهاب الكبد B	التهاب الكبد (Engerix B/HBvaxPRO B)
الأطفال الرضع في مناطق الدولة حيث تكون معدلات الإصابة بالسُل $\leq 40/100,000$	28 يومًا تقريبًا ⁴	السُل	BCG
الأطفال الرضع الذين وُلد أحد أبوينهم أو أجدادهم في دولة ترتفع بها معدلات الإصابة ³	28 يومًا تقريبًا ⁴	السُل	BCG
الأطفال في المجموعات المعرضة لمخاطر سريرية	من 6 شهور إلى 17 سنة	الإنفلونزا	LAIV أو لقاح الإنفلونزا المعطل إذا كانت هناك موانع لاستعمال الأول أو إذا كان الطفل دون سن سنتين
النساء الحوامل	أي مرحلة خلال الحمل في موسم الإنفلونزا	الإنفلونزا	لقاح الإنفلونزا المُعطل
	بدءًا من 16 أسبوعًا من مدة الحمل ⁵	السعال الديكي	dTap/IPV أو Tdap
	بدءًا من 28 أسبوعًا من مدة الحمل	فيروس المخلوي التنفسي	لقاح RSV

[1] يُجرى سحب الدم لفحص الإصابة بالغلوتين المناعي لالتهاب الكبد B في عمر 12 شهرًا لاستبعاد العدوى. [2] بالإضافة إلى ذلك يُعطى اللقاح سداسي التكافؤ (Vaxelis أو Infanrix hexa) في أعمار 8 و12 و16 أسبوعًا. [3] عندما يكون المعدل السنوي للإصابة بالسُل $\leq 40/100,000$ - انظر www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people - انظر www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people - انظر www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people [4] تحقق من نتيجة فحص SCID قبل إعطاء لقاح السُل [5] يُفضل قبل 32 أسبوعًا من الحمل ومع ذلك يمكن إعطاؤه بعد 32 أسبوعًا.



Prodotto da
UK Health Security Agency

© Crown copyright 2024

2024QG1AR Arabic 1p 500K AUG 2024

UK Health Security Agency gateway number: 20244494

نُشرت هذه الطبعة أول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إذا أردت الحصول على عدد أكبر من النسخ لهذه النشرة، فترجى زيارة الموقع www.healthpublications.gov.uk للاتصال بخط الطلب التابع لـ Health Publications. رقم الهاتف الأول: 0300 123 1002. ميني كوم: 0300 123 1003 (من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً، أيام الاثنين إلى الجمعة).

يرجى استخدام كود المنتج: 2024QG1AR Arabic

www.nhs.uk/vaccinations